

В.А. Ильин, В.А. Садовничий,
Бл.Х. Сендов

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ПРОДОЛЖЕНИЕ КУРСА

Под редакцией академика А.Н. Тихонова

Допущено Министерством высшего
и среднего специального образования СССР
в качестве учебника для студентов вузов,
обучающихся по специальностям „Математика“,
„Прикладная математика“, „Механика“

ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
1987

Ильин В. А. и др. Математический анализ. Продолжение курса / В. А. Ильин, В. А. Садовничий, Бл. Х. Сендов. Под ред. А. Н. Тихонова. — М.: Изд-во МГУ, 1987. — 358 с.

Учебник представляет собой вторую часть (ч. 1 — 1985 г.) курса математического анализа, написанного в соответствии с единой программой, принятой в СССР и НРБ. В книге рассмотрены теория числовых и функциональных рядов, теория кратных, криволинейных и поверхностных интегралов, теория поля (включая дифференциальные формы), теория интегралов, зависящих от параметра, и теория рядов и интегралов Фурье. Особенность книги — три четко отделяемых друг от друга уровня изложения: облегченный, основной и повышенный, что позволяет использовать ее как студентам технических вузов с углубленным изучением математического анализа, так и студентам механико-математических факультетов университетов.

Рецензенты:

кафедра математики МИФИ
(зав. кафедрой проф. А. И. Прилепко),
чл.-корр. АН СССР А. В. Бицадзе

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данная книга является второй частью учебника по математическому анализу и полностью охватывает материал второго года обучения, предусмотренный программой для студентов университетов СССР и НРБ, обучающихся по специальностям «Математика», «Прикладная математика» и «Механика».

Книга содержит теорию числовых и функциональных рядов, теорию собственных и несобственных кратных интегралов Римана, теорию криволинейных и поверхностных интегралов и интегралов, зависящих от параметров, теорию поля (в том числе и теорию дифференциальных форм и евклидовых пространств), теорию рядов и преобразований Фурье.

Как и в первой части (В. А. Ильин, В. А. Садовничий, Бл. Х. Сендов. Математический анализ. Начальный курс. — М.: Изд-во МГУ, 1985), изложение материала ведется на трех легко отделяемых друг от друга уровнях: облегченном, основном и повышенном.

Облегченный уровень отвечает программе технических вузов СССР с углубленным изучением математического анализа, основной уровень изложения — программе специальности «Прикладная математика», материал повышенного уровня изложения дополняет материал основного уровня рядом разделов, обычно излагаемых на механико-математических факультетах университетов.

Для понимания материала облегченного уровня изложения не требуется чтение материала основного и повышенного уровней, а для понимания материала основного уровня изложения не требуется чтения материала повышенного уровня.

Текст, относящийся к повышенному уровню изложения, выделен в книге двумя вертикальными чертами; текст, относящийся к основному уровню изложения, выделен одной вертикальной чертой, остальной текст книги составляет содержание облегченного уровня изложения.

В целом материал данной книги весьма приближен к тому курсу, который реально может быть прочитан для студентов университетов.

При написании этой книги авторы использовали сложившиеся в Московском и в Софийском университетах лекционные курсы и

часть материала из книги В. А. Ильина и Э. Г. Позняка «Основы математического анализа» (М.: Наука, 1980).

Авторы выражают глубокую благодарность титульному редактору этой книги академику А. Н. Тихонову за многие ценные советы и замечания. Особую благодарность авторы выражают И. С. Ломову и С. Троянскому, которые оказали неоценимую помощь на всех этапах написания этой книги. Весьма существенному улучшению изложения материала учебника способствовал труд редактора Т. И. Кузнецовой, которой авторы также выражают глубокую благодарность.

Москва, октябрь 1986 г.

Глава 1

ЧИСЛОВЫЕ РЯДЫ

Еще в курсе средней школы читателю приходилось сталкиваться с суммами, содержащими бесконечное число слагаемых (например, с суммой бесконечного числа членов геометрической прогрессии).

Исследование такого рода сумм, называемых рядами, может быть сведено к исследованию числовых последовательностей, тем не менее эти суммы требуют самостоятельного углубленного изучения, так как служат важным вспомогательным средством для представления различных встречающихся в анализе функций.

§ 1. ПОНЯТИЕ ЧИСЛОВОГО РЯДА

1. Сходящиеся и расходящиеся ряды. Рассмотрим произвольную числовую последовательность $u_1, u_2, \dots, u_k, \dots$ и формально образуем из ее элементов бесконечную сумму вида

$$u_1 + u_2 + \dots + u_k + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} u_k. \quad (1.1)$$

Формально составленную сумму (1.1) принято называть числовым рядом или просто рядом. При этом отдельные слагаемые u_k принято называть членами ряда (1.1). Сумму первых n членов ряда (1.1) принято называть n -й частичной суммой ряда и обозначать символом S_n .

Итак, по определению

$$S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n = \sum_{k=1}^n u_k. \quad (1.2)$$

Определение. Ряд (1.1) называется *сходящимся*, если сходится последовательность $\{S_n\}$ частичных сумм (1.2) этого ряда. При этом предел S указанной последовательности $\{S_n\}$ называется *суммой* ряда (1.1).

Таким образом, для сходящегося ряда (1.1), имеющего сумму S , мы можем формально записать равенство

$$S = \sum_{k=1}^{\infty} u_k.$$

В случае, если для данного ряда (1.1) предела последовательности частичных сумм (1.2) не существует, этот ряд называется *расходящимся*.

Мы видим, что понятие суммы определено лишь для сходящегося ряда, причем (в отличие от понятия суммы конечного числа слагаемых) понятие суммы ряда вводится посредством операции предельного перехода.

В современной математике и в ее приложениях часто приходится сталкиваться с расходящимися рядами, для которых предела последовательности частичных сумм (1.2) не существует. Для таких рядов вводится понятие суммы в некоторых обобщенных смыслах. В § 7 настоящей главы будут рассмотрены наиболее употребительные методы обобщенного суммирования расходящихся рядов.

Одним из главных вопросов теории числовых рядов является установление признаков, позволяющих решить вопрос о сходимости или расходимости данного ряда. В § 2 такие признаки будут установлены для рядов, все члены которых являются неотрицательными числами, а в § 4 — для рядов с произвольными членами.

Примеры. 1°. Изучим вопрос о сходимости ряда, составленного из членов геометрической прогрессии

$$1 + q + q^2 + \dots + q^k + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} q^{k-1}. \quad (1.3)$$

Так как n -я частичная сумма S_n этого ряда при $q \neq 1$ имеет вид

$$S_n = 1 + q + \dots + q^{n-1} = \frac{1 - q^n}{1 - q}, \quad (1.4)$$

то очевидно, что при $|q| < 1$ последовательность частичных сумм $\{S_n\}$ имеет предел, равный $1/(1-q)$. Таким образом, при $|q| < 1$ ряд (1.3) сходится и имеет сумму, равную $1/(1-q)$.

Если $|q| > 1$, то из выражения (1.4) очевидно, что предела последовательности частичных сумм $\{S_n\}$ не существует, т. е. при $|q| > 1$ ряд (1.3) расходится.

Для полноты картины остается рассмотреть случай $|q| = 1$, т. е. случай, когда q равно либо $+1$, либо -1 . В случае, когда $q = +1$, все члены ряда (1.3) равны единице и n -я частичная сумма этого ряда S_n равна n . Отсюда следует, что и в случае $q = +1$ предела последовательности $\{S_n\}$ не существует, т. е. ряд (1.3) расходится.

Наконец, в случае $q = -1$ ряд (1.3) имеет вид $1 - 1 + 1 - 1 + \dots$, так что последовательность $\{S_n\}$ частичных сумм совпадает с заведомо расходящейся последовательностью $1, 0, 1, 0, \dots$. Стало быть, и при $q = -1$ ряд (1.3) расходится.

2°. Фиксируем любую точку x числовой прямой, рассмотрим вопрос о сходимости трех числовых рядов ¹⁾:

$$1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^{k-1}}{(k-1)!} + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{k-1}}{(k-1)!}, \quad (1.5)$$

$$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + \frac{(-1)^{k-1} x^{2k-1}}{(2k-1)!} + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} x^{2k-1}}{(2k-1)!}, \quad (1.6)$$

$$1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + \frac{(-1)^{k-1} x^{2k-2}}{(2k-2)!} + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} x^{2k-2}}{(2k-2)!}. \quad (1.7)$$

Обозначая n -е частичные суммы рядов (1.5), (1.6) и (1.7) соответственно через $S_n^{(1)}(x)$, $S_n^{(2)}(x)$ и $S_n^{(3)}(x)$, можем записать:

$$S_n^{(1)}(x) = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}, \quad (1.8)$$

$$S_n^{(2)}(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + \frac{(-1)^{n-1} x^{2n-1}}{(2n-1)!}, \quad (1.9)$$

$$S_n^{(3)}(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + \frac{(-1)^{n-1} x^{2n-2}}{(2n-2)!}. \quad (1.10)$$

Сопоставляя выражения (1.8), (1.9) и (1.10) с разложениями по формуле Маклорена функций e^x , $\sin x$ и $\cos x$ (см. п. 2 § 9 гл. 6 ч. 1 ²⁾), мы получим

$$\begin{aligned} e^x &= S_n^{(1)}(x) + R_n^{(1)}(x), \\ \sin x &= S_n^{(2)}(x) + R_n^{(2)}(x), \\ \cos x &= S_n^{(3)}(x) + R_n^{(3)}(x), \end{aligned} \quad (1.11)$$

где $R_n^{(1)}(x)$, $R_n^{(2)}(x)$, $R_n^{(3)}(x)$ обозначают n -е остаточные члены в разложении по формуле Маклорена функцией e^x , $\sin x$ и $\cos x$ соответственно.

В § 9 гл. 6 ч. 1 доказано, что в каждой точке x числовой прямой указанные остаточные члены имеют равный нулю предел при $n \rightarrow \infty$. Следовательно, в силу соотношений (1.11) в каждой точке x прямой частичные суммы $S_n^{(1)}(x)$, $S_n^{(2)}(x)$ и $S_n^{(3)}(x)$ сходятся к пределам, равным соответственно e^x , $\sin x$ и $\cos x$. Это означает,

¹⁾ Символ $0!$ мы отождествляем с числом 1.

²⁾ Здесь и далее ч. 1 — это краткое обозначение книги: Ильин В. А., Садовничий В. А., Сендов Бл. Х. Математический анализ. Начальный курс. — М.: Изд-во МГУ, 1985.

что ряды (1.5), (1.6) и (1.7) сходятся в каждой точке x числовой прямой и их суммы равны соответственно e^x , $\sin x$ и $\cos x$.

Замечание 1. С формальной точки зрения изучение числовых рядов представляет собой новую форму изучения числовых последовательностей, ибо 1) каждому ряду (1.1) однозначно соответствует последовательность $\{S_n\}$ его частичных сумм, 2) произвольной числовой последовательности $\{S_n\}$ однозначно соответствует числовой ряд (1.1) с членами $u_1 = S_1$, $u_k = S_k - S_{k-1}$ при $k > 1$, для которого эта последовательность служит последовательностью частичных сумм.

Замечание 2. Отметим два простых свойства произвольного ряда, непосредственно вытекающие из определения его сходимости:

I. *Отбрасывание конечного числа членов ряда (или добавление к ряду конечного числа членов) не влияет на сходимость или расходимость этого ряда.*

II. *Если c — отличная от нуля постоянная, $u'_k = cu_k$, то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} u'_k$ сходится тогда и только тогда, когда сходится ряд $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$.*

Для обоснования первого из этих свойств достаточно заметить, что в результате указанного отбрасывания (или добавления) конечного числа членов все частичные суммы ряда, начиная с некоторого номера, изменятся на одну и ту же постоянную величину.

Для доказательства второго из указанных свойств обозначим

n -е частичные суммы рядов $\sum_{k=1}^{\infty} u'_k$ и $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ соответственно через S'_n и S_n и учтем, что $S'_n = cS_n$, где $c \neq 0$. Из последнего равенства вытекает, что $\lim_{n \rightarrow \infty} S'_n$ существует тогда и только тогда, когда существует $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.

2. Критерий Коши сходимости ряда. Так как вопрос о сходимости ряда по определению эквивалентен вопросу о сходимости последовательности его частичных сумм, то мы получим необходимое и достаточное условие сходимости данного ряда, сформулировав критерий сходимости Коши для последовательности его частичных сумм. Для удобства приведем формулировку критерия Коши для последовательности (см. п. 3 § 3 гл. 3 ч. 1):

Для того чтобы последовательность $\{S_n\}$ была сходящейся, необходимо и достаточно, чтобы для любого положительного числа ε нашелся номер N такой, что для всех номеров n , удовлетворяющих условию $n \geq N$, и для всех натуральных p ($p = 1, 2, 3, \dots$)

$$|S_{n+p} - S_n| < \varepsilon.$$

В качестве следствия из этого утверждения получим следующую основную теорему.

Теорема 1.1 (критерий Коши для ряда). *Для того чтобы ряд $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ сходиллся, необходимо и достаточно, чтобы для любого положительного числа ε нашелся номер N такой, что для всех номеров n , удовлетворяющих условию $n \geq N$, и для всех натуральных чисел p ($p=1, 2, \dots$)*

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k \right| < \varepsilon. \quad (1.12)$$

Для доказательства этой теоремы достаточно заметить, что величина, стоящая под знаком модуля в неравенстве (1.12), равна разности частичных сумм $S_{n+p} - S_n$.

Отметим, что критерий сходимости Коши представляет в основном теоретический интерес. Его использование для исследования сходимости или расходимости тех или иных конкретных рядов, как правило, сопряжено с трудностями. Поэтому наличие критерия Коши не снимает вопроса об установлении других практически эффективных признаков сходимости и расходимости рядов.

Из теоремы 1.1 легко получить два элементарных, но важных следствия.

Следствие 1. *Если ряд $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ сходится, то последовательность $r_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k$ является бесконечно малой.*

Принято называть величину r_n n -м остатком ряда $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$.

Чтобы доказать следствие 1, достаточно показать, что для любого $\varepsilon > 0$ найдется номер N такой, что $|r_n| \leq \varepsilon$ при $n \geq N$. Последнее неравенство непосредственно вытекает из неравенства (1.12), справедливого для любого $p=1, 2, 3, \dots$, и из теоремы 3.13 ч. 1.

Следствие 2 (необходимое условие сходимости ряда). *Для сходимости ряда $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ необходимо, чтобы последовательность $u_1, u_2, \dots, u_k, \dots$ членов этого ряда являлась бесконечно малой.*

Достаточно доказать, что для данного сходящегося ряда и любого $\varepsilon > 0$ найдется номер N_0 такой, что при $n \geq N_0$ $|u_n| < \varepsilon$. Пусть дано любое $\varepsilon > 0$. Согласно теореме 1.1 найдется номер N такой, что при $n \geq N$ и для любого натурального p выполняется неравенство (1.12). В частности, при $p=1$ это неравенство имеет вид

$$|u_{n+1}| < \varepsilon \quad (\text{при } n \geq N). \quad (1.12')$$

Если теперь положить номер N_0 равным $N+1$, то при $n \geq N_0$ в силу неравенства (1.12') получим $|u_n| < \varepsilon$, что и требовалось доказать.

Иначе следствие 2 можно сформулировать так: для сходимости ряда $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ необходимо, чтобы $\lim_{k \rightarrow \infty} u_k = 0$. Таким образом, при исследовании данного ряда на сходимость следует прежде всего посмотреть, стремится ли к нулю k -й член этого ряда при $k \rightarrow \infty$. Если это не так, то ряд заведомо расходится. Так, например, ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^2}{7k^2 + 8000k}$$

заведомо расходится, ибо

$$\lim_{k \rightarrow \infty} u_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k^2}{7k^2 + 8000k} = \frac{1}{7} \neq 0.$$

Аналогично расходимость уже встречавшегося выше ряда

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1}$$

вытекает из того, что $\lim_{k \rightarrow \infty} (-1)^{k-1}$ не существует.

Отметим, что стремление к нулю k -го члена ряда при $k \rightarrow \infty$ является лишь необходимым, но не достаточным условием сходимости ряда. В качестве примера рассмотрим ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{k} + \dots \quad (1.13)$$

Этот ряд обычно называют гармоническим рядом. Очевидно, что для гармонического ряда выполнено необходимое условие сходимости, но (как доказано в п. 3 § 3 гл. 3 ч. 1) последовательность частичных сумм этого ряда расходится.

§ 2. РЯДЫ С НЕОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ ЧЛЕНАМИ

1. Необходимое и достаточное условие сходимости ряда с неотрицательными членами. Ряды с неотрицательными членами часто встречаются в приложениях. Кроме того, их предварительное изучение облегчит изучение рядов с членами любого знака. В дальнейшем, чтобы подчеркнуть, что речь идет о ряде с неотрицательными членами, мы часто будем обозначать члены такого ряда символом p_k вместо u_k .

Можно сразу же отметить основное характеристическое свойство ряда с неотрицательными членами: *последовательность частичных сумм такого ряда является неубывающей*. Это позволяет нам доказать следующее утверждение.

Теорема 1.2. *Для того чтобы ряд с неотрицательными членами сходиллся, необходимо и достаточно, чтобы последовательность частичных сумм этого ряда была ограничена.*

Необходимость следует из того, что всякая сходящаяся последовательность является ограниченной (в силу теоремы 3.8 ч. 1).

Достаточность вытекает из того, что последовательность частичных сумм не убывает и, следовательно, для сходимости этой последовательности достаточно, чтобы она была ограничена (в силу теоремы 3.15 ч. 1).

2. Признаки сравнения. В этом пункте мы установим ряд признаков, позволяющих сделать заключение о сходимости (или расходимости) рассматриваемого ряда посредством сравнения его с другим рядом, сходимость (или расходимость) которого известна.

Теорема 1.3. Пусть $\sum_{k=1}^{\infty} p_k$ и $\sum_{k=1}^{\infty} p'_k$ — два ряда с неотрицательными членами. Пусть, далее, для всех номеров k справедливо неравенство

$$p_k \leq p'_k. \quad (1.14)$$

Тогда сходимость ряда $\sum_{k=1}^{\infty} p'_k$ влечет за собой сходимость ряда $\sum_{k=1}^{\infty} p_k$; расходимость ряда $\sum_{k=1}^{\infty} p_k$ влечет за собой расходимость ряда $\sum_{k=1}^{\infty} p'_k$.

Доказательство. Обозначим n -е частичные суммы рядов $\sum_{k=1}^n p_k$ и $\sum_{k=1}^n p'_k$ соответственно через S_n и S'_n . Из неравенства (1.14) заключаем, что $S_n \leq S'_n$. Последнее неравенство означает, что ограниченность последовательности частичных сумм $\{S'_n\}$ влечет за собой ограниченность последовательности частичных сумм $\{S_n\}$ и, наоборот, неограниченность последовательности частичных сумм $\{S_n\}$ влечет за собой неограниченность последовательности частичных сумм $\{S'_n\}$. В силу теоремы 1.2 теорема 1.3 доказана.

Замечания к теореме 1.3. 1) В условии теоремы 1.3 можно требовать, чтобы неравенство (1.14) было выполнено не для всех номеров k , а лишь начиная с некоторого номера k . В самом деле, в силу замечания 2 п. 1 § 1 отбрасывание конечного числа членов не влияет на сходимость ряда.

2) Теорема 1.3 останется справедливой, если в условии этой теоремы заменить неравенство (1.14) следующим неравенством:

$$p_k \leqslant c p'_k. \quad (1.15)$$

где c — любая положительная постоянная.

В самом деле, в силу замечания 2 из п. 1 § 1 вопрос о сходимости ряда $\sum_{k=1}^{\infty} p'_k$ эквивалентен вопросу о сходимости ряда

$\sum_{k=1}^{\infty} (c p'_k)$. При этом, конечно, можно требовать, чтобы неравенство (1.15) было выполнено лишь начиная с некоторого достаточно большого номера k .

Следствие из теоремы 1.3. Если $\sum_{k=1}^{\infty} p_k$ — ряд с неотрицательными членами, $\sum_{k=1}^{\infty} p'_k$ — ряд со строго положительными членами и если существует конечный предел

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{p_k}{p'_k} = L,$$

то сходимость ряда $\sum_{k=1}^{\infty} p'_k$ влечет за собой сходимость ряда

$\sum_{k=1}^{\infty} p_k$, расходимость ряда $\sum_{k=1}^{\infty} p_k$ влечет за собой расходимость

ряда $\sum_{k=1}^{\infty} p'_k$.

Доказательство. Так как $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{p_k}{p'_k} = L$, то по определению предела для некоторого $\varepsilon > 0$ найдется номер N такой, что при $k \geqslant N$

$$L - \varepsilon < \frac{p_k}{p'_k} < L + \varepsilon.$$

Следовательно, при $k \geqslant N$ справедливо неравенство $p_k < (L + \varepsilon) p'_k$. Последнее неравенство совпадает с неравенством (1.15) при $c = L + \varepsilon$. В силу замечания 2 к теореме 1.3 следствие доказано.

Теорема 1.4. Пусть $\sum_{k=1}^{\infty} p_k$ и $\sum_{k=1}^{\infty} p'_k$ — два ряда со строго положительными членами. Пусть далее для всех номеров k справедливо неравенство

$$\frac{p_{k+1}}{p_k} \leqslant \frac{p'_{k+1}}{p'_k}. \quad (1.16)$$

Тогда сходимость ряда $\sum_{k=1}^{\infty} p'_k$ влечет за собой сходимость ряда $\sum_{k=1}^{\infty} p_k$, расходимость ряда $\sum_{k=1}^{\infty} p_k$ влечет за собой расходимость ряда $\sum_{k=1}^{\infty} p'_k$.

Доказательство. Запишем неравенство (1.16) для $k=1, 2, \dots, n-1$, где n — любой номер:

$$\begin{aligned} \frac{p_2}{p_1} &\leq \frac{p'_2}{p'_1}, \\ \frac{p_3}{p_2} &\leq \frac{p'_3}{p'_2}, \\ &\dots \dots \dots \\ \frac{p_n}{p_{n-1}} &\leq \frac{p'_n}{p'_{n-1}}. \end{aligned}$$

Перемножая почленно все написанные неравенства, получим

$$\frac{p_n}{p_1} \leq \frac{p'_n}{p'_1}, \text{ или } p_n \leq \frac{p_1}{p'_1} p'_n.$$

Поскольку в последнем, неравенстве величина $c = p_1/p'_1$ представляет собой положительную постоянную, не зависящую от номера n , то в силу замечания 2 к теореме 1.3 теорема 1.4 доказана.

Замечание к теореме 1.4. В условии теоремы 1.4 можно требовать, чтобы неравенство (1.16) было выполнено не для всех номеров k , а лишь начиная с некоторого номера k (см. замечание 2 п. 1 § 1).

Обе доказанные в настоящем пункте теоремы называют теоремами сравнения или признаками сравнения.

Примеры. 1°. Исследуем вопрос о сходимости ряда

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2 + b^k}, \text{ где } b > 0.$$

Если $b \leq 1$, то k -й член рассматриваемого ряда не стремится к нулю при $k \rightarrow \infty$. Следовательно, нарушено необходимое условие сходимости ряда, и ряд расходится. Если же $b > 1$, то, поскольку для любого номера k справедливо неравенство

$$\frac{1}{2 + b^k} < \frac{1}{b^k}$$

и ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{b^k}$ сходится, теорема сравнения 1.3 позволяет утверждать сходимость рассматриваемого ряда.

2°. Исследуем вопрос о сходимости для любого $\alpha \leq 1$ следующего ряда:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{\alpha}} = 1 + \frac{1}{2^{\alpha}} + \dots + \frac{1}{k^{\alpha}} + \dots \quad (1.17)$$

Этот ряд часто называют обобщенным гармоническим рядом. Поскольку при $\alpha \leq 1$ для любого номера k справедливо неравенство

$$\frac{1}{k^{\alpha}} \geq \frac{1}{k}$$

и гармонический ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ расходится³⁾, то теорема сравнения 1.3 позволяет утверждать расходимость ряда (1.17) для любого $\alpha \leq 1$.

3. Признаки Даламбера и Коши. К признакам сравнения непосредственно примыкают два весьма употребительных признака сходимости рядов с положительными членами — признаки Даламбера и Коши, которые основаны на сравнении рассматриваемого ряда с рядом, составленным из элементов геометрической прогрессии, а именно со сходящимся рядом

$$\sum_{k=1}^{\infty} q^k = q + q^2 + \dots + q^k + \dots, \quad |q| < 1, \quad (1.18)$$

или с расходящимся рядом

$$\sum_{k=1}^{\infty} 1 = 1 + 1 + \dots + 1 \dots \quad (1.19)$$

Теорема 1.5 (признак Даламбера)⁴⁾. *1. Если для всех номеров k , по крайней мере начиная с некоторого номера, справедливо неравенство*

³⁾ Расходимость гармонического ряда обоснована в конце п. 2 § 1.

⁴⁾ Жак Лерон Даламбер — французский математик и философ (1717—1783).

$$\frac{p_{k+1}}{p_k} \leq q < 1 \quad \left(\frac{p_{k+1}}{p_k} \geq 1 \right)^{5)}, \quad (1.20)$$

то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} p_k$ сходится (расходится).

II. Если существует предел

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{p_{k+1}}{p_k} = L, \quad (1.21)$$

то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} p_k$ сходится при $L < 1$ и расходится при $L > 1$.

Теорему II обычно называют признаком Даламбера в предельной форме. В этой форме он наиболее часто используется.

Доказательство. Докажем отдельно теоремы I и II.

1) Для доказательства теоремы I положим $p_k' = q^k$ ($p_k' = 1$).

Тогда $\frac{p_{k+1}}{p_k} = q$, где $q < 1$ ($\frac{p_{k+1}}{p_k} = 1$), и мы можем переписать равенство (1.20) в виде

$$\frac{p_{k+1}}{p_k} \leq \frac{p_{k+1}'}{p_k'} \quad \left(\frac{p_{k+1}}{p_k} \geq \frac{p_{k+1}'}{p_k'} \right). \quad (1.22)$$

Так как ряд $\sum_{k=1}^{\infty} p_k'$, совпадающий с рядом (1.18) ((1.19)), сходится (расходится), то неравенство (1.22) на основании теоремы сравнения 1.4 гарантирует сходимость (расходимость) ряда $\sum_{k=1}^{\infty} p_k$.

Теорема I доказана.

2) Докажем теперь теорему II. Если $L < 1$, то найдется положительное число ε такое, что $L = 1 - 2\varepsilon$, т. е. $L + \varepsilon = 1 - \varepsilon$. По определению предела последовательности для указанного ε найдется номер N такой, что при $k \geq N$

$$L - \varepsilon < \frac{p_{k+1}}{p_k} < L + \varepsilon = 1 - \varepsilon. \quad (1.23)$$

Число $L + \varepsilon = 1 - \varepsilon$ играет роль q в теореме I. Ряд сходится.

Если же $L > 1$, то найдется положительное число ε такое, что $L = 1 + \varepsilon$ и $L - \varepsilon = 1$. В этом случае на основании левого из неравенств (1.23) получим

⁵⁾ При этом, конечно, предполагается, что все члены ряда (по крайней мере начиная с некоторого номера) строго положительны.

$$\frac{p_{k+1}}{p_k} > L - \varepsilon = 1 \quad (\text{при } k \geq N).$$

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} p_k$ расходится на основании теоремы I. Теорема 1.5 полностью доказана.

Замечание к теореме 1.5. 1) Обратим внимание на то, что в теореме 1.5 (I) неравенство $\frac{p_{k+1}}{p_k} \leq q < 1$ (для всех k , начиная с некоторого) нельзя заменить на $\frac{p_{k+1}}{p_k} < 1$.

В самом деле, как доказано выше, гармонический ряд (1.13) расходится, но для этого ряда $\frac{p_{k+1}}{p_k} = \frac{k}{k+1} < 1$ (для всех номеров k).

2) Если в условиях теоремы 1.5 (II) $L=1$, то нельзя сказать ничего определенного о сходимости ряда (т. е. при $L=1$ признак Даламбера «не действует»). В самом деле, для гармонического ряда (1.13) $L=1$, причем этот ряд, как мы знаем, расходится. Вместе с тем для ряда

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \quad (1.24)$$

также $L=1$, но этот ряд, как будет показано в следующем пункте, сходится.

Теорема 1.6 (признак Коши). I. Если для всех номеров k , по крайней мере начиная с некоторого номера, справедливо неравенство

$$\sqrt[k]{p_k} \leq q < 1 \quad (\sqrt[k]{p_k} \geq 1), \quad (1.25)$$

то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} p_k$ сходится (расходится).

II. Если существует предел

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{p_k} = L, \quad (1.26)$$

то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} p_k$ сходится при $L < 1$ и расходится при $L > 1$.

Теорему II обычно называют признаком Коши в предельной форме.

Доказательство. Докажем отдельно теоремы I и II.

1) Для доказательства теоремы I положим $p_k' = q^k$ ($p_k' = 1$). Тогда из неравенства (1.25) получим

$$p_k \leq p_k' \quad (p_k \geq p_k'). \quad (1.27)$$

Так как ряд $\sum_{k=1}^{\infty} p_k'$, совпадающий с рядом (1.18) ((1.19)), сходится (расходится), то неравенство (1.27) на основании теоремы сравнения 1.3 гарантирует сходимость (расходимость) ряда $\sum_{k=1}^{\infty} p_k$. Теорема 1.6 (I) доказана.

2) Для доказательства теоремы (II) следует дословно повторить схему доказательства теоремы 1.5 (II), заменив во всех рассуждениях $\frac{p_{k+1}}{p_k}$ на $\sqrt[k]{p_k}$. Теорема 1.6 полностью доказана.

Замечания к теореме 1.6. 1) Как и в теореме 1.5 (I), в теореме 1.6 (I) неравенство $\sqrt[k]{p_k} \leq q < 1$ нельзя заменить на $\sqrt[k]{p_k} < 1$.

2) При $L=1$ признак Коши в предельной форме «не действует». Можно сослаться на два примера, указанные в соответствующем замечании к признаку Даламбера.

Примеры. 1°. Исследуем вопрос о сходимости ряда

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(\sqrt{k})^k}{k!}. \quad (1.28)$$

Применим признак Даламбера в предельной форме. Имеем

$$p_k = \frac{(\sqrt{k})^k}{k!}, \quad \frac{p_{k+1}}{p_k} = \frac{(\sqrt{k+1})^{k+1} k!}{(k+1)! (\sqrt{k})^k} = \frac{1}{\sqrt{k+1}} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^{\frac{k}{2}}. \quad (1.29)$$

На основании (1.29)

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{p_{k+1}}{p_k} &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left\{ \frac{1}{\sqrt{k+1}} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^{\frac{k}{2}} \right\} = \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{k+1}} \cdot \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^{\frac{k}{2}} = 0 \cdot \sqrt{e} = 0 < 1. \end{aligned}$$

т. е. ряд (1.28) сходится.

2°. Изучим вопрос о сходимости ряда

$$\sum_{k=1}^{\infty} k \cdot 2^{-k}. \quad (1.30)$$

Применим признак Коши в предельной форме. Имеем

$$\sqrt[k]{p_k} = \frac{1}{2} \sqrt[k]{k}. \quad (1.31)$$

На основании ⁶⁾ (1.31) $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{p_k} = \frac{1}{2} \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{k} = \frac{1}{2} < 1$. Таким образом, признак Коши устанавливает сходимость ряда (1.30).

Возникает вопрос о том, какой из двух признаков, Даламбера или Коши, является более сильным. Проанализируем этот вопрос в отношении признаков Даламбера и Коши, взятых в предельной форме. Ниже будет доказано, что из существования предела (1.21) вытекают существование предела (1.26) и факт равенства этих пределов. Обратное неверно. В самом деле, легко убедиться в том, что для ряда

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k + 3}{2^{k+1}} \quad (1.32)$$

предел (1.26) существует и равен $1/2$, в то время как предел (1.21) вообще не существует. Таким образом, признак Коши является более сильным, чем признак Даламбера, ибо всякий раз, когда действует признак Даламбера, действует и признак Коши и вместе с тем существуют ряды (например, ряд (1.32)), для которых действует признак Коши и не действует признак Даламбера. Несмотря на это, признак Даламбера на практике употребляется чаще, чем признак Коши.

Итак, докажем

Утверждение. Из существования равного L предела (1.21) вытекает существование равного тому же L предела (1.26).

Доказательству утверждения предположим две леммы.

Лемма 1. Если последовательность $\{a_n\}$ сходится к пределу l , то к тому же пределу сходится и последовательность $\sigma_n = (a_1 + a_2 + \dots + a_n)/n$ средних арифметических чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Доказательство. Так как последовательность $\{a_n\}$ сходится к пределу l , то для любого $\varepsilon > 0$ можно фиксировать номер N такой, что $|a_n - l| < \varepsilon/2$ для всех $n \geq N$. Используя этот факт и учитывая, что при всех $n > N$

$$\sigma_n - l = \frac{(a_1 - l) + \dots + (a_n - l)}{n} =$$

⁶⁾ Для вычисления $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{1/x}$ следует прологарифмировать выражение $x^{1/x}$ и применить правило Лопиталя.

$$= \left[\frac{(a_1 - l) + \dots + (a_N - l)}{n} \right] + \left\{ \frac{(a_{N+1} - l) + \dots + (a_n - l)}{n} \right\},$$

мы получим, что $|\sigma_n - l| < \varepsilon$ при всех $n \geq N_1$.

В самом деле, модуль дроби, заключенной в фигурные скобки, не превосходит числа $\frac{\varepsilon}{2} \cdot \frac{(n-N)}{n}$, меньшего $\varepsilon/2$. Далее, поскольку номер N фиксирован, модуль дроби, заключенной в квадратные скобки, не превосходит $\varepsilon/2$ при всех $n \geq N_1$, где N_1 — достаточно большое число. Лемма доказана.

Лемма 2. Если последовательность положительных чисел $\{a_n\}$ сходится к пределу L , то к тому же пределу сходится и последовательность $b_n = \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}$ средних геометрических чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Доказательство. Прежде всего заметим, что в силу непрерывности логарифмической функции для $L > 0$ $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln a_n = \ln L$. Но тогда по лемме 1 о пределе среднего арифметического существует предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_1 + \ln a_2 + \dots + \ln a_n}{n} = \ln L.$$

Из последнего равенства в силу непрерывности показательной функции получим

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\ln \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}} = e^{\ln L} = L.$$

(Эти рассуждения справедливы и при $L=0$, если считать $\ln L = -\infty$.) Лемма 2 доказана.

Доказательство утверждения. Применяя лемму 2 к числам $a_1 = p_1$, $a_2 = p_2/p_1$, ..., $a_n = p_n/p_{n-1}$, мы, опираясь на существование равного L предела (1.21), установим существование равного тому же L предела (1.26).

4. Интегральный признак Коши—Маклорена. Признаки Даламбера и Коши оказываются непригодными для выяснения вопроса о сходимости некоторых часто встречающихся рядов с положительными членами. Так, например, с помощью этих признаков нельзя выяснить вопрос о сходимости обобщенного гармонического ряда

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{\alpha}} \quad (1.33)$$

(α — любое вещественное число).

В конце п. 2 мы установили, что при $\alpha \leq 1$ ряд (1.33) расходится, однако остается открытым вопрос о сходимости этого ряда

при $\alpha > 1$. В этом пункте мы установим еще один общий признак сходимости ряда с неотрицательными членами, из которого, в частности, будет вытекать сходимость ряда (1.33) при $\alpha > 1$.

Теорема 1.7. (признак Коши — Маклорена). Пусть функция $f(x)$ неотрицательна и не возрастает всюду на полупрямой $x \geq m$, где m — любой фиксированный номер. Тогда числовой ряд

$$\sum_{k=m}^{\infty} f(k) = f(m) + f(m+1) + f(m+2) + \dots \quad (1.34)$$

сходится в том и только в том случае, когда существует предел при $n \rightarrow \infty$ последовательности

$$a_n = \int_m^n f(x) dx. \quad (1.35)$$

Доказательство. Пусть k — любой номер, удовлетворяющий условию $k \geq m+1$, а x — любое значение аргумента из сегмента $k-1 \leq x \leq k$. Так как по условию функция $f(x)$ не возрастает на указанном сегменте, то для всех x из указанного сегмента справедливы неравенства

$$f(k) \leq f(x) \leq f(k-1). \quad (1.36)$$

Функция $f(x)$, будучи ограниченной и монотонной, интегрируема на сегменте $[k-1, k]$ (см. п. 2 § 3 гл. 9 ч. 1). Более того, из неравенства (1.36) и из свойства б) (см. п. 2 § 4 гл. 9 ч. 1) вытекает, что

$$\int_{k-1}^k f(k) dx \leq \int_{k-1}^k f(x) dx \leq \int_{k-1}^k f(k-1) dx,$$

или

$$f(k) \leq \int_{k-1}^k f(x) dx \leq f(k-1). \quad (1.37)$$

Эти неравенства установлены нами для любого $k \geq m+1$. Запишем их для значений k , равных $m+1, m+2, \dots, n$, где n — любой номер, превосходящий m :

$$\begin{aligned} f(m+1) &\leq \int_m^{m+1} f(x) dx \leq f(m), \\ f(m+2) &\leq \int_{m+1}^{m+2} f(x) dx \leq f(m+1), \\ &\dots \dots \dots \end{aligned}$$

$$f(n) \leq \int_{n-1}^n f(x) dx \leq f(n-1).$$

Складывая почленно записанные неравенства, получим

$$\sum_{k=m+1}^n f(k) \leq \int_m^n f(x) dx \leq \sum_{k=m}^{n-1} f(k). \quad (1.38)$$

Договоримся обозначать символом S_n n -ю частичную сумму ряда (1.34), равную

$$S_n = \sum_{k=m}^n f(k).$$

Приняв это обозначение и учитывая обозначение (1.35), мы можем следующим образом переписать неравенства (1.38):

$$S_n - f(m) \leq a_n \leq S_{n-1}. \quad (1.39)$$

Эти неравенства позволяют без труда доказать теорему. В самом деле, из формулы (1.35) очевидно, что последовательность $\{a_n\}$ является неубывающей. Следовательно для сходимости этой последовательности необходима и достаточна ее ограниченность. Для сходимости ряда (1.34) в силу теоремы 1.2 необходима и достаточна ограниченность последовательности $\{S_n\}$. Из неравенств (1.39) вытекает, что последовательность $\{S_n\}$ ограничена тогда и только тогда, когда ограничена последовательность $\{a_n\}$, т. е. тогда и только тогда, когда последовательность $\{a_n\}$ сходится. Теорема доказана.

Примеры. 1°. Прежде всего применим интегральный признак Коши—Маклорена для выяснения сходимости обобщенного гармонического ряда (1.33). Поскольку ряд (1.33) можно рассматривать как ряд вида (1.34) при $m=1$, $f(x)=1/x^\alpha$ и функция $f(x)$ убывает и положительна на полупрямой $x \geq 1$, вопрос о сходимости ряда (1.33) эквивалентен вопросу о сходимости последовательности $\{a_n\}$, где

$$a_n = \int_1^n \frac{1}{x^\alpha} dx = \begin{cases} \frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} \Big|_{x=1}^{x=n} = \frac{n^{1-\alpha} - 1}{1-\alpha} & \text{при } \alpha \neq 1, \\ \ln x \Big|_{x=1}^{x=n} = \ln n & \text{при } \alpha = 1. \end{cases}$$

Из вида элементов a_n вытекает, что последовательность $\{a_n\}$ расходится при $\alpha \leq 1$ и сходится при $\alpha > 1$, причем в последнем случае $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{\alpha - 1}$. Таким образом, ряд (1.33) расходится при $\alpha \leq 1$ (это мы уже установили выше другим способом) и сходится

при $\alpha > 1$. В частности, при $\alpha = 2$ ряд (1.33) переходит в ряд (1.24), сходимость которого мы теперь можем утверждать.

2°. Исследуем вопрос о сходимости ряда

$$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k \ln^{\beta} k}, \quad (1.40)$$

где β — фиксированное положительное вещественное число. Ряд (1.40) можно рассматривать как ряд вида (1.34) при $m=2$ и $f(x) = \frac{1}{x \ln^{\beta} x}$. Поскольку функция $f(x)$ неотрицательна и невозрастает на полупрямой $x \geq 2$, вопрос о сходимости ряда (1.40) эквивалентен вопросу о сходимости последовательности $\{a_n\}$, где

$$a_n = \int_2^n \frac{1}{x \ln^{\beta} x} dx = \begin{cases} \frac{\ln^{1-\beta} x}{1-\beta} \Big|_{x=2}^{x=n} = \frac{\ln^{1-\beta} n - \ln^{1-\beta} 2}{1-\beta} & \text{при } \beta \neq 1, \\ \ln \ln x \Big|_{x=2}^{x=n} = \ln \ln n - \ln \ln 2 & \text{при } \beta = 1. \end{cases}$$

Из вида элементов a_n вытекает, что последовательность $\{a_n\}$ сходится при $\beta > 1$ и расходится при $\beta \leq 1$. Таким образом, ряд (1.40) сходится при $\beta > 1$ и расходится при $\beta \leq 1$.

5. Признак Раабе. Признаки Даламбера и Коши были основаны на сравнении рассматриваемого ряда с рядом, представляющим собой сумму членов геометрической прогрессии. Естественно, возникает идея о получении более тонких признаков, основанных на сравнении рассматриваемого ряда с другими стандартными рядами, сходящимися или расходящимися «медленнее», чем ряд, составленный из всех членов бесконечно убывающей геометрической прогрессии.

В этом пункте мы установим признак, основанный на сравнении рассматриваемого ряда с изученным в предыдущем пункте стандартным рядом

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{\alpha}} = 1 + \frac{1}{2^{\alpha}} + \frac{1}{3^{\alpha}} + \dots \quad (1.41)$$

Теорема 1.8 (признак Раабе⁷⁾. *Если для всех номеров k , по крайней мере начиная с некоторого номера, справедливо неравенство*

$$k \left(1 - \frac{p_{k+1}}{p_k} \right) \geq q > 1 \quad \left(k \left(1 - \frac{p_{k+1}}{p_k} \right) \leq 1 \right)^{8)}, \quad (1.42)$$

⁷⁾ Иозеф Людвиг Раабе — швейцарский математик (1801—1859).

⁸⁾ Конечно, при этом предполагается, что ряд $\sum_{k=1}^{\infty} p_k$, по крайней мере начиная с некоторого номера, имеет строго положительные члены.

то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} p_k$ сходится (расходится).

II. Если существует предел

$$\lim_{k \rightarrow \infty} k \left(1 - \frac{p_{k+1}}{p_k} \right) = L, \quad (1.43)$$

то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} p_k$ сходится при $L > 1$ и расходится при $L < 1$. Теореме II обычно называют признаком Раабе в предельной форме.

Доказательство. Докажем отдельно теоремы I и II.

1) Для доказательства теоремы I перепишем неравенство (1.42) в виде

$$\frac{p_{k+1}}{p_k} \leq 1 - \frac{q}{k} \left(\frac{p_{k+1}}{p_k} \geq 1 - \frac{1}{k} \right). \quad (1.44)$$

Так как $q > 1$, то найдется некоторое число α , удовлетворяющее неравенствам $q > \alpha > 1$. Разложив функцию $(1+x)^\alpha$ по формуле Маклорена с остаточным членом в форме Пеано (см. п. 2 § 9 гл. 6 ч. 1), будем иметь

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + o(x).$$

Полагая в последней формуле $x = -\frac{1}{k}$, получим

$$\left(1 - \frac{1}{k} \right)^\alpha = 1 - \frac{\alpha}{k} + o\left(\frac{1}{k} \right). \quad (1.45)$$

Поскольку последовательность $\frac{o(1/k)}{1/k}$ является бесконечно малой, то, начиная с некоторого номера k_0 , справедливо неравенство

$$\frac{o\left(\frac{1}{k}\right)}{\frac{1}{k}} \leq q - \alpha. \quad (1.46)$$

Сопоставляя (1.45) и (1.46), получим неравенство

$$\left(1 - \frac{1}{k} \right)^\alpha \geq 1 - \frac{q}{k} \quad (\text{при } k \geq k_0). \quad (1.47)$$

Сравнение неравенств (1.44) и (1.47) дает

$$\frac{p_{k+1}}{p_k} \leq \left(1 - \frac{1}{k} \right)^\alpha \quad \left(\frac{p_{k+1}}{p_k} \geq 1 - \frac{1}{k} \right) \quad (\text{при } k \geq k_0).$$

Последние неравенства можно переписать в виде

$$\frac{p_{k+1}}{p_k} < \frac{\frac{1}{k^\alpha}}{\frac{1}{(k-1)^\alpha}} \left(\frac{p_{k+1}}{p_k} \geq \frac{\frac{1}{k}}{\frac{1}{k-1}} \right) \quad (\text{при } k \geq k_0). \quad (1.48)$$

Поскольку ряд (1.41) сходится при $\alpha > 1$ и расходится при $\alpha = 1$, то неравенства (1.48) и теорема сравнения 1.4 позволяют утверждать, что ряд $\sum_{k=1}^{\infty} p_k$ сходится (расходится). Теорема I доказана.

2) Точно так же, как и в признаках Даламбера и Коши, мы сведем теорему II к теореме I. Пусть сначала $L > 1$. Положим $\varepsilon = (L-1)/2$, $q = 1 + \varepsilon = L - \varepsilon$. По определению предела (1.43) для этого ε можно указать номер k_0 , начиная с которого $\left| k \left(1 - \frac{p_{k+1}}{p_k} \right) - L \right| < \varepsilon$ и, следовательно, справедливо левое неравенство (1.42). Если же $L < 1$, то мы положим $\varepsilon = 1 - L$ и, используя определение предела (1.43), получим, что, начиная с некоторого номера k_0 , справедливо правое неравенство (1.42). Теорема 1.8 полностью доказана.

Замечание. В теореме 1.8 (I) в левом неравенстве (1.42) нельзя взять $q = 1$ (при этом сходимость ряда может не иметь места). При $L = 1$ теорема 1.8 (II) «не действует» (возможны и сходимость и расходимость ряда).

В качестве примера исследуем вопрос о сходимости ряда

$$\sum_{k=2}^{\infty} p_k, \text{ где } p_k = a^{-\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{k-1}\right)}, \quad a = \text{const} > 0.$$

Признаки Даламбера и Коши в применении к этому ряду «не действуют». Применим признак Раабе. Легко проверить, что

$$k \left(1 - \frac{p_{k+1}}{p_k} \right) = \frac{a^{-\frac{1}{k}} - 1}{\left(-\frac{1}{k} \right)}.$$

Последняя дробь при $k \rightarrow \infty$ стремится к производной функции a^x в точке $x=0$, т. е. стремится к $\ln a$. В силу признака Раабе рассматриваемый ряд сходится при $\ln a > 1$, т. е. при $a > e$, и расходится при $\ln a < 1$, т. е. при $a < e$. При $a = e$ вопрос о сходимости ряда требует дополнительного исследования, так как признак Раабе «не действует». Другим примером ряда, в примене-

нии к которому «не действует» признак Раабе, может служить ряд (1.40).

6. Отсутствие универсального ряда сравнения. Мы уже отмечали, что признаки Даламбера и Коши основаны на сравнении рассматриваемого ряда с рядом, составленным из всех членов бесконечно убывающей геометрической прогрессии, а признак Раабе — на сравнении с более медленно сходящимся (или расходящимся) рядом (1.41).

Естественно, возникает вопрос о том, не существует ли такой универсальный (предельно медленно!) сходящийся (или расходящийся) ряд, сравнение с которым позволило бы сделать заключение о сходимости (или расходимости) любого наперед взятого ряда с неотрицательными членами. Докажем, что такого универсального ряда не существует.

Пусть даны два сходящихся ряда $\sum_{k=1}^{\infty} p_k$ и $\sum_{k=1}^{\infty} p'_k$; обозначим символами r_n и r'_n соответственно их n -е остатки. Будем говорить, что ряд $\sum_{k=1}^{\infty} p'_k$ сходится медленнее, чем ряд $\sum_{k=1}^{\infty} p_k$, если

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r_n}{r'_n} = 0.$$

Утверждение. Для каждого сходящегося ряда существует ряд, сходящийся медленнее этого ряда.

В самом деле, пусть $\sum_{k=1}^{\infty} p_k$ — любой сходящийся ряд, r_n ($n \geq 0$) — его n -й остаток⁹⁾. Докажем, что ряд $\sum_{k=1}^{\infty} p'_k$, где $p'_k = \sqrt{r_{k-1}} - \sqrt{r_k}$ сходится медленнее, чем ряд $\sum_{k=1}^{\infty} p_k$. В самом деле, если r'_n — n -й остаток ряда $\sum_{k=1}^{\infty} p'_k$, то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r_n}{r'_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r_n}{\sqrt{r_n}} = 0.$$

Теперь докажем отсутствие универсального сходящегося ряда, сравнение с которым позволило бы сделать заключение о сходимости любого наперед взятого сходящегося ряда. В самом

⁹⁾ За r_0 принимаем всю сумму $\sum_{k=1}^{\infty} p_k$.

деле, если бы такой универсальный сходящийся ряд $\sum_{k=1}^{\infty} p_k$ существовал, то взяв для него построенный выше ряд $\sum_{k=1}^{\infty} p'_k$, мы получили бы, что

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{p_k}{p'_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{r_{k-1} - r_k}{\sqrt{r_{k-1}} - \sqrt{r_k}} = \lim_{k \rightarrow \infty} (\sqrt{r_{k-1}} + \sqrt{r_k}) = 0.$$

Таким образом, из сравнения с рядом $\sum_{k=1}^{\infty} p_k$ нельзя сделать заключения о сходимости ряда $\sum_{k=1}^{\infty} p'_k$. Аналогично доказываются отсутствие универсального расходящегося ряда, сравнение с которым позволило бы сделать заключение о расходимости любого наперед взятого расходящегося ряда.

§ 3. АБСОЛЮТНО И УСЛОВНО СХОДЯЩИЕСЯ РЯДЫ

1. Понятия абсолютно и условно сходящихся рядов. Теперь мы перейдем к изучению рядов, члены которых являются вещественными числами *любого* знака.

Определение 1. Будем называть ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k \quad (1.49)$$

абсолютно сходящимся, если сходится ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} |u_k|. \quad (1.50)$$

Заметим, что в этом определении ничего не сказано о том, предполагается ли при этом сходимость самого ряда (1.49). Оказывается, такое предположение оказалось бы излишним, ибо справедлива следующая теорема.

Теорема 1.9. Из сходимости ряда (1.50) вытекает сходимость ряда (1.49).

Доказательство. Воспользуемся критерием Коши для ряда (т. е. теоремой 1.1). Требуется доказать, что для любого $\varepsilon > 0$ найдется номер N такой, что для всех номеров n , удовлетворяющих условию $n \geq N$, и для любого натурального p справедливо неравенство

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k \right| < \varepsilon. \quad (1.51)$$

Фиксируем любое $\varepsilon > 0$. Так как ряд (1.50) сходится, то в силу теоремы 1.1 найдется номер N такой, что для всех номеров n , удовлетворяющих условию $n \geq N$, и для любого натурального p справедливо неравенство

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} |u_k| < \varepsilon. \quad (1.52)$$

Так как модуль суммы нескольких слагаемых не превосходит суммы их модулей, то

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} |u_k|. \quad (1.53)$$

Сопоставляя неравенства (1.52) и (1.53), получим неравенство (1.51). Теорема доказана.

Определение 2. Ряд (1.49) называется *условно сходящимся*, если этот ряд сходится, в то время как соответствующий ряд из модулей (1.50) расходится.

Примером абсолютно сходящегося ряда может служить ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k^{\alpha}} = 1 - \frac{1}{2^{\alpha}} + \frac{1}{3^{\alpha}} - \frac{1}{4^{\alpha}} + \dots, \text{ где } \alpha > 1.$$

Этот ряд сходится абсолютно, ибо при $\alpha > 1$ сходится ряд (1.33).

Приведем пример условно сходящегося ряда. Докажем условную сходимость ряда

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots \quad (1.54)$$

Так как соответствующий ряд из модулей (гармонический ряд), как мы уже знаем, расходится, то для доказательства условной сходимости ряда (1.54) достаточно доказать, что этот ряд сходится. Докажем, что ряд (1.54) сходится к числу $\ln 2$. В п. 2 § 9 гл. 6 ч. 1 мы получили разложение по формуле Маклорена функции

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + R_{n+1}(x).$$

Там же для всех x из сегмента $0 \leq x \leq 1$ получена следующая оценка остаточного члена:

$$|R_{n+1}(x)| < 1/(n+1).$$

Полагая в двух последних соотношениях $x=1$, будем иметь

$$\ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{n} + R_{n+1}(1),$$

где

$$|R_{n+1}(1)| < 1/(n+1),$$

или

$$\left| \left[1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{n} \right] - \ln 2 \right| < \frac{1}{n+1}. \quad (1.55)$$

Обозначая через S_n n -ю частичную сумму ряда (1.54), мы можем переписать последнее неравенство (1.55) в виде

$$|S_n - \ln 2| < 1/(n+1). \quad (1.56)$$

Из (1.56) следует, что разность $S_n - \ln 2$ представляет собой бесконечно малую последовательность. Это и доказывает сходимость ряда (1.54) к числу $\ln 2$.

2. О перестановке членов условно сходящегося ряда. Одним из важнейших свойств суммы конечного числа вещественных слагаемых является переместительное свойство. Естественно, возникает вопрос, остается ли справедливым это свойство для суммы сходящегося ряда, т. е. может ли измениться сумма сходящегося ряда от перестановки членов этого ряда. В этом пункте мы выясним этот вопрос в отношении условно сходящегося ряда. Начнем рассмотрение с изучения некоторой конкретной перестановки членов ряда (1.54). Для удобства запишем ряд (1.54) в виде

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \dots + \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k}\right) + \dots$$

В конце предыдущего пункта мы доказали, что ряд (1.54) сходится условно и имеет сумму $\ln 2$. Переставим теперь члены ряда (1.54) так, чтобы после одного положительного члена стояли два отрицательных члена. В результате такой перестановки членов получим ряд

$$\begin{aligned} &\left(1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8}\right) + \dots + \\ &+ \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{4k-2} - \frac{1}{4k}\right) + \dots \end{aligned} \quad (1.57)$$

Докажем, что ряд (1.57), полученный в результате указанной перестановки членов ряда (1.54), сходится и имеет сумму, вдвое меньшую, чем ряд (1.54). Будем обозначать m -е частичные суммы рядов (1.54) и (1.57) символами S_m и S'_m соответственно. Можем записать:

$$S'_{3m} = \sum_{k=1}^m \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{4k-2} - \frac{1}{4k} \right) = \sum_{k=1}^m \left(\frac{1}{4k-2} - \frac{1}{4k} \right) = \\ = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^m \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k} \right) = \frac{1}{2} S_{2m}.$$

Итак,

$$S'_{3m} = \frac{1}{2} S_{2m}. \quad (1.58)$$

Далее, очевидно, что

$$S'_{3m-1} = \frac{1}{2} S_{2m} + \frac{1}{4m}, \quad (1.59)$$

$$S'_{3m-2} = S'_{3m-1} + \frac{1}{4m-2}. \quad (1.60)$$

Поскольку $\lim_{m \rightarrow \infty} S_{2m} = S$, в пределе при $m \rightarrow \infty$ из формул (1.58), (1.59) и (1.60) получим

$$\lim_{m \rightarrow \infty} S'_{3m} = \frac{1}{2} S, \quad \lim_{m \rightarrow \infty} S'_{3m-1} = \frac{1}{2} S, \quad \lim_{m \rightarrow \infty} S'_{3m-2} = \frac{1}{2} S.$$

Таким образом, ряд (1.57) сходится и имеет сумму, равную $\frac{1}{2} S$. Так как $S = \ln 2 \neq 0$, то $\frac{1}{2} S \neq S$. Следовательно, в результате указанной выше перестановки членов сумма условно сходящегося ряда (1.54) изменилась. Рассмотренный нами пример показывает, что условно сходящийся ряд *не обладает переместительным свойством*. Полную ясность в вопрос о влиянии перестановок членов на сумму условно сходящегося ряда вносит следующее замечательное утверждение, принадлежащее Риману.

Теорема 1.10 (теорема Римана). *Если ряд сходится условно, то, каково бы ни было наперед взятое число L , можно так переставить члены этого ряда, чтобы преобразованный ряд сходил к числу L .*

Доказательство. Пусть

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k \quad (1.61)$$

произвольный условно сходящийся ряд. Обозначим через $p_1, p_2, p_3, \dots$ положительные члены ряда (1.61), выписанные в таком порядке, в каком они стоят в этом ряде, а через $q_1, q_2, q_3, \dots$ модули отрицательных членов ряда (1.61), выписанные в таком же порядке, в каком они стоят в этом ряде. Ряд (1.61) содержит бес-

конечное число как положительных, так и отрицательных членов, ибо если бы членов одного знака было конечное число, то, отбросив не влияющее на сходимость конечное число первых членов, мы бы получили бы ряд, состоящий из членов одного знака, для которого сходимость означала бы абсолютную сходимость.

Итак, с рядом (1.61) связаны два бесконечных ряда с положительными членами $\sum_{k=1}^{\infty} p_k$ и $\sum_{k=1}^{\infty} q_k$. Будем обозначать первый из этих рядов символом P , а второй — символом Q . Докажем, что оба ряда P и Q являются расходящимися. Обозначим символом S_n n -ю частичную сумму ряда (1.61), символом P_n сумму всех положительных членов, входящих в S_n , символом Q_n сумму модулей всех отрицательных членов, входящих в S_n . Тогда, очевидно, $S_n = P_n - Q_n$, и так как по условию ряд (1.61) сходится к некоторому числу S , то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (P_n - Q_n) = S. \quad (1.62)$$

С другой стороны, так как ряд (1.61) не сходится абсолютно, то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (P_n + Q_n) = +\infty. \quad (1.63)$$

Сопоставляя (1.62) и (1.63), получим $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = +\infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} Q_n = +\infty$, т. е. доказано, что оба ряда P и Q расходятся. Из расходимости рядов P и Q вытекает, что даже после удаления любого конечного числа первых членов этих рядов, мы можем взять из оставшихся членов как ряда P , так и ряда Q столь большое число членов, что их сумма превзойдет любое наперед взятое число.

Опираясь на этот факт, докажем, что можно так переставить члены исходного ряда (1.61), что в результате получится ряд, сходящийся к наперед взятому числу L . В самом деле, выберем из исходного ряда (1.61) ровно столько положительных членов $p_1, p_2, \dots, p_{k_1}$, чтобы их сумма $p_1 + p_2 + \dots + p_{k_1}$ превзошла L . Добавим к выбранным членам ровно столько отрицательных членов $-q_1, -q_2, \dots, -q_{k_2}$, чтобы общая сумма $p_1 + p_2 + \dots + p_{k_1} - q_1 - q_2 - \dots - q_{k_2}$ оказалась меньше L . Затем снова добавим ровно столько положительных членов $p_{k_1+1}, p_{k_1+2}, \dots, p_{k_2}$, чтобы общая сумма $p_1 + p_2 + \dots + p_{k_2} - q_1 - q_2 - \dots - q_{k_2} + p_{k_1+1} + \dots + p_{k_2}$ оказалась больше L . Продолжая аналогичные рассуждения далее, мы получим бесконечный ряд, в состав которого войдут все члены исходного ряда (1.61), так как каждый раз нам придется добавлять хотя бы один положительный или отрицательный член исходного ряда.

Остается доказать, что полученный ряд сходится к L . Заметим, что в полученном ряде последовательно чередуются группы по-

ложительных и группы отрицательных членов. Если частичная сумма полученного ряда заканчивается полностью завершённой группой, то отклонение этой частичной суммы от числа L не превосходит модуля последнего его члена¹⁰⁾. Если же частичная сумма заканчивается не полностью завершённой группой, то отклонение этой частичной суммы от числа L не превосходит модуля последнего члена предпоследней из групп. Для установления сходимости ряда к L достаточно убедиться в том, что модули последних членов групп образуют бесконечно малую последовательность, а это непосредственно вытекает из необходимого условия сходимости исходного ряда (1.61). Теорема Римана доказана.

З а м е ч а н и е. Аналогично можно было бы доказать, что если ряд сходится условно, то его члены можно переставить так, что последовательность частичных сумм преобразованного ряда будет бесконечно большой последовательностью, все элементы которой, начиная с некоторого номера, положительны (соответственно отрицательны).

3. О перестановке членов абсолютно сходящегося ряда. В предыдущем пункте мы доказали, что условно сходящийся ряд не обладает переместительным свойством. Докажем, что для всякого абсолютно сходящегося ряда справедливо переместительное свойство.

Теорема 1.11 (теорема Коши). *Если данный ряд сходится абсолютно, то любой ряд, полученный из данного посредством некоторой перестановки членов, также сходится абсолютно и имеет ту же сумму, что и данный ряд.*

Доказательство. Пусть ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k \quad (1.64)$$

сходится абсолютно и сумма ряда равна S . Пусть, далее,

$$\sum_{k=1}^{\infty} u'_k \quad (1.65)$$

ряд, полученный из ряда (1.64) посредством некоторой перестановки членов. Требуется доказать, что: 1) ряд (1.65) сходится и имеет сумму, равную S ; 2) ряд (1.65) сходится абсолютно. Докажем сначала 1). Достаточно доказать, что для любого $\varepsilon > 0$ найдется номер N такой, что при $n \geq N$

$$\left| \sum_{k=1}^n u'_k - S \right| < \varepsilon. \quad (1.66)$$

¹⁰⁾ Так как мы добавляем в данную группу члены ровно до тех пор, пока общая сумма «не перейдет» через число L .

Фиксируем произвольное $\varepsilon > 0$. Так как ряд (1.64) сходится абсолютно и имеет сумму, равную S , то для выбранного $\varepsilon > 0$ можно указать номер N_0 такой, что будут справедливы неравенства

$$\sum_{k=N_0+1}^{N_0+p} |u_k| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (p - \text{любое натуральное число}) \quad (1.67)$$

и

$$\left| \sum_{k=1}^{N_0} u_k - S \right| < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (1.68)$$

Выберем теперь номер N столь большим, чтобы любая частичная сумма S_n' ряда (1.65) с номером n , превосходящим N , содержала все первые N_0 членов ряда (1.64)¹²⁾.

Оценим разность, стоящую в левой части (1.66), и докажем, что при $n \geq N$ для этой разности справедливо неравенство (1.66). В самом деле, указанную разность можно представить в виде

$$\sum_{k=1}^n u'_k - S = \left(\sum_{k=1}^n u'_k - \sum_{k=1}^{N_0} u_k \right) + \left(\sum_{k=1}^{N_0} u_k - S \right). \quad (1.69)$$

Так как модуль суммы двух величин не превосходит суммы их модулей, то из (1.69) получим

$$\left| \sum_{k=1}^n u'_k - S \right| \leq \left| \sum_{k=1}^n u'_k - \sum_{k=1}^{N_0} u_k \right| + \left| \sum_{k=1}^{N_0} u_k - S \right|. \quad (1.70)$$

Из неравенств (1.68) и (1.70) очевидно, что для доказательства неравенства (1.66) достаточно доказать, что при $n \geq N$

$$\left| \sum_{k=1}^n u'_k - \sum_{k=1}^{N_0} u_k \right| < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (1.71)$$

Для доказательства неравенства (1.71) заметим, что при $n \geq N$ первая из сумм, стоящих в его левой части, содержит все N_0 первых членов ряда (1.64). Вследствие этого разность

$$\sum_{k=1}^n u'_k - \sum_{k=1}^{N_0} u_k \quad (1.72)$$

¹¹⁾ Номер N_0 в неравенствах (1.67) и (1.68) можно взять один и тот же. В самом деле, предварительно записав указанные два неравенства с разными номерами N_0 , мы затем можем взять наибольший из двух номеров N_0 .

¹²⁾ Такой номер N выбрать можно, ибо ряд (1.65) получается из ряда (1.64) посредством некоторой перестановки членов.

представляет собой сумму $n - N_0$ членов ряда (1.64) с номерами, *каждый из которых превосходит N_0* .

Если выбрать натуральное p столь большим, чтобы номер $N_0 + p$ превосходил номера всех $n - N_0$ членов только что указанной суммы, то для разности (1.72) во всяком случае справедливо неравенство

$$\left| \sum_{k=1}^n u'_k - \sum_{k=1}^{N_0} u_k \right| \leq \sum_{k=N_0+1}^{N_0+p} |u_k|. \quad (1.73)$$

Из неравенств (1.73) и (1.67) вытекает неравенство (1.71). Тем самым доказано неравенство (1.66), т. е. доказано, что ряд (1.65) сходится и имеет сумму, равную S . Остается доказать утверждение 2) о том, что ряд (1.65) сходится абсолютно. Доказательство этого утверждения следует из утверждения 1), если его применить к рядам

$$\sum_{k=1}^{\infty} |u_k| \quad \text{и} \quad \sum_{k=1}^{\infty} |u'_k|. \quad (1.74)$$

При этом мы докажем сходимость второго из рядов (1.74), т. е. докажем абсолютную сходимость ряда (1.65). Теорема 1.11 полностью доказана.

§ 4. ПРИЗНАКИ СХОДИМОСТИ ПРОИЗВОЛЬНЫХ РЯДОВ

В § 2 мы установили ряд признаков сходимости для рядов с неотрицательными членами. Здесь мы изучим вопрос о признаках сходимости для рядов с членами любого знака. Итак, пусть

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k \quad (1.75)$$

ряд, члены которого имеют какие угодно знаки. Прежде всего заметим, что для установления абсолютной сходимости этого ряда, т. е. для установления сходимости ряда с положительными членами

$$\sum_{k=1}^{\infty} |u_k|, \quad (1.76)$$

можно применить любой из признаков § 2 (признак Даламбера, Коши, Раабе или интегральный признак). Однако ни один из указанных признаков не дает возможности выяснить более тонкий вопрос об условной сходимости ряда (1.75) ¹³⁾.

¹³⁾ Заметим, что признаки Даламбера и Коши можно применять для установления расходимости ряда с членами любого знака (1.75). В са-

Ниже мы и займемся отысканием более тонких признаков, позволяющих устанавливать сходимость ряда (1.75) и в тех случаях, когда этот ряд не является абсолютно сходящимся.

Начнем рассмотрение с вывода одного важного тождества, представляющего собой основной инструмент для установления формулируемых ниже признаков.

Утверждение. Пусть $\{u_k\}$ и $\{v_k\}$ — две произвольные последовательности, $S_k = u_1 + u_2 + \dots + u_k$, n и p — два произвольных номера ($n \geq 0$, $S_0 = 0$). Тогда справедливо тождество

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} u_k v_k = \sum_{k=n+1}^{n+p-1} S_k (v_k - v_{k+1}) + S_{n+p} v_{n+p} - S_n v_{n+1}, \quad (1.77)$$

называемое преобразованием Абеля.

Так как для любого $k \geq 1$ справедливо равенство $u_k = S_k - S_{k-1}$, то левой части (1.77) можно придать вид

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} u_k v_k = \sum_{k=n+1}^{n+p} S_k v_k - \sum_{k=n+1}^{n+p} S_{k-1} v_k. \quad (1.78)$$

В последней сумме правой части (1.78) заменим индекс суммирования k на $k+1$. В результате получим

$$\begin{aligned} \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k v_k &= \sum_{k=n+1}^{n+p} S_k v_k - \sum_{k=n}^{n+p-1} S_k v_{k+1} = \sum_{k=n+1}^{n+p-1} S_k (v_k - v_{k+1}) + \\ &+ S_{n+p} v_{n+p} - S_n v_{n+1}. \end{aligned}$$

Таким образом, тождество Абеля (1.77) доказано.

В том деле, всякий раз, когда признак Даламбера или Коши констатирует расходимость ряда из модулей $\sum_{k=1}^{\infty} |u_k|$, k -й член ряда (1.76) $|u_k|$ не стремится к нулю при $k \rightarrow \infty$, т. е. ряд (1.75) расходится. В качестве примера установим,

что ряд $\sum_{k=1}^{\infty} k! \left(\frac{x}{k}\right)^k$ расходится для любого фиксированного значения x ,

удовлетворяющего неравенству $|x| > e$. Отметим, что непосредственная проверка того, что k -й член рассматриваемого ряда не стремится к нулю при $k \rightarrow \infty$, является затруднительной. Применим к рассматриваемому ряду признак Даламбера. Обозначая k -й член этого ряда через a_k , будем иметь

$$\begin{aligned} \frac{|a_{k+1}|}{|a_k|} &= \frac{|x|}{\left(1 + \frac{1}{k}\right)^k}, \text{ откуда } \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|a_{k+1}|}{|a_k|} = \frac{|x|}{e} > 1. \text{ Расходимость ряда доказана.} \end{aligned}$$

Определение 1. Последовательность $\{v_k\}$ назовем *последовательностью с ограниченным изменением*, если сходится ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} |v_{k+1} - v_k|. \quad (1.79)$$

Очевидно следующее

Утверждение 2. Всякая последовательность с ограниченным изменением является сходящейся.

В самом деле, из сходимости ряда из модулей (1.79) вытекает сходимость ряда без модулей

$$\sum_{k=1}^{\infty} [v_{k+1} - v_k]. \quad (1.80)$$

Обозначив сумму ряда (1.80) через S , а n -ю частичную сумму этого ряда через S_n и учитывая, что $S_n = v_{n+1} - v_1$, получаем, что $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = \lim_{n \rightarrow \infty} v_{n+1}$ существует и равен $S + v_1$. Это означает, что последовательность $\{v_k\}$ сходится к пределу $S + v_1$.

Теорема 1.12 (первый признак Абеля). Если ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k \quad (1.81)$$

обладает ограниченной последовательностью частичных сумм, а $\{v_k\}$ представляет собой последовательность с ограниченным изменением, сходящуюся к нулю, то ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k v_k \quad (1.82)$$

сходится.

Доказательство. По условию существует число $M > 0$ такое, что последовательность частичных сумм $\{S_n\}$ ряда (1.81) удовлетворяет условию $|S_n| \leq M$.

Фиксируем произвольное $\varepsilon > 0$ и по нему номер N такой, что при $n \geq N$ и для любого натурального p справедливы неравенства

$$|v_n| < \frac{\varepsilon}{3M}. \quad (1.83)$$

$$\sum_{k=n+1}^{n+p-1} |v_{k+1} - v_k| < \frac{\varepsilon}{3M} \quad (1.84)$$

(здесь мы воспользовались сходимостью к нулю последовательности $\{v_k\}$ и сходимостью ряда (1.79)).

В силу тождества Абеля (1.77) и в силу того, что модуль суммы трех величин не превосходит сумму их модулей, получаем

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k v_k \right| \leq \left| \sum_{k=n+1}^{n+p-1} S_k (v_k - v_{k+1}) \right| + |S_{n+p}| \cdot |v_{n+p}| + |S_n| \cdot |v_{n+1}|.$$

Так как для всех номеров n справедливо неравенство $|S_n| \leq M$, то

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k v_k \right| \leq M \sum_{k=n+1}^{n+p-1} |v_{k+1} - v_k| + M|v_{n+p}| + M|v_{n+1}|.$$

Сопоставляя последнее неравенство с (1.83) и (1.84), получаем, что при всех $n \geq N$ и для любого натурального p

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k v_k \right| < \varepsilon, \quad (1.85)$$

а это и означает, что ряд (1.82) сходится (в силу критерия Коши). Теорема 1.12 доказана.

Теорема 1.13 (второй признак Абеля). *Если ряд (1.81) сходится, а $\{v_k\}$ представляет собой совершенно произвольную последовательность с ограниченным изменением, то ряд (1.82) сходится.*

Доказательство. Так как сходящийся ряд (1.81) заведомо обладает ограниченной последовательностью частичных сумм $\{S_n\}$, то существует постоянная $M > 0$ такая, что $|S_n| \leq M$ для всех номеров n .

Обозначим сумму ряда (1.81) через S , а предел последовательности $\{v_k\}$ через v . Тогда можно утверждать, что каждое из произведений $\{S_n v_n\}$ и $\{S_n v_{n+1}\}$ сходится при $n \rightarrow \infty$ к пределу $S \cdot v$, а потому каждая из последовательностей

$$\{S_n v_n - S v\} \text{ и } \{S_n v_{n+1} - S v\} \quad (1.86)$$

является бесконечно малой.

Учитывая это и сходимость ряда (1.79) и фиксируя произвольное $\varepsilon > 0$, мы найдем номер N такой, что при всех $n \geq N$ и для любого натурального p

$$|S_n v_n - S v| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad |S_n v_{n+1} - S v| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad \sum_{k=n+1}^{n+p-1} |v_{k+1} - v_k| < \frac{\varepsilon}{3M}. \quad (1.87)$$

Неравенства (1.87), оценка $|S_n| \leq M$ и тождество Абеля (1.77), переписанное в виде

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} u_k v_k = \sum_{k=n+1}^{n+p-1} S_k (v_k - v_{k+1}) + [S_{n+p} v_{n+p} - S v] + [S v - S_n v_{n+1}],$$

позволяют нам утверждать справедливость неравенства (1.85) (при всех $n \geq N$ и для любого натурального p). В силу критерия Коши теорема 1.13 доказана.

Следствие 1 из теоремы 1.12 (признак Дирихле — Абеля). *Если ряд (1.81) обладает ограниченной последовательностью частичных сумм, а $\{v_k\}$ представляет собой невозрастающую последовательность, сходящуюся к нулю, то ряд (1.82) сходится.*

Достаточно заметить, что невозрастающая сходящаяся к нулю последовательность является последовательностью с ограниченным изменением, ибо для нее n -я частичная сумма S_n ряда (1.79) равна $v_1 - v_{n+1}$ и имеет предел, равный v_1 .

Чтобы сформулировать еще одно следствие из теоремы 1.12 введем понятие ряда Лейбница.

Определение 2. Назовем ряд *знакопередающим*, если все его члены с нечетными номерами положительны, а все члены с четными номерами отрицательны.

Определение 3. Знакопередающий ряд, модули членов которого образуют невозрастающую сходящуюся к нулю последовательность, назовем *рядом Лейбница*.

Следствие 2 из теоремы 1.12 (признаки Лейбница). *Всякий ряд Лейбница сходится.*

В самом деле, всякий ряд Лейбница можно записать в виде

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} v_k = v_1 - v_2 + v_3 - v_4 + \dots, \quad (1.88)$$

где $\{v_k\}$ — невозрастающая сходящаяся к нулю последовательность (все $v_k > 0$). Такой ряд представляет собой частный случай ряда (1.82) при $u_k = (-1)^{k-1}$ с рядом (1.81), обладающим ограниченной последовательностью частичных сумм¹⁴). В таком случае справедливость признака Лейбница вытекает из уже доказанного признака Дирихле — Абеля (следствия 1 из теоремы 1.12).

Замечание. Легко убедиться в том, что для произвольного ряда Лейбница (1.88) последовательность $\{S_{2n}\}$ частичных сумм с четными номерами является неубывающей, а последовательность $\{S_{2n-1}\}$ частичных сумм с нечетными номерами является невозрастающей. Отсюда и из замечания 3 к теореме 3.15 ч. 1 вытекает, что сумма S ряда Лейбница (1.88) для любого номера n удовлетворяет неравенствам

$$S_{2n} \leq S \leq S_{2n-1}.$$

¹⁴) Последовательность S_n частичных сумм ряда (1.81) с членами $u_k = (-1)^{k-1}$ имеет вид 1, 0, 1, 0, ...

Так как $S_{2n-1} - S_{2n} = v_{2n}$, то каждая из сумм S_{2n} и S_{2n-1} отклоняется от S не более чем на v_{2n} . Отсюда и из того, что $v_{2n-1} \geq v_{2n}$, вытекает, что для любого номера n справедлива оценка $|S_n - S| \leq v_n$. Эта оценка играет важную роль для приближенного вычисления суммы ряда Лейбница с помощью его частичной суммы.

Примеры. 1°. Выше с помощью формулы Маклорена для функции $\ln(1+x)$ мы уже доказали сходимость ряда

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k} + \dots$$

Заметим, что сходимость этого ряда сразу вытекает из признака Лейбница.

2°. Изучим вопрос о сходимости ряда

$$1 + \frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{2}{6} + \dots + \frac{1}{3k-2} + \frac{1}{3k-1} - \frac{2}{3k} + \dots$$

Этот ряд является рядом вида (1.82) при $v_k = \frac{1}{k}$, $u_1 = 1$, $u_2 = 1$, $u_3 = -2$, $u_4 = 1$, $u_5 = 1$, $u_6 = -2$, ...

Легко видеть, что последовательность частичных сумм ряда (1.81) с такими u_k имеет вид 1, 2, 0, 1, 2, 0, ..., т. е. является ограниченной.

Так как последовательность $\{1/k\}$ не возрастает и сходится к нулю, то исследуемый ряд сходится по признаку Дирихле — Абеля.

3°. Выясним вопрос о сходимости ряда $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos kx}{k}$, где x — некоторое фиксированное вещественное число. Пользуясь обозначениями теоремы 1.13, положим $u_k = \cos kx$, $v_k = \frac{1}{k}$. Оценим последовательность частичных сумм $\{S_n\}$ ряда $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$. Поскольку для любого номера k

$$\sin\left(k + \frac{1}{2}\right)x - \sin\left(k - \frac{1}{2}\right)x = 2 \sin \frac{x}{2} \cos kx,$$

то, суммируя это соотношение по k от 1 до n , получим

$$\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)x - \sin \frac{x}{2} = 2 \sin \frac{x}{2} \sum_{k=1}^n \cos kx = 2S_n \sin \frac{x}{2}.$$

Отсюда

$$S_n = \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)x - \sin \frac{x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}}.$$

Таким образом, для любого x , не кратного 2π , последовательность частичных сумм $\{S_n\}$ ограничена:

$$|S_n| \leq \frac{1}{\left|\sin \frac{x}{2}\right|}.$$

По теореме 1.13 рассматриваемый ряд сходится для любого значения x , не кратного 2π . Если же x кратно 2π , то рассматриваемый ряд превращается в гармонический и, как доказано выше, расходится.

§ 5. АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НАД СХОДЯЩИМИСЯ РЯДАМИ

В этом параграфе мы рассмотрим вопрос о возможности почленного сложения и перемножения сходящихся рядов.

Теорема 1.14. Если два ряда $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ и $\sum_{k=1}^{\infty} v_k$ сходятся и имеют суммы, соответственно равные U и V , то и ряд $\sum_{k=1}^{\infty} (u_k \pm v_k)$ сходится и имеет сумму, равную $U \pm V$.

Доказательство. Обозначим n -е частичные суммы рядов $\sum_{k=1}^{\infty} (u_k \pm v_k)$, $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ и $\sum_{k=1}^{\infty} v_k$ соответственно через S_n , U_n и V_n . Тогда, очевидно, $S_n = U_n \pm V_n$. Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = U$, $\lim_{n \rightarrow \infty} V_n = V$, то согласно теоремам 3.9 и 3.10 ч. 1 существует предел $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = U \pm V$. Теорема доказана.

Таким образом, любые сходящиеся ряды можно почленно складывать и вычитать. Переходя к вопросу о возможности почленного перемножения рядов, докажем следующее утверждение.

Теорема 1.15. Если два ряда $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ и $\sum_{k=1}^{\infty} v_k$ сходятся абсолютно и имеют суммы, соответственно равные U и V , то ряд, составленный из всех произведений вида $u_k v_l$ ($k=1, 2, \dots$; $l=1, 2, \dots$), занумерованных в каком угодно порядке, также сходится абсолютно и его сумма равна UV .

Доказательство. Обозначим через $w_1, w_2, w_3, \dots$ произведения вида $u_k v_l$ ($k=1, 2, \dots; l=1, 2, \dots$), занумерованные в каком угодно порядке. Докажем, что ряд $\sum_{i=1}^{\infty} |w_i|$ сходится.

Пусть S_n — n -я частичная сумма этого ряда. Сумма S_n состоит из членов вида $|u_k v_l|$. Среди индексов k и l таких членов, входящих в сумму S_n , найдем наибольший индекс, который мы обозначим через m . Тогда

$$S_n \leq (|u_1| + |u_2| + \dots + |u_m|)(|v_1| + |v_2| + \dots + |v_m|). \quad (1.89)$$

В правой части неравенства (1.89) стоит произведение m -х частичных сумм рядов $\sum_{k=1}^{\infty} |u_k|$ и $\sum_{k=1}^{\infty} |v_k|$. В силу сходимости указанных рядов с неотрицательными членами все их частичные суммы (а следовательно, и их произведение) ограничены. Поэтому ограничена и последовательность частичных сумм $\{S_n\}$, а это доказывает сходимость ряда $\sum_{i=1}^{\infty} |w_i|$, т. е. абсолютную сходимость

ряда $\sum_{i=1}^{\infty} w_i$.

Остается доказать, что последний ряд имеет сумму S , равную UV . Так как этот ряд сходится абсолютно, то в силу теоремы 1.11 его сумма S не зависит от порядка, в котором мы его суммируем. Какую бы мы ни взяли последовательность (или подпоследовательность¹⁵⁾) частичных сумм этого ряда, она сходится к числу S . Но в таком случае сумма S ряда $\sum_{i=1}^{\infty} w_i$ заведомо равна UV , так как именно к этому числу сходится подпоследовательность W_m частичных сумм этого ряда вида

$$W_m = (u_1 + u_2 + \dots + u_m)(v_1 + v_2 + \dots + v_m).$$

Теорема доказана.

Произведение рядов $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ и $\sum_{k=1}^{\infty} v_k$ для многих целей удобно записывать в специальном виде:

$$\left(\sum_{k=1}^{\infty} u_k\right)\left(\sum_{k=1}^{\infty} v_k\right) = u_1 v_1 + (u_1 v_2 + u_2 v_1) + \dots + (u_1 v_k + u_2 v_{k-1} + \dots + u_k v_1) + \dots$$

¹⁵⁾ См. утверждение 1° п. 1 § 3 гл. 3 ч. 1.

Теорема 1.16 (теорема Мертенса¹⁶⁾). *Ряд, полученный перемножением двух рядов указанным специальным способом, сходится к произведению сумм перемножаемых рядов в случае, когда один из перемножаемых рядов сходится абсолютно, а другой — сходится хотя бы условно.*

Пусть, например, ряд $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ сходится абсолютно, а ряд $\sum_{k=1}^{\infty} v_k$ сходится хотя бы условно. Обозначим n -е частичные суммы указанных рядов соответственно через U_n и V_n , а их суммы соответственно через U и V . Положим

$$w_n = u_1 v_n + u_2 v_{n-1} + \dots + u_n v_1,$$

$$W_n = w_1 + w_2 + \dots + w_n.$$

Достаточно доказать, что $\lim_{n \rightarrow \infty} W_n = UV$. Элементарно проверяется, что $W_n = u_1 V_n + u_2 V_{n-1} + \dots + u_n V_1$.

В силу сходимости ряда $\sum_{k=1}^{\infty} v_k$ его остаток $\alpha_n = V - V_n$ является бесконечно малой, а следовательно, и ограниченной последовательностью, т. е. существует постоянная M такая, что $|\alpha_n| \leq M$ для всех номеров n . Заметим, что

$$W_n = u_1 (V - \alpha_n) + u_2 (V - \alpha_{n-1}) + \dots + u_n (V - \alpha_1) = U_n V - \beta_n,$$

где $\beta_n = u_1 \alpha_n + u_2 \alpha_{n-1} + \dots + u_n \alpha_1$.

Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = U$, то достаточно доказать, что последовательность $\{\beta_n\}$ является бесконечно малой. Так как ряд $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ сходится абсолютно, то, фиксировав произвольное $\varepsilon > 0$, найдем для него такой номер m , что $\sum_{k=m+1}^{\infty} |u_k| < \frac{\varepsilon}{2M}$. Кроме того, можно утверждать существование постоянной M_1 такой, что $\sum_{k=1}^n |u_k| < M_1$ для любого номера n .

Представив теперь β_n в виде суммы двух сумм

$$\beta_n = [u_1 \alpha_n + \dots + u_m \alpha_{n+1-m}] + [u_{m+1} \alpha_{n-m} + \dots + u_n \alpha_1]$$

и выбрав по найденному номеру m номер n_1 настолько боль-

¹⁶⁾ Мертенс Франц Карл Йозеф — немецкий математик (1840—1927).

шим, что $|\alpha_k| < \frac{\varepsilon}{2M_1}$ при $k > n_1 - m$ (это можно сделать в силу бесконечной малости $\{\alpha_n\}$), с помощью четырех неравенств

$$\sum_{k=m+1}^{\infty} |u_k| < \frac{\varepsilon}{2M}, \quad \sum_{k=1}^n |u_k| \leq M_1, \quad |\alpha_n| \leq M \text{ и } |\alpha_k| < \frac{\varepsilon}{2M_1}$$

(при $k > n_1 - m$)

убедимся в том, что при $n \geq n_1$ каждая квадратная скобка в выражении для β_n по модулю меньше числа $\varepsilon/2$. Отсюда следует, что $|\beta_n| < \varepsilon$ при $n \geq n_1$. В силу произвольности $\varepsilon > 0$ сформулированное утверждение доказано.

Замечание. В случае, если ряды $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ и $\sum_{k=1}^{\infty} v_k$ оба сходятся только условно, почленное перемножение этих рядов даже указанным специальным способом приводит, вообще говоря, к расходящемуся ряду.

Достаточно в качестве каждого из рядов $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ и $\sum_{k=1}^{\infty} v_k$ взять условно сходящийся (по признаку Лейбница) ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{\sqrt{k}}$ и убедиться в том, что для таких рядов определенные выше величины w_n имеют вид

$$w_n = (-1)^{n-1} \left\{ \frac{1}{\sqrt{1}\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{n-1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{1}} \right\}.$$

Так как в фигурных скобках стоит n положительных слагаемых, каждое из которых не меньше числа $1/n$, то $|w_n| \geq 1$, а это означает, что нарушено необходимое условие сходимости ряда

$\sum_{n=1}^{\infty} w_n$ — стремление к нулю его n -го члена.

§ 6. БЕСКОНЕЧНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

1. Основные понятия. К понятию числового ряда близко при-
мыкает понятие бесконечного числового произведения. Пусть дана бесконечная числовая последовательность $v_1, v_2, \dots, v_k, \dots$. Записанное формально выражение вида

$$v_1 v_2 v_3 \dots v_k \dots = \prod_{k=1}^{\infty} v_k \quad (1.90)$$

принято называть бесконечным произведением. Отдельные элементы v_k принято называть членами данного бесконечного произведения. Произведение первых n членов данного бесконечного произведения принято называть n -м частичным произведением и обозначать символом

$$P_n = v_1 v_2 \dots v_n = \prod_{k=1}^n v_k.$$

Бесконечное произведение (1.90) называют сходящимся, если последовательность частичных произведений P_n имеет конечный предел P , отличный¹⁷⁾ от нуля. В случае сходимости бесконечного произведения (1.90) указанный предел P называют значением этого бесконечного произведения и пишут:

$$P = \prod_{k=1}^{\infty} v_k.$$

Отметим, что последнее равенство имеет смысл лишь для сходящегося бесконечного произведения. Ясно, что рассмотрение бесконечных произведений по существу представляет собой новую форму изучения числовых последовательностей, ибо каждому данному бесконечному произведению однозначно соответствует последовательность его частичных произведений и каждой числовой последовательности $\{P_k\}$, все элементы которой отличны от нуля, однозначно соответствует бесконечное произведение, для которого эта последовательность является последовательностью частичных произведений (достаточно положить члены бесконечного произведения равными $v_k = P_k/P_{k-1}$ при $k > 1$ и $v_1 = P_1$).

Теорема 1.17. *Необходимым условием сходимости бесконечного произведения (1.90) является стремление к единице его k -го члена при $k \rightarrow \infty$.*

Доказательство. Пусть бесконечное произведение (1.90) сходится и имеет значение P , отличное от нуля. Тогда $\lim_{k \rightarrow \infty} P_{k-1} = \lim_{k \rightarrow \infty} P_k = P \neq 0$. Поскольку $v_k = P_k/P_{k-1}$, то $\lim_{k \rightarrow \infty} v_k$ существует и равен единице.

Заметим, что на сходимость бесконечного произведения не влияет удаление любого конечного числа членов этого произведения (если среди этих членов нет равных нулю). Поскольку бесконечное произведение, у которого хотя бы один член равен нулю согласно принятому выше определению считается расходящимся, то

¹⁷⁾ Тот факт, что при $P=0$ бесконечное произведение принято считать расходящимся, хотя и носит условный характер, но позволяет провести четкую аналогию между сходимостью рядов и бесконечных произведений.

мы в дальнейшем вообще исключим из рассмотрения бесконечные произведения, у которых хотя бы один член равен нулю.

Примеры.

$$1^\circ. \prod_{k=1}^{\infty} \cos \frac{x}{2^k} = \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{4} \dots \cos \frac{x}{2^k} \dots \quad (1.91)$$

(x — любое фиксированное число).

Докажем, что бесконечное произведение (1.91) при любом $x \neq \pi n$ сходится и имеет значение $\frac{\sin x}{x}$. Подсчитаем n -е частичное произведение

$$P_n = \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{4} \dots \cos \frac{x}{2^n}. \quad (1.92)$$

Умножая обе части (1.92) на $\sin \frac{x}{2^n}$ и последовательно используя формулу для синуса двойного угла $\sin 2y = 2 \sin y \cos y$, получим

$$P_n \sin \frac{x}{2^n} = \frac{1}{2^n} \sin x.$$

Из последней формулы¹⁸⁾ имеем

$$P_n = \frac{\sin x}{x} \left\{ \frac{\left(\frac{x}{2^n} \right)}{\sin \frac{x}{2^n}} \right\}.$$

Поскольку выражение в фигурных скобках стремится к единице при $n \rightarrow \infty$ (в силу первого замечательного предела), то $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n$ существует и равен $\frac{\sin x}{x}$. Тем самым доказано, что бесконечное произведение (1.91) сходится и имеет значение $\frac{\sin x}{x}$ при любом $x \neq \pi n$.

$$2^\circ. \prod_{k=2}^{\infty} \left[1 - \frac{2}{k(k+1)} \right] = \prod_{k=2}^{\infty} \frac{(k-1)(k+2)}{k(k+1)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{4} \dots$$

$$\dots \cdot \frac{(k-1)}{k} \cdot \frac{(k+2)}{(k+1)} \dots \quad (1.93)$$

¹⁸⁾ Мы считаем, что $x \neq 0$. Если $x = 0$, то все члены (1.91) и его значение равны единице.

Докажем, что бесконечное произведение (1.93) сходится и имеет значение $1/3$. Подсчитаем частичное произведение P_n :

$$P_n = \left[\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{(n-1)}{n} \right] \left[\frac{4}{3} \cdot \frac{5}{4} \cdot \frac{6}{5} \cdots \frac{(n+2)}{(n+1)} \right] = \\ = \frac{1}{n} \cdot \frac{n+2}{3}.$$

Таким образом $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{3n}$ существует и равен $1/3$.

2. Связь между сходимостью бесконечных произведений и рядов. Если бесконечное произведение (1.90) сходится, то в силу теоремы 1.17 все его члены v_k , начиная с некоторого номера, положительны¹⁹⁾. Поскольку конечное число первых членов вообще не влияет на сходимость бесконечного произведения, то при изучении вопроса о сходимости бесконечных произведений можно, не ограничивая общности, рассматривать лишь такие бесконечные произведения, у которых все члены положительны.

Теорема 1.18. *Для того чтобы бесконечное произведение (1.90) с положительными членами сходилось, необходимо и достаточно, чтобы сходил ряд*

$$\sum_{k=1}^{\infty} \ln v_k. \quad (1.94)$$

В случае сходимости сумма S ряда (1.94) и значение P произведения (1.90) связаны формулой

$$P = e^S. \quad (1.95)$$

Доказательство. Обозначив через P_n n -е частичное произведение бесконечного произведения (1.90), а через S_n n -ю частичную сумму ряда (1.94), можем записать:

$$S_n = \ln P_n, \quad P_n = e^{S_n}.$$

В силу непрерывности показательной функции для всех значений аргумента и непрерывности логарифмической функции для всех положительных значений аргумента последовательность P_n сходится тогда и только тогда, когда сходится S_n , причем если $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = e^S$. Теорема доказана.

При исследовании на сходимость бесконечного произведения оказывается очень удобным представить его в виде

¹⁹⁾ Так как $\lim_{k \rightarrow \infty} v_k = 1$.

$$\prod_{k=1}^{\infty} (1 + u_k) = (1 + u_1)(1 + u_2) \dots (1 + u_k) \dots \quad (1.96)$$

При этом, конечно, в соответствии с принятым выше предположением будем считать, что все $u_k > -1$.

Теорема 1.18 утверждает, что вопрос о сходимости произведения (1.96) эквивалентен вопросу о сходимости ряда

$$\sum_{k=1}^{\infty} \ln(1 + u_k). \quad (1.97)$$

Теперь мы можем доказать еще одно утверждение.

Теорема 1.19. *Если все u_k (по крайней мере начиная с некоторого номера) сохраняют один и тот же знак, то для сходимости бесконечного произведения (1.96) необходимо и достаточно, чтобы сходился ряд*

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k. \quad (1.98)$$

Доказательство. Поскольку условие $\lim_{k \rightarrow \infty} u_k = 0$ является необходимым и для сходимости ряда (1.98), и для сходимости произведения (1.96), можно считать это условие выполненным как при доказательстве необходимости, так и при доказательстве достаточности. Но из указанного условия и из асимптотической формулы²⁰⁾

$$\ln(1 + y) = y + o(y)$$

вытекает, что

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + u_k)}{u_k} = 1 \quad (1.99)$$

и

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{u_k}{\ln(1 + u_k)} = 1. \quad (1.100)$$

Поскольку по условию теоремы все члены рядов (1.97) и (1.98), начиная с некоторого номера, сохраняют один и тот же знак, условия (1.99) и (1.100) в силу следствия из теоремы сравнения 1.3 позволяют утверждать, что ряд (1.98) сходится тогда и только тогда, когда сходится ряд (1.97). Теорема доказана.

Так же, как и для рядов, для бесконечных произведений вводятся понятия абсолютной и условной сходимостей. Бесконечное произведение (1.96) называется абсолютно сходящимся в том и только в том случае, когда сходится абсолютно

²⁰⁾ См. п. 6 § 10 гл. 6 ч. 1.

ряд (1.97). Теоремы Коши 1.11 и Римана 1.10 позволяют заключить, что абсолютно сходящееся произведение обладает переместительным свойством, в то время как условно сходящееся произведение заведомо им не обладает.

Теорема 1.20. *Бесконечное произведение (1.96) сходится абсолютно тогда и только тогда, когда сходится абсолютно ряд (1.98).*

Для доказательства этой теоремы достаточно доказать, что ряд $\sum_{k=1}^{\infty} |u_k|$ сходится тогда и только тогда, когда сходится ряд

$\sum_{k=1}^{\infty} |\ln(1 + u_k)|$. Это последнее легко вытекает из существования пределов (1.99) и (1.100). Детали рассуждений предоставляем читателю.

Примеры. 1°. Из расходимости гармонического ряда и из теоремы 1.19 вытекает расходимость следующих бесконечных произведений:

$$\prod_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{k}\right) = (1+1) \left(1 + \frac{1}{2}\right) \left(1 + \frac{1}{3}\right) \dots \left(1 + \frac{1}{k}\right) \dots,$$

$$\prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{k+1}\right) = \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{k+1}\right) \dots$$

Легко понять, что первое из указанных произведений расходится к $+\infty$, а второе — к нулю.

2°. Из той же теоремы 1.19 и из сходимости ряда (1.33) при $\alpha > 1$ вытекает сходимость при $\alpha > 1$ следующих бесконечных произведений:

$$\prod_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{k^{\alpha}}\right) = (1+1) \left(1 + \frac{1}{2^{\alpha}}\right) \left(1 + \frac{1}{3^{\alpha}}\right) \dots \left(1 + \frac{1}{k^{\alpha}}\right) \dots,$$

$$\prod_{k=1}^{\infty} \left[1 - \frac{1}{(k+1)^{\alpha}}\right] = \left(1 - \frac{1}{2^{\alpha}}\right) \left(1 - \frac{1}{3^{\alpha}}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{k^{\alpha}}\right) \dots$$

3°. Рассмотрим бесконечное произведение

$$x \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{k^2 \pi^2}\right) = x \left(1 - \frac{x^2}{\pi^2}\right) \left(1 - \frac{x^2}{2^2 \pi^2}\right) \dots \left(1 - \frac{x^2}{k^2 \pi^2}\right) \dots \quad (1.101)$$

Так как ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ сходится, то в силу теорем 1.19 и 1.20 бесконечное произведение (1.101) сходится абсолютно для любого фиксированного значения x , отличного от $l\pi$ (где $l=0, \pm 1, \dots$). В п. 3 мы докажем, что это произведение сходится к значению $\sin x$. Тем самым будет обосновано разложение функции $\sin x$ в бесконечное произведение

$$\sin x = x \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{k^2 \pi^2}\right). \quad (1.102)$$

4°. Из разложения (1.102) с помощью соотношения $\cos x = \frac{\sin 2x}{2 \sin x}$ элементарно получается следующее разложение:

$$\cos x = \prod_{k=1}^{\infty} \left[1 - \frac{4x^2}{(2k-1)^2 \pi^2}\right]. \quad (1.103)$$

Абсолютная сходимость произведения, стоящего в правой части (1.103), для любого x , отличного от $\frac{\pi}{2}(2l-1)$ ($l=0, \pm 1, \dots$),

вытекает из теорем 1.19 и 1.20 и из сходимости ряда $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2}$.

5°. Полагая в разложении (1.102) $x = \frac{\pi}{2}$, получим

$$\frac{2}{\pi} = \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{4k^2}\right) = \prod_{k=1}^{\infty} \frac{4k^2 - 1}{4k^2} = \prod_{k=1}^{\infty} \frac{(2k-1)(2k+1)}{(2k)^2}. \quad (1.104)$$

Из (1.104) получается так называемая формула Валлиса²¹⁾

$$\frac{\pi}{2} = \prod_{k=1}^{\infty} \frac{(2k)^2}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdots \frac{2k}{(2k-1)} \cdot \frac{2k}{(2k+1)} \cdots \quad (1.105)$$

Путем несложных преобразований формулу Валлиса можно привести к виду

$$\frac{\pi}{2} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{2k+1} \left[\frac{2^k k!}{(2k)!} \right]^2. \quad (1.106)$$

²¹⁾ Джон Валлис — английский математик (1616—1703).

Первоначально формулу Валлиса использовали для приближенного вычисления числа π . В настоящее время для вычисления числа π существуют более эффективные методы. Формула Валлиса как в виде (1.105), так и в виде (1.106) представляет интерес для ряда теоретических исследований²²⁾.

3. Разложение функции $\sin x$ в бесконечное произведение. Для удобства разобьем вывод формулы (1.102) на отдельные этапы.

1) Пусть m — любое положительное нечетное число: $m=2n+1$. Прежде всего докажем, что для любого отличного от $k\pi$ ($k=0, \pm 1, \dots$) значения θ ²³⁾ справедлива формула

$$\frac{\sin m\theta}{m \sin \theta} = \left(1 - \frac{\sin^2 \theta}{\sin^2 \frac{\pi}{m}}\right) \left(1 - \frac{\sin^2 \theta}{\sin^2 \frac{2\pi}{m}}\right) \dots \left(1 - \frac{\sin^2 \theta}{\sin^2 \frac{n\pi}{m}}\right),$$

$$n = \frac{m-1}{2}. \quad (1.107)$$

Для вывода формулы (1.107) будем исходить из формулы Муавра²⁴⁾

$$\cos m\theta + i \sin m\theta = (\cos \theta + i \sin \theta)^m.$$

Расписывая правую часть этой формулы с помощью бинома Ньютона и сравнивая мнимые части, получим

$$\sin m\theta = m \cos^{m-1} \theta \sin \theta - \frac{m(m-1)(m-2)}{3!} \cos^{m-3} \theta \sin^3 \theta + \dots$$

Учитывая, что $m=2n+1$, будем иметь

$$\frac{\sin m\theta}{m \sin \theta} = \cos^{2n} \theta - \frac{(m-1)(m-2)}{3!} \cos^{2n-2} \theta \sin^2 \theta + \dots \quad (1.108)$$

В правой части (1.108) все показатели при косинусах и синусах четные, так что если заменить $\cos^2 \theta$ на $1 - \sin^2 \theta$, то в правой части (1.108) получится *многочлен степени n относительно $\sin^2 \theta$* . Положив $z = \sin^2 \theta$, обозначим этот многочлен символом $F(z)$, а его корни символами $a_1, a_2, \dots, a_n$. Так как

²²⁾ В частности, она может быть использована для вывода так называемой формулы Стирлинга (см. § 6 гл. 7). Джеймс Стирлинг — английский математик (1692—1770).

²³⁾ В дальнейшем нас будут интересовать значения θ лишь из интервалов $0 < |\theta| < \pi$.

²⁴⁾ Эта формула получается из определения произведения двух комплексных чисел $(x_1, y_1)(x_2, y_2) = (x_1x_2 - y_1y_2, x_1y_2 + x_2y_1)$ (см. п. 1 § 3 гл. 8 ч. 1). В самом деле, с помощью этого определения по индукции легко установить, что $(\cos \theta, \sin \theta)^n = (\cos n\theta, \sin n\theta)$.

при $\theta \rightarrow 0$ $z = \sin^2 \theta \rightarrow 0$ и левая часть (1.108) стремится к единице, то многочлен $F(z)$ можно представить в виде

$$\frac{\sin m\theta}{m \sin \theta} = F(z) = \left(1 - \frac{z}{\alpha_1}\right) \left(1 - \frac{z}{\alpha_2}\right) \dots \left(1 - \frac{z}{\alpha_n}\right).$$

Остается определить корни $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_n$. Замечая, что эти корни соответствуют нулям функции $\sin m\theta$, получим

$$\alpha_1 = \sin^2 \frac{\pi}{m}, \quad \alpha_2 = \sin^2 \frac{2\pi}{m}, \quad \dots, \quad \alpha_n = \sin^2 \frac{n\pi}{m}.$$

Таким образом, формула (1.107) установлена.

2) Положив в формуле (1.107) $\theta = \frac{x}{m}$ и считая, что $0 < |x| < \pi m$, придадим этой формуле вид

$$\frac{\sin x}{m \sin \frac{x}{m}} = \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{\sin^2 \frac{x}{m}}{\sin^2 \frac{k\pi}{m}}\right). \quad (1.109)$$

Фиксируем любое (отличное от нуля) значение и возьмем два произвольных натуральных числа p и n , удовлетворяющих неравенствам $2 \frac{|x|}{\pi} < p < n = \frac{m-1}{2}$. Тогда формулу (1.109) можно записать в виде

$$\frac{\sin x}{m \sin \frac{x}{m}} = \prod_{k=1}^p \left(1 - \frac{\sin^2 \frac{x}{m}}{\sin^2 \frac{k\pi}{m}}\right) R_p(x), \quad (1.110)$$

где

$$R_p(x) = \prod_{k=p+1}^n \left(1 - \frac{\sin^2 \frac{x}{m}}{\sin^2 \frac{k\pi}{m}}\right). \quad (1.111)$$

Прежде всего оценим $R_p(x)$. Поскольку $2 \frac{|x|}{\pi} < p < n = \frac{m-1}{2}$, то аргументы всех синусов, стоящих в формуле (1.111), принадлежат интервалу $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$. Кроме того, ясно, что для всех k , участвующих в этой формуле, $|x| < \frac{k\pi}{2}$ и, следовательно,

$$0 < \frac{\sin^2 \frac{x}{m}}{\sin^2 \frac{k\pi}{m}} < \frac{\sin^2 \frac{k\pi}{2m}}{\sin^2 \frac{k\pi}{m}} = \frac{1}{4\cos^2 \frac{k\pi}{2m}} < \frac{1}{2}$$

(так как $\frac{k\pi}{m} < \frac{\pi}{2}$, т. е. $\frac{k\pi}{2m} < \frac{\pi}{4}$, и поэтому $\cos^2 \frac{k\pi}{2m} > \frac{1}{2}$).

Для любого β из интервала $0 < \beta < 1/2$ справедливы неравенства $1 > 1 - \beta > e^{-2\beta}$ ²⁵⁾, поэтому для всех номеров k , превосходящих p ,

$$1 > 1 - \frac{\sin^2 \frac{x}{m}}{\sin^2 \frac{k\pi}{m}} > e^{-\frac{2\sin^2 \frac{x}{m}}{\sin^2 \frac{k\pi}{m}}} \quad (1.112)$$

Почленно перемножая неравенства (1.112), записанные для $k=p+1, p+2, \dots, n$, получим следующую оценку для $R_p(x)$:

$$1 > R_p(x) > e^{-2\sin^2 \frac{x}{m} \sum_{k=p+1}^n \frac{1}{\sin^2 \frac{k\pi}{m}}} \quad (1.113)$$

Так как аргумент $\frac{k\pi}{m}$ лежит в первой четверти и для любого β из первой четверти $1 \geq \frac{\sin \beta}{\beta} \geq \frac{2}{\pi}$ ²⁶⁾, то

$$\frac{1}{\sin^2 \frac{k\pi}{m}} < \frac{1}{\left(\frac{2}{\pi}\right)^2 \left(\frac{k\pi}{m}\right)^2} = \frac{m^2}{4k^2} < \frac{m^2}{4} \left[\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right].$$

Таким образом,

$$e^{-2\sin^2 \frac{x}{m} \sum_{k=p+1}^n \frac{1}{\sin^2 \frac{k\pi}{m}}} > e^{-\frac{m^2}{2} \sin^2 \frac{x}{m} \sum_{k=p+1}^n \left[\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right]} = e^{-\frac{m^2}{2p} \sin^2 \frac{x}{m}}.$$

²⁵⁾ Правое из этих неравенств элементарно вытекает из формулы Маклорена: $e^{-2\beta} = 1 - 2\beta + \frac{(2\beta)^2}{2} - \dots < 1 - 2\beta + 2\beta^2 < 1 - \beta$, так как $2\beta^2 < \beta$.

²⁶⁾ Эти неравенства вытекают из того, что отношение $\frac{\sin \beta}{\beta}$ при изменении β от 0 до $\pi/2$ убывает от 1 до $2/\pi$. Факт убывания функции $\frac{\sin \beta}{\beta}$ в свою очередь вытекает из того, что $\left(\frac{\sin \beta}{\beta}\right)' = \frac{\cos \beta}{\beta^2} (\beta - \operatorname{tg} \beta) < 0$ всюду на интервале $0 < \beta < \pi/2$.

Последнее неравенство позволяет следующим образом усилить оценку (1.113):

$$1 > R_p(x) > e^{-\frac{m^2}{2p} \sin^2 \frac{x}{m}}. \quad (1.114)$$

3) Теперь в формуле (1.110) устремим число m к бесконечности, оставляя фиксированными значение x и номер p . Поскольку $\lim_{m \rightarrow \infty} m \sin \frac{x}{m} = x$, $\lim_{m \rightarrow \infty} m^2 \sin^2 \frac{k\pi}{m} = (k\pi)^2$, то существует предел левой части (1.110), равный $\frac{\sin x}{x}$, и предел конечно-

го произведения $\prod_{k=1}^p \left(1 - \frac{\sin^2 \frac{x}{m}}{\sin^2 \frac{k\pi}{m}}\right)$, равный $\prod_{k=1}^p \left(1 - \frac{x^2}{k^2\pi^2}\right)$.

Далее будем считать, что последний предел отличен от нуля, так как, когда он равен нулю, $\sin x = 0$ и разложение (1.102) установлено. Но тогда существует предел $\lim_{m \rightarrow \infty} R_p(x)$. Обозначим этот предел через $\widehat{R}_p(x)$. Из неравенств (1.114), справедливых для любого номера m , и из теоремы 3.13 ч. 1 вытекает, что

$$1 \geq \widehat{R}_p(x) \geq e^{-\frac{x^2}{2p}}. \quad (1.115)$$

Формула (1.110) в пределе при $m \rightarrow \infty$ дает

$$\frac{\sin x}{x} = \prod_{k=1}^p \left(1 - \frac{x^2}{k^2\pi^2}\right) \widehat{R}_p(x). \quad (1.116)$$

4) Остается, сохраняя фиксированным x , устремить в формуле (1.116) номер p к бесконечности. Поскольку левая часть (1.116) не зависит от p , а предел $\lim_{p \rightarrow \infty} \widehat{R}_p(x)$ в силу неравенств (1.115) и теоремы 3.14 ч. 1 существует и равен единице, то существует и предел

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^p \left(1 - \frac{x^2}{k^2\pi^2}\right) = \frac{\sin x}{x}.$$

Таким образом, разложение (1.102) для $\sin x$ установлено.

Замечание. В полной аналогии с разложениями (1.102) для $\sin x$ и (1.103) для $\cos x$ можно получить разложения в бесконечные произведения гиперболических функций

$$\operatorname{sh} x = x \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{x^2}{k^2 \pi^2} \right), \quad \operatorname{ch} x = \prod_{k=1}^{\infty} \left[1 + \frac{4x^2}{(2k-1)^2 \pi^2} \right].$$

Заметим, что из разложений для $\sin x$, $\cos x$, $\operatorname{sh} x$, $\operatorname{ch} x$ немедленно получаются разложения в бесконечные произведения функций $\operatorname{tg} x$, $\operatorname{ctg} x$, $\operatorname{th} x$ и $\operatorname{cth} x$.

§ 7. ОБОБЩЕННЫЕ МЕТОДЫ СУММИРОВАНИЯ РАСХОДЯЩИХСЯ РЯДОВ

Во всей гл. 1 мы называли суммой ряда

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k = u_1 + u_2 + \dots + u_k + \dots \quad (1.117)$$

предел S последовательности $\{S_n\}$ частичных сумм этого ряда (при условии, что этот предел существует).

В ряде задач математического анализа, представляющих как теоретический, так и практический интерес, приходится оперировать с рядами, у которых последовательность частичных сумм не сходится и сумма в указанном выше обычном смысле не существует. Естественно, возникает вопрос об обобщении понятия суммы ряда и о суммировании расходящегося в обычном смысле ряда (1.117) с помощью каких-либо обобщенных методов. В настоящем параграфе мы и остановимся на некоторых обобщенных методах суммирования расходящихся рядов.

Прежде всего дадим общую характеристику тем методам суммирования, которые будут рассматриваться. Разумно требовать, чтобы обобщенное понятие суммы включало в себя обычное понятие суммы. Точнее, ряд, сходящийся в обычном смысле и имеющий обычную сумму S , должен иметь обобщенную сумму, и притом также равную S . Метод суммирования, обладающий указанным свойством, называется **регулярным**.

Далее естественно подчинить понятие обобщенной суммы следующему условию: если ряд $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ имеет обобщенную сум-

му U , а ряд $\sum_{k=1}^{\infty} v_k$ имеет обобщенную сумму V , то ряд

$\sum_{k=1}^{\infty} (Au_k + Bv_k)$, где A и B — любые постоянные, имеет обобщенную сумму $(AU + BV)$. Метод суммирования, удовлетворяющий указанному условию, называется **линейным**. В анализе и в его приложениях, как правило, имеют дело лишь с регулярными линейными методами суммирования. Остановимся на двух

методах обобщенного суммирования, представляющих особый интерес для приложений.

1. Метод Чезаро²⁷⁾ (метод средних арифметических). Говорят, что ряд (1.117) суммируем методом Чезаро, если существует предел средних арифметических сумм этого ряда:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_1 + S_2 + \dots + S_n}{n}. \quad (1.118)$$

При этом предел (1.118) называется обобщенной в смысле Чезаро суммой ряда (1.117).

Линейность метода суммирования Чезаро очевидна. Его регулярность вытекает из леммы 1, доказанной в п. 3 § 2. В самом деле, из указанной леммы вытекает, что если последовательность $\{S_n\}$ частичных сумм ряда (1.117) сходится к числу S , то предел (1.118) существует и также равен S .

Приведем примеры рядов, не сходящихся в обычном смысле, но суммируемых методом Чезаро.

Примеры. 1°. Рассмотрим заведомо расходящийся ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} = 1 - 1 + 1 - 1 + \dots$$

Поскольку все четные частичные суммы S_{2n} этого ряда равны нулю, а все нечетные частичные суммы S_{2n-1} равны единице, то предел (1.118) существует и равен $1/2$. Таким образом, рассматриваемый ряд суммируем методом Чезаро, и его сумма в смысле Чезаро равна $1/2$.

2°. Считая, что x — любое фиксированное вещественное число из интервала $0 < x < 2\pi$, рассмотрим заведомо расходящийся²⁸⁾ ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} \cos kx = \cos x + \cos 2x + \cos 3x + \dots \quad (1.119)$$

Частичная сумма этого ряда S_n уже подсчитана нами в примере 2° § 4:

$$S_n = \frac{\sin \left(n + \frac{1}{2} \right) x - \sin \frac{x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}}.$$

²⁷⁾ Эрнесто Чезаро — итальянский математик (1859—1906).

²⁸⁾ Расходимость ряда (1.119) без труда усматривается из приведенного ниже выражения для его частичной суммы.

Подсчитаем среднее арифметическое частичных сумм:

$$\begin{aligned}\frac{S_1 + S_2 + \dots + S_n}{n} &= \frac{1}{2n \sin \frac{x}{2}} \left[\sum_{m=1}^n \sin \left(m + \frac{1}{2} \right) x \right] - \frac{1}{2} = \\ &= \frac{1}{4n \sin^2 \frac{x}{2}} \left[\sum_{m=1}^n (\cos mx - \cos (m+1)x) \right] - \frac{1}{2} = \\ &= \frac{\cos x - \cos (n+1)x}{4n \sin^2 \frac{x}{2}} - \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

Отсюда очевидно, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_1 + S_2 + \dots + S_n}{n} = -\frac{1}{2}.$$

Таким образом, ряд (1.119) суммируем методом Чезаро, и его сумма в смысле Чезаро равна $(-1/2)$.

2. Метод суммирования Пуассона²⁹⁾ — Абеля. По данному ряду (1.117) составим степенной ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k x^{k-1} = u_1 + u_2 x + u_3 x^2 + \dots + u_k \cdot x^{k-1} + \dots \quad (1.120)$$

Если этот ряд сходится для всех x из интервала $0 < x < 1$ и если его сумма $S(x)$ имеет левое предельное значение $\lim_{x \rightarrow 1-0} S(x)$

в точке $x=1$, то говорят, что ряд (1.117) суммируем методом Пуассона—Абеля. При этом указанное предельное значение называется суммой ряда (1.117) в смысле Пуассона—Абеля.

Линейность метода Пуассона—Абеля не вызывает сомнений. Докажем регулярность этого метода. Пусть ряд (1.117) сходится в обычном смысле и имеет сумму, равную S . Требуется доказать что: 1) ряд (1.120) сходится для любого x из интервала $0 < x < 1$, 2) сумма $S(x)$ ряда (1.120) имеет в точке $x=1$ левое предельное значение, равное S .

Докажем сначала утверждение 1). Так как ряд (1.117) сходится, то последовательность его членов является бесконечно малой и, следовательно, ограниченной, т. е. найдется такое число M , что для всех номеров k

$$|u_k| \leq M. \quad (1.121)$$

²⁹⁾ Симон Дени Пуассон — французский математик (1781—1840).

Используя это неравенство, оценим модуль k -го члена ряда (1.120), считая, что x — любое число из интервала $0 < x < 1$. Получим

$$|u_k x^{k-1}| \leq M |x|^{k-1}.$$

Так как $|x| < 1$, то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} |x|^{k-1}$ сходится. Поэтому в силу замечания 2 к теореме сравнения 1.3 сходится и ряд (1.120).

Докажем теперь утверждение 2). Пусть S_n — n -я частичная сумма ряда (1.117), а S — его обычная сумма. С помощью преобразования Абеля³⁰⁾ легко убедиться в том, что для любого x из интервала $0 < x < 1$ справедливо тождество

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k x^{k-1} = (1-x) \sum_{k=1}^{\infty} S_k x^{k-1}. \quad (1.122)$$

Вычтем тождество (1.122) из следующего очевидного тождества:

$$S = (1-x) \sum_{k=1}^{\infty} S_k x^{k-1}.$$

При этом, обозначая через r_k k -й остаток ряда (1.117), будем иметь

$$S - \sum_{k=1}^{\infty} u_k x^{k-1} = (1-x) \sum_{k=1}^{\infty} r_k x^{k-1},$$

или

$$S - S(x) = (1-x) \sum_{k=1}^{\infty} r_k x^{k-1}. \quad (1.123)$$

Наша цель — доказать, что для любого $\varepsilon > 0$ найдется $\delta > 0$ такое, что левая часть (1.123) меньше ε для всех x , удовлетворяющих неравенствам $1 - \delta < x < 1$. Так как остаток r_k ряда (1.117) стремится к нулю при $k \rightarrow \infty$, то для положительного числа $\varepsilon/2$ найдется номер k_0 такой, что $|r_k| < \varepsilon/2$ при $k \geq k_0$. Таким образом,

$$\left| (1-x) \sum_{k=k_0}^{\infty} r_k x^{k-1} \right| < \frac{\varepsilon}{2} \left| (1-x) \sum_{k=k_0}^{\infty} x^{k-1} \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

³⁰⁾ Преобразование Абеля (1.77) установлено нами в § 4. В рассматриваемом случае следует положить в (1.77) $n=0$, $S_n=0$ и затем устремить p к бесконечности.

Остается доказать, что для x , достаточно близких к единице,

$$\left| (1-x) \sum_{k=1}^{k_0-1} r_k x^{k-1} \right| < \frac{\varepsilon}{2},$$

но это очевидно, так как сумма, стоящая в последнем неравенстве, ограничена. Регулярность метода Пуассона—Абеля доказана.

В качестве примера снова рассмотрим расходящийся ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} = 1 - 1 + 1 - 1 + \dots \quad (1.124)$$

Для этого ряда составим степенной ряд вида (1.120)

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} x^{k-1} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots$$

Очевидно, что последний ряд сходится для всех x из интервала $0 < x < 1$ и имеет сумму, равную $S(x) = 1/(1+x)$. Так как

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} S(x) = \lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{1}{1+x} = \frac{1}{2},$$

то ряд (1.124) суммируем методом Пуассона—Абеля и его сумма в смысле Пуассона—Абеля равна $1/2$.

Обратим внимание на то, что сумма ряда (1.124) в смысле Пуассона—Абеля совпадает с его суммой в смысле Чезаро. Этот факт не является случайным: можно доказать, что если ряд суммируем методом Чезаро, то он суммируем и методом Пуассона—Абеля, причем сумма этого ряда в смысле Чезаро совпадает с его суммой в смысле Пуассона—Абеля. Более того, существуют ряды, суммируемые методом Пуассона—Абеля, но не суммируемые методом Чезаро³¹⁾. Детальное изучение всевозможных методов обобщенного суммирования расходящихся рядов проводится в монографии Г. Харди «Расходящиеся ряды» (М.: ИЛ, 1951).

§ 8. ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ ДВОЙНЫХ И ПОВТОРНЫХ РЯДОВ

Рассмотрим счетное множество бесконечных числовых последовательностей

$$a_{11}, a_{12}, a_{13}, \dots, a_{1n}, \dots;$$

³¹⁾ Таким образом, можно сказать, что метод Пуассона—Абеля является более «сильным» методом суммирования, чем метод Чезаро.

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_{kl} \quad (l = 1, 2, \dots) \quad (1.129)$$

и если сходится ряд

$$\sum_{l=1}^{\infty} \hat{A}_l,$$

в котором $\hat{A}_l$ обозначает сумму l -го ряда (1.129).

С матрицей (1.125) кроме повторных рядов (1.127) и (1.128) связывают еще так называемый двойной ряд

$$\sum_{k,l=1}^{\infty} a_{kl}. \quad (1.130)$$

Определение 3. Двойной ряд (1.130) называется сходящимся, если при независимом стремлении двух индексов m и n к бесконечности существует конечный предел

$$\lim_{\substack{m \rightarrow \infty \\ n \rightarrow \infty}} S_{mn} \quad (1.131)$$

так называемых прямоугольных частичных сумм

$$S_{mn} = \sum_{k=1}^m \sum_{l=1}^n a_{kl}. \quad (1.132)$$

При этом указанный предел (1.131) называют суммой двойного ряда (1.130).

Из этого определения сразу следует, что если двойной ряд (1.130) получен посредством перемножения членов двух сходящихся «одинарных» рядов

$$\sum_{k=1}^{\infty} b_k \quad \text{и} \quad \sum_{l=1}^{\infty} c_l, \quad (1.133)$$

т. е. если члены двойного ряда (1.130) равны $a_{kl} = b_k c_l$, то этот двойной ряд сходится, а его сумма равна произведению сумм рядов (1.133).

Далее заметим, что из (1.132) следует, что для любых $m \geq 2, n \geq 2$

$$a_{mn} = S_{mn} - S_{m(n-1)} - [S_{(m-1)n} - S_{(m-1)(n-1)}].$$

Последнее равенство означает

Утверждение. Необходимым условием сходимости двойного ряда (1.130) является стремление к нулю его общего члена, т. е. существование равного нулю предела

$$\lim_{\substack{m \rightarrow \infty \\ n \rightarrow \infty}} a_{mn}$$

при независимом стремлении m и n к бесконечности.

Докажем следующее утверждение о связи между сходимостью двойного и повторного рядов.

Теорема 1.21. Если сходится двойной ряд (1.130) и если сходятся все ряды по строкам (1.126), то сходится и повторный ряд (1.127), причем к этой же сумме, к которой сходится двойной ряд (1.130).

Доказательство. Переходя при фиксированном m к пределу при $n \rightarrow \infty$ в равенстве (1.132) и учитывая сходимость ряда (1.126) к сумме A_k , получим

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_{mn} = \sum_{k=1}^n A_k. \quad (1.134)$$

Из соотношения (1.134) ясно, что сумма повторного ряда (1.127), которая определяется как предел при $m \rightarrow \infty$ правой части (1.134), есть не что иное, как повторный предел

$$\lim_{m \rightarrow \infty} (\lim_{n \rightarrow \infty} S_{mn}).$$

Остается доказать существование указанного повторного предела в предположении существования предела (1.131) и существования для любого m предела (1.134), а также доказать, что указанный повторный предел равен пределу (1.131).

Из существования равного S предела (1.131) вытекает, что для любого $\varepsilon > 0$ найдутся номера m_0 и n_0 такие, что при $m \geq m_0$, $n \geq n_0$ справедливо неравенство

$$|S_{mn} - S| < \varepsilon.$$

Используя факт существования для любого номера m предела (1.134), из последнего неравенства получаем, что для любого $m \geq m_0$ справедливо неравенство

$$|\lim_{n \rightarrow \infty} S_{mn} - S| \leq \varepsilon,$$

а это и означает, что повторный предел $\lim_{m \rightarrow \infty} (\lim_{n \rightarrow \infty} S_{mn})$ существует и равен S . Теорема доказана.

Как и для обычного ряда с неотрицательными членами справедливо следующее утверждение.

Теорема 1.22. Если все элементы матрицы (1.125) неотрицательны, то для сходимости составленного из этой матрицы двойного ряда (1.130) необходимо и достаточно, чтобы его частичные суммы (1.132) были ограничены.

Доказательство. Необходимость очевидна. Для доказательства достаточности заметим, что из ограниченности множества частичных сумм $\{S_{mn}\}$ вытекает существование точной верхней грани этого множества, которую мы обозначим через S :

$$S = \sup_{\substack{1 \leq m < \infty \\ 1 \leq n < \infty}} S_{mn}.$$

По определению точной верхней грани для любого $\varepsilon > 0$ найдется частичная сумма $S_{m_0 n_0}$ такая, что

$$S - \varepsilon < S_{m_0 n_0} \leq S. \quad (1.135)$$

Для всех номеров m и n , удовлетворяющих условиям $m \geq m_0$, $n \geq n_0$, в силу неотрицательности элементов справедливо неравенство $S_{mn} \geq S_{m_0 n_0}$.

Из этого неравенства и из (1.135) вытекает, что

$$S - \varepsilon \leq S_{mn} \leq S$$

для всех m и n при $m \geq m_0$, $n \geq n_0$. Это и означает существование равного S предела (1.131), т. е. сходимость двойного ряда (1.130).

Определение 4. Двойной ряд (1.130) называется *абсолютно сходящимся*, если сходится двойной ряд

$$\sum_{k,l=1}^{\infty} |a_{kl}|, \quad (1.130')$$

составленный из модулей элементов матрицы (1.125).

Теорема 1.23. Если сходится двойной ряд из модулей (1.130'), то сходится и двойной ряд (1.130).

Доказательство. Положим $p_{kl} = \frac{|a_{kl}| + a_{kl}}{2}$, $q_{kl} = \frac{|a_{kl}| - a_{kl}}{2}$. Тогда

$$a_{kl} = p_{kl} - q_{kl}. \quad (1.136)$$

Здесь p_{kl} и q_{kl} неотрицательны и оба не превосходят $|a_{kl}|$. Кроме того, в силу теоремы 1.22 из сходимости двойного ряда (1.130') вытекает ограниченность его частичных сумм, поэтому и частичные суммы каждого из двойных рядов

$$\sum_{k,l=1}^{\infty} p_{kl} \quad \text{и} \quad \sum_{k,l=1}^{\infty} q_{kl}$$

ограничены. Но тогда в силу теоремы 1.22 эти ряды сходятся. Обозначим их суммы соответственно через P и Q . В силу (1.136) двойной ряд (1.130) сходится к $P - Q$.

Рассмотрим теперь обычный ряд

$$\sum_{r=1}^{\infty} a_r, \quad (1.137)$$

членами которого являются занумерованные в каком угодно порядке элементы матрицы (1.125).

Теорема 1.24. *Рассмотрим четыре ряда: два повторных ряда (1.127) и (1.128), двойной ряд (1.130) и ряд вида (1.137). Если хотя бы один из указанных четырех рядов сходится при замене его членов их абсолютными величинами, то все четыре указанных ряда сходятся и имеют одну и ту же сумму.*

Доказательство. Сначала докажем, что если один из указанных четырех рядов сходится при замене его членов их модулями, то и остальные три ряда сходятся при замене членов их модулями.

Так как для повторных рядов (1.127) и (1.128) рассуждения совершенно аналогичны (нужно только поменять ролями первый и второй индексы у членов), то в дальнейшем мы будем рассматривать только повторный ряд (1.127). Достаточно доказать три утверждения:

I) сходимость повторного ряда (1.127), у которого все члены заменены их модулями, влечет абсолютную сходимость ряда (1.137);

II) абсолютная сходимость ряда (1.137) влечет абсолютную сходимость двойного ряда (1.130);

III) абсолютная сходимость ряда (1.130) влечет сходимость повторного ряда (1.127), у которого все члены заменены их модулями.

Для доказательства утверждения 1 обозначим через S^* сумму повторного ряда (1.127), у которого все члены заменены их модулями, т. е. ряда

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\sum_{l=1}^{\infty} |a_{kl}| \right). \quad (1.127')$$

Тогда при любых m и n

$$\sum_{k=1}^m \sum_{l=1}^n |a_{kl}| \leq S^*. \quad (1.138)$$

Если $S_r^* = |a_1| + |a_2| + \dots + |a_r|$ — произвольная частичная сумма ряда

$$\sum_{r=1}^{\infty} |a_r|, \quad (1.137')$$

получающегося при замене членов ряда (1.137) их модулями, то заведомо можно найти столь большие номера m и n , что все члены ряда (1.137), входящие в его частичную сумму с номером r , будут содержаться в первых m строках и первых n столбцах матрицы (1.125).

Но тогда в силу (1.138) будет справедливо неравенство

$$S_r^* \leq S^*.$$

Это неравенство означает, что последовательность частичных сумм ряда с неотрицательными членами (1.137') ограничена. Следовательно, этот ряд сходится (в силу теоремы 1.2).

Для доказательства утверждения II предположим, что ряд (1.137') сходится. Тогда в силу теоремы 1.2 последовательность его частичных сумм $\{S_r^*\}$ ограничена. Фиксируем произвольную частичную сумму S_{mn}^* двойного ряда из модулей (1.130'). Заведомо найдется номер r настолько большой, что r -я частичная сумма ряда (1.137) будет содержать все члены, входящие в частичную сумму S_{mn} ряда (1.130). Но тогда частичная сумма S_{mn}^* ряда (1.130') не превосходит частичной суммы S_r^* ряда (1.137'). Поэтому множество всех частичных сумм двойного ряда (1.130') ограничено. Таким образом, по теореме 1.22 этот ряд сходится.

Остается доказать утверждение III. Пусть сходится двойной ряд из модулей (1.130'). Для доказательства сходимости повторного ряда из модулей (1.127') в силу теоремы 1.21 достаточно доказать сходимость каждого из рядов

$$\sum_{l=1}^{\infty} |a_{kl}|, \quad k = 1, 2, \dots \quad (1.139)$$

Для этого в силу теоремы 1.2 достаточно доказать, что каждый из рядов (1.139) имеет ограниченную последовательность частичных сумм, но это последнее очевидно, ибо при любом k и любом номере n сумма

$$\sum_{l=1}^n |a_{kl}|$$

ограничена суммой двойного ряда из модулей (1.130').

Теперь нам остается доказать, что суммы всех трех рядов (1.127), (1.130) и (1.137) совпадают³²⁾. Обозначим через S сумму двойного ряда (1.130). Очевидно, что и сумма ряда (1.137) равна S , так как в силу абсолютной сходимости этого ряда его сумма не меняется при изменении порядка следования

³²⁾ Аналогичные рассуждения позволяют заключить, что и сумма повторного ряда (1.128) совпадает с суммами указанных трех рядов.

его членов и этот порядок можно изменить так, что частичные суммы после изменения порядка будут содержать в качестве подмножества частичные суммы S_{mn} двойного ряда (1.130).

Чтобы убедиться в том, что и сумма повторного ряда (1.127) также равна S , достаточно заметить, что из сходимости рядов (1.139) вытекает сходимость рядов (1.126), и сослаться на теорему 1.21. Теорема 1.24 полностью доказана.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ И РЯДЫ

Для представления различных функций в математическом анализе широко используются ряды и последовательности, членами которых являются не числа, а функции, определенные на некотором фиксированном множестве.

Такие ряды и последовательности, называемые функциональными, всесторонне изучаются в настоящей главе.

§ 1. ПОНЯТИЯ СХОДИМОСТИ В ТОЧКЕ И РАВНОМЕРНОЙ СХОДИМОСТИ НА МНОЖЕСТВЕ

1. Понятия функциональной последовательности и функционального ряда. Предположим, что на числовой прямой E^1 или в m -мерном евклидовом пространстве E^m задано некоторое множество $\{x\}$ ¹⁾.

Если каждому числу n из натурального ряда чисел $1, 2, \dots, n, \dots$ ставится в соответствие по определенному закону некоторая функция $f_n(x)$, определенная на множестве $\{x\}$, то множество занумерованных функций $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x), \dots$ мы и будем называть функциональной последовательностью.

Отдельные функции $f_n(x)$ будем называть членами или элементами рассматриваемой последовательности, а множество $\{x\}$, на котором определены все функции $f_n(x)$, будем называть областью определения этой последовательности.

Заметим, что если область определения $\{x\}$ является множеством в m -мерном евклидовом пространстве E^m , то каждая функция $f_n(x)$ является функцией m переменных $f_n(x) = f_n(x_1, x_2, \dots, x_m)$, где $x_1, x_2, \dots, x_m$ — координаты точек x .

Для обозначения функциональной последовательности мы, как правило, будем использовать фигурные скобки: $\{f_n(x)\}$.

Рассмотрим функциональную последовательность $\{u_n(x)\}$, областью определения которой является некоторое множество $\{x\}$.

Формально написанную сумму

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots \quad (2.1)$$

¹⁾ В случае m -мерного евклидова пространства E^m элементами множества $\{x\}$ являются точки $x = (x_1, x_2, \dots, x_m)$ с координатами $x_1, x_2, \dots, x_m$.

бесконечного числа членов указанной функциональной последовательности будем называть функциональным рядом.

При этом отдельные функции $u_n(x)$ мы будем называть членами и рассматриваемого ряда, а множество $\{x\}$, на котором определены эти функции, будем называть областью определения этого ряда.

Как и в случае числового ряда, сумму первых n членов функционального ряда (2.1) будем называть n -й частичной суммой этого ряда.

Отметим, что изучение функциональных рядов совершенно эквивалентно изучению функциональных последовательностей, ибо каждому функциональному ряду (2.1) однозначно соответствует функциональная последовательность

$$S_1(x), S_2(x), \dots, S_n(x), \dots \quad (2.2)$$

её частичных сумм и, наоборот, каждой функциональной последовательности (2.2) однозначно соответствует функциональный ряд (2.1) с членами $u_1(x) = S_1(x)$, $u_n(x) = S_n(x) - S_{n-1}(x)$ при $n \geq 2$.

Примеры. 1°. Рассмотрим последовательность функций $\{f_n(x)\}$, каждая из которых определена на сегменте $0 \leq x \leq 1$ и имеет вид

$$f_n(x) = \begin{cases} \cos \frac{\pi n x}{2} & \text{при } 0 \leq x \leq \frac{1}{n}, \\ 0 & \text{при } \frac{1}{n} < x \leq 1. \end{cases} \quad (2.3)$$

На рис. 2.1 приведены графики функций $f_1(x)$, $f_2(x)$ и $f_n(x)$. Областью определения функциональной последовательности (2.3)




Рис. 2.1

является сегмент $[0, 1]$. Заметим, что каждая функция $f_n(x)$ непрерывна на сегменте $[0, 1]$.

2°. Рассмотрим функциональный ряд

$$1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(x+y)^k}{k!} = 1 + \frac{x+y}{1!} + \frac{(x+y)^2}{2!} + \dots + \frac{(x+y)^n}{n!} + \dots, \quad (2.4)$$

областью определения которого является плоскость $E^2 = \{-\infty < x < \infty, -\infty < y < \infty\}$.

Используя разложение по формуле Маклорена функции

$$e^u = 1 + \frac{u}{1!} + \frac{u^2}{2!} + \dots + \frac{u^n}{n!} + R_{n+1}(u)$$

(см. п. 2 § 9 гл. 6 ч. 1), мы приходим к выводу, что $(n+1)$ -я частичная сумма

$$S_{n+1}(x, y) = 1 + \frac{x+y}{1!} + \frac{(x+y)^2}{2!} + \dots + \frac{(x+y)^n}{n!}$$

ряда (2.4) отличается от функции e^{x+y} на величину $R_{n+1}(x+y)$, где $R_{n+1}(u)$ — остаточный член в формуле Маклорена для e^u .

2. Сходимость функциональной последовательности (функционального ряда) в точке и на множестве. Предположим, что областью определения функциональной последовательности (функционального ряда) является множество $\{x\}$ пространства E^m . Фиксируем произвольную точку $x_0 = (\dot{x}_1, \dot{x}_2, \dots, \dot{x}_m)$ множества $\{x\}$ и рассмотрим все члены функциональной последовательности (функционального ряда) в этой точке x_0 . При этом получим числовую последовательность (числовой ряд).

Если указанная числовая последовательность (числовой ряд) сходится, то говорят, что функциональная последовательность (функциональный ряд) сходится в точке x_0 .

Множество всех точек x_0 , в которых сходится данная функциональная последовательность (функциональный ряд), называется областью сходимости этой последовательности (ряда).

В конкретных ситуациях область сходимости может совпадать с областью определения, являться подмножеством области определения или вообще быть пустым множеством. Соответствующие примеры приведены ниже.

Предположим, что функциональная последовательность $\{f_n(x)\}$ имеет в качестве области сходимости некоторое множество $\{x\}$. Совокупность пределов, взятых для всех точек x множества $\{x\}$, порождает множество всех значений вполне определенной функции $f(x)$, определенной на множестве $\{x\}$. Эту функцию называют предельной функцией функциональной последовательности $\{f_n(x)\}$.

Аналогично, если функциональный ряд (2.1) имеет в качестве области сходимости некоторое множество $\{x\}$, то на этом множестве

ве определена функция $S(x)$, являющаяся предельной функцией последовательности частичных сумм этого ряда и называемая его суммой.

Последовательность (2.3) из рассмотренного в предыдущем пункте примера 1° имеет в качестве области сходимости весь сегмент $0 \leq x \leq 1$. В самом деле, $f_n(0) = 1$ для всех номеров n , т. е. в точке $x=0$, последовательность (2.3) сходится к единице. Если же фиксировать любое x из полусегмента $0 < x \leq 1$, то все функции $f_n(x)$, начиная с некоторого номера (зависящего, конечно, от x), будут в этой точке x равны нулю. Отсюда следует, что в любой точке x полусегмента $0 < x \leq 1$ последовательность (2.3) сходится к нулю.

Итак, последовательность (2.3) сходится на всем сегменте $0 \leq x \leq 1$ к предельной функции $f(x)$, имеющей вид

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{при } x=0, \\ 0 & \text{при } 0 < x \leq 1. \end{cases}$$

График этой функции изображен на рис. 2.2. Сразу же отметим, что эта функция *не является непрерывной на сегменте $[0, 1]$* (она имеет разрыв в точке $x=0$ справа).




Рис. 2.2

Убедимся теперь в том, что ряд (2.4) из рассмотренного в предыдущем пункте примера 2° имеет в качестве области сходимости всю бесконечную плоскость $E^2 = \{-\infty < x < \infty, -\infty < y < \infty\}$.

В самом деле, в п. 2 § 9 гл. 6 ч. 1 доказано, что остаточный член $R_{n+1}(u)$ в формуле Маклорена для функции e^u стремится к нулю при $n \rightarrow \infty$ для любого вещественного u . Это и означает, что $(n+1)$ -я частичная сумма $S_{n+1}(x, y)$ ряда (2.4) отличается от e^{x+y} на величину $R_{n+1}(x+y)$, стремящуюся к нулю

при $n \rightarrow \infty$ в каждой точке (x, y) плоскости E^2 .

Итак, ряд (2.4) сходится на всей плоскости E^2 , и его сумма равна e^{x+y} .

3. Равномерная сходимость на множестве. Предположим, что функциональная последовательность

$$f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x), \dots \quad (2.5)$$

сходится на множестве $\{x\}$ пространства E^m к предельной функции $f(x)$.

Определение 1. Будем говорить, что последовательность (2.5) сходится к функции $f(x)$ равномерно на множестве

$\{x\}$, если для любого $\varepsilon > 0$ найдется номер $N(\varepsilon)$ такой, что для всех номеров n , удовлетворяющих условию $n \geq N(\varepsilon)$, и для всех точек x множества $\{x\}$ справедливо неравенство

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon. \quad (2.6)$$

Замечание 1. В этом определении весьма существенно то, что номер N зависит только от ε и не зависит от точек x , т. е. утверждается, что для любого $\varepsilon > 0$ найдется универсальный номер $N(\varepsilon)$, начиная с которого неравенство (2.6) справедливо сразу для всех точек x множества $\{x\}$.

Замечание 2. Отметим, что равномерная на множестве $\{x\}$ сходимость функциональной последовательности $\{f_n(x)\}$ к функции $f(x)$ эквивалентна бесконечной малости числовой последовательности $\{\varepsilon_n\}$, каждый член ε_n которой представляет собой точную верхнюю грань функции $|f_n(x) - f(x)|$ на множестве $\{x\}$.

Замечание 3. Из определения 1 непосредственно вытекает, что если последовательность $\{f_n(x)\}$ равномерно сходится к $f(x)$ на всем множестве $\{x\}$, то $\{f_n(x)\}$ равномерно сходится к $f(x)$ и на любом подмножестве множества $\{x\}$.

Приведем пример, показывающий, что из сходимости функциональной последовательности $\{f_n(x)\}$ на множестве $\{x\}$ не вытекает, вообще говоря, равномерная сходимость $\{f_n(x)\}$ на этом множестве.

Обратимся к последовательности (2.3) из примера 1°, рассмотренного в п. 1. В п. 2 было доказано, что эта последовательность сходится на всем сегменте $[0, 1]$ к предельной функции

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{при } x = 0, \\ 0 & \text{при } 0 < x \leq 1. \end{cases}$$

Докажем, что эта последовательность *не сходится равномерно* на $[0, 1]$.

Рассмотрим последовательность точек $x_n = 1/(2n)$ ($n = 1, 2, \dots$), принадлежащих сегменту $[0, 1]$. В каждой из этих точек (т. е. для каждого номера n) справедливы соотношения

$$f_n(x_n) = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad f(x_n) = 0.$$

Таким образом, для любого номера n

$$|f_n(x_n) - f(x_n)| = \sqrt{2}/2;$$

следовательно, при $\varepsilon \leq \sqrt{2}/2$ неравенство (2.6) не может выполняться сразу для всех точек x сегмента $[0, 1]$ ни при одном номере n . Это и означает отсутствие равномерной на сегменте $[0, 1]$ сходимости рассматриваемой последовательности.

Отметим, что рассматриваемая последовательность (2.3) сходится к предельной функции $f(x)$ равномерно на каждом сегменте $[\delta, 1]$, где δ — любое фиксированное число из интервала $0 < \delta < 1$. В самом деле, для любого выбранного δ найдется номер N_0 , начиная с которого все элементы $f_n(x)$ равны нулю на всем сегменте $[\delta, 1]$. Так как и предельная функция $f(x)$ равна нулю на сегменте $[\delta, 1]$, то левая часть (2.6) равна нулю на всем сегменте $[\delta, 1]$, начиная с найденного номера N_0 . Таким образом, начиная с номера N_0 , неравенство (2.6) справедливо для всех x из сегмента $[\delta, 1]$ при любом $\epsilon > 0$.

Определение 2. Функциональный ряд называется равномерно сходящимся на множестве $\{x\}$ к сумме $S(x)$, если последовательность $\{S_n(x)\}$ его частичных сумм сходится равномерно на множестве $\{x\}$ к предельной функции $S(x)$.

Заметим, что функциональный ряд (2.4) из примера 2° п. 1 сходится к сумме e^{x+y} равномерно в круге $x^2 + y^2 \leq r^2$ произвольного фиксированного радиуса r . В самом деле, всюду в этом круге $|x| \leq r$, $|y| \leq r$, и потому $|x+y| \leq |x| + |y| \leq 2r$, откуда в силу оценки (6.62*) из п. 2 § 9 гл. 6 ч. 1 получаем, что всюду в указанном круге

$$|R_{n+1}(x+y)| \leq \frac{(2r)^{n+1}}{(n+1)!} e^{2r}.$$

Из последнего неравенства вытекает, что $R_{n+1}(x+y)$ стремится к нулю при $n \rightarrow \infty$ равномерно в круге $x^2 + y^2 \leq r^2$, а это и означает, что ряд (2.4) сходится равномерно в этом круге к сумме e^{x+y} .

4. Критерий Коши равномерной сходимости последовательности (ряда). Справедливы следующие фундаментальные теоремы.

Теорема 2.1. Для того чтобы функциональная последовательность $\{f_n(x)\}$ равномерно на множестве $\{x\}$ сходилась к некоторой предельной функции, необходимо и достаточно, чтобы для произвольного $\epsilon > 0$ нашелся номер $N(\epsilon)$, гарантирующий справедливость неравенства

$$|f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \epsilon \quad (2.7)$$

для всех номеров n , удовлетворяющих условию $n \geq N(\epsilon)$, всех натуральных p ($p=1, 2, \dots$) и всех точек x из множества $\{x\}$.

Теорема 2.2. Для того чтобы функциональный ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) \quad (2.8)$$

равномерно на множестве $\{x\}$ сходилась к некоторой сумме, необходимо и достаточно, чтобы для произвольного $\epsilon > 0$ нашелся номер $N(\epsilon)$, гарантирующий справедливость неравенства

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| < \varepsilon \quad (2.9)$$

для всех номеров n , удовлетворяющих условию $n \geq N(\varepsilon)$, всех натуральных p ($p=1, 2, \dots$) и всех точек x множества $\{x\}$.

Достаточно провести доказательство только теоремы 2.1, так как теорема 2.2 является следствием теоремы 2.1 (заметим, что в левой части (2.9) под знаком модуля стоит разность $S_{n+p}(x) - S_n(x)$ частичных сумм с номерами $n+p$ и n функционального ряда (2.8)).

Доказательство теоремы 2.1. Необходимость. Предположим, что последовательность $\{f_n(x)\}$ сходится равномерно на множестве $\{x\}$ к предельной функции $f(x)$. Тогда, фиксируя произвольное $\varepsilon > 0$, мы найдем для него номер $N(\varepsilon)$ такой, что неравенство

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (2.10)$$

будет справедливо для всех номеров n , удовлетворяющих условию $n \geq N(\varepsilon)$, и для всех точек x множества $\{x\}$.

Если p — любое натуральное число, то при $n \geq N(\varepsilon)$ номер $n+p$ тем более будет удовлетворять условию $n+p \geq N(\varepsilon)$, а поэтому для всех номеров n , удовлетворяющих условию $n \geq N(\varepsilon)$, всех натуральных p и всех точек x множества $\{x\}$ тем более будет справедливо неравенство

$$|f_{n+p}(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (2.11)$$

Так как модуль суммы двух величин не превосходит суммы их модулей, то в силу (2.10) и (2.11) получим, что

$$\begin{aligned} |f_{n+p}(x) - f_n(x)| &= |[f_{n+p}(x) - f(x)] + [f(x) - f_n(x)]| \leq \\ &\leq |f_{n+p}(x) - f(x)| + |f(x) - f_n(x)| < \varepsilon \end{aligned}$$

(для всех номеров n , удовлетворяющих условию $n \geq N(\varepsilon)$, всех натуральных p и всех x из множества $\{x\}$). Необходимость доказана.

Достаточность. Предположим, что для произвольного $\varepsilon > 0$ существует номер $N(\varepsilon)$ такой, что неравенство (2.7) справедливо для всех номеров n , удовлетворяющих условию $n \geq N(\varepsilon)$, всех натуральных p и всех точек x множества $\{x\}$.

Из неравенства (2.7) и из критерия Коши сходимости числовой последовательности (см. п. 3 § 3 гл. 3 ч. 1) вытекает сходимость последовательности $\{f_n(x)\}$ в каждой точке x множества $\{x\}$ и существование определенной в каждой точке x множества $\{x\}$ предельной функции $f(x)$.

Фиксировав произвольный номер n , удовлетворяющий условию $n \geq N(\epsilon)$, и произвольную точку x множества $\{x\}$, перейдем в неравенстве (2.7) к пределу при $p \rightarrow \infty$. Используя теорему 3.13 п. 4 § 1 гл. 3 ч. 1, мы получим, что для произвольного номера n , удовлетворяющего условию $n \geq N(\epsilon)$, и произвольной точки x множества $\{x\}$ справедливо неравенство

$$|f(x) - f_n(x)| \leq \epsilon < 2\epsilon.$$

Это и доказывает, что последовательность $\{f_n(x)\}$ сходится к предельной функции $f(x)$ равномерно на множестве $\{x\}$. Достаточность доказана.

Наличие критерия Коши не снимает вопроса об установлении удобных для приложений достаточных признаков равномерной сходимости функциональных последовательностей и рядов, к которому мы сейчас и переходим.

§ 2. ДОСТАТОЧНЫЕ ПРИЗНАКИ РАВНОМЕРНОЙ СХОДИМОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ И РЯДОВ

В п. 1 § 1 мы убедились в том, что изучение функциональных рядов эквивалентно изучению функциональных последовательностей. С этой точки зрения каждый признак равномерной сходимости имеет две эквивалентные формулировки: одну в терминах функциональных рядов, а другую — в терминах функциональных последовательностей. В зависимости от удобства мы будем формулировать устанавливаемые признаки либо в терминах последовательностей, либо в терминах рядов (а иногда будем приводить обе эквивалентные формулировки).

Теорема 2.3 (признак Вейерштрасса). *Если функциональный ряд*

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) \tag{2.12}$$

определен на множестве $\{x\}$ пространства E^m и если существует сходящийся числовой ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k \tag{2.13}$$

такой, что для всех точек x множества $\{x\}$ и для всех номеров k справедливо неравенство

$$|u_k(x)| \leq c_k, \tag{2.14}$$

то функциональный ряд (2.12) сходится равномерно на множестве $\{x\}$.

Доказательство. Фиксируем произвольное $\varepsilon > 0$. Так как числовой ряд (2.13) сходится, то в силу критерия Коши сходимости числового ряда (см. теорему 1.1 из гл. 1) найдется $N(\varepsilon)$ такое, что

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} c_k < \varepsilon \quad (2.15)$$

для всех номеров n , удовлетворяющих условию $n \geq N(\varepsilon)$, и всех натуральных p .

Из неравенств (2.14) и (2.15) и из того, что модуль суммы p слагаемых не превосходит сумму их модулей, получаем

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} |u_k| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} c_k < \varepsilon$$

(для всех номеров n , удовлетворяющих условию $n \geq N(\varepsilon)$, всех натуральных p и всех точек x множества $\{x\}$).

В силу критерия Коши равномерной сходимости (см. теорему 2.2) ряд (2.12) сходится равномерно на множестве $\{x\}$. Теорема доказана.

Замечание 1. Признак Вейерштрасса кратко может быть сформулирован так: *функциональный ряд сходится равномерно на данном множестве, если его можно мажорировать на этом множестве сходящимся числовым рядом.*

Замечание 2. Признак Вейерштрасса является достаточным, но не необходимым признаком равномерной сходимости функционального ряда. В самом деле, функциональный ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k}$$

сходится равномерно на сегменте $0 \leq x \leq 1$ к сумме $\ln(1+x)$, поскольку (см. п. 2 § 9 гл. 6 ч. 1) разность между $\ln(1+x)$ и n -й частичной суммой этого ряда, равная остаточному члену $R_{n+1}(x)$ в формуле Маклорена для функции $\ln(1+x)$, для всех x из сегмента $0 \leq x \leq 1$ удовлетворяет неравенству

$$|R_{n+1}(x)| \leq 1/(n+1).$$

Однако для данного функционального ряда не существует на сегменте $0 \leq x \leq 1$ мажорирующего его сходящегося числового ряда, так как для каждого номера k

$$\sup_{x \in [0,1]} \left| \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k} \right| = \frac{1}{k},$$

а числовой ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ расходится.

Применим признак Вейерштрасса для установления равномерной сходимости функционального ряда

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(k^2x + ky + z)}{k^2}.$$

Можно утверждать, что этот ряд сходится равномерно во всем трехмерном евклидовом пространстве E^3 , так как для любой точки (x, y, z) этого пространства он может быть мажорирован сходящимся числовым рядом

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}.$$

Теорема 2.4 (признак Дини²⁾). Если последовательность $\{f_n(x)\}$ не убывает (или не возрастает) в каждой точке x замкнутого ограниченного множества $\{x\}$ пространства E^m и сходится на этом множестве к предельной функции $f(x)$ и если все члены последовательности $f_n(x)$ и предельная функция $f(x)$ являются непрерывными на множестве $\{x\}$, то сходимость последовательности $\{f_n(x)\}$ является равномерной на множестве $\{x\}$.

Доказательство. Не ограничивая общности, предположим, что последовательность $\{f_n(x)\}$ не убывает на замкнутом ограниченном множестве $\{x\}$ (случай невозрастающей последовательности сводится к этому случаю умножением всех элементов последовательности на число -1). Положим $r_n(x) = f(x) - f_n(x)$. Последовательность $\{r_n(x)\}$ обладает следующими свойствами:

- 1) все $r_n(x)$ неотрицательны и непрерывны на множестве $\{x\}$;
- 2) $\{r_n(x)\}$ не возрастает на множестве $\{x\}$;
- 3) в каждой точке x множества $\{x\}$ существует предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r_n(x) = 0.$$

Достаточно доказать, что последовательность $\{r_n(x)\}$ сходится к тождественному нулю равномерно на множестве $\{x\}$, т. е. что для любого $\varepsilon > 0$ найдется хотя бы один номер n такой, что $r_n(x) < \varepsilon$ для всех x из множества $\{x\}$. (Тогда в силу невозрастания последовательности $\{r_n(x)\}$ неравенство $r_n(x) < \varepsilon$ будет справедливо и для всех последующих номеров.)

Допустим, что для некоторого $\varepsilon > 0$ не найдется ни одного номера n такого, что $r_n(x) < \varepsilon$ сразу для всех x из множества $\{x\}$. Тогда для любого номера n найдется хотя бы одна точка x_n множества $\{x\}$ такая, что

$$r_n(x_n) \geq \varepsilon. \quad (2.16)$$

В силу ограниченности множества $\{x\}$ и теоремы Больцано—Вейерштрасса (см. теорему 12.1 ч. 1) из последовательности то-

²⁾ Улисс Дини — итальянский математик (1845—1918).

чек $\{x_n\}$ можно выделить подпоследовательность точек $\{x_{n_k}\}$, сходящуюся к некоторой точке x_0 , принадлежащей в силу замкнутости множества $\{x\}$ этому множеству. Так как каждая функция $r_m(x)$ (с любым номером m) является непрерывной в точке x_0 , то для любого номера m

$$\lim_{k \rightarrow \infty} r_m(x_{n_k}) = r_m(x_0). \quad (2.17)$$

С другой стороны, выбрав для каждого номера m превосходящий его номер n_k , получим (в силу невозрастания последовательности $r_m(x)$)

$$r_n(x_{n_k}) \geq r_{n_k}(x_{n_k}).$$

Сопоставление последнего неравенства с неравенством (2.16), справедливым для любого номера n , дает оценку

$$r_m(x_{n_k}) \geq \varepsilon \quad (2.18)$$

(для любого номера n_k , превосходящего фиксированный нами произвольный номер m).

Из (2.17) и (2.18) вытекает, что

$$r_m(x_0) \geq \varepsilon$$

(для любого номера m), а это противоречит сходимости последовательности $\{r_m(x)\}$ в точке x_0 к нулю. Полученное противоречие доказывает теорему.

Замечание 3. В теореме Дини весьма существенно требование монотонности последовательности $\{f_n(x)\}$ на множестве $\{x\}$, так как немонотонная на множестве $\{x\}$ последовательность непрерывных на этом множестве функций может сходиться в каждой точке x множества $\{x\}$ к непрерывной на этом множестве функции $f(x)$, но не сходиться равномерно на множестве $\{x\}$.

Примером может служить последовательность функций $\{f_n(x)\}$, для которой $f_n(x)$ равна $\sin nx$ при $0 \leq x \leq \pi/n$ и равна нулю при $\pi/n < x \leq \pi$. Эта последовательность сходится к $f(x) \equiv 0$ в каждой точке сегмента $0 \leq x \leq \pi$, но не сходится на этом сегменте равномерно, так как $|f_n(x_n) - f(x_n)| = 1$ при $x_n = \pi/2n$ для всех номеров n .

Приведем эквивалентную формулировку теоремы Дини в терминах функциональных рядов.

Теорема 2.4*. Если все члены функционального ряда непрерывны и неотрицательны (или неположительны) на замкнутом ограниченном множестве $\{x\}$ и если в каждой точке множества $\{x\}$ этот ряд сходится и сумма его является непрерывной на множестве $\{x\}$ функцией, то его сходимость является равномерной на множестве $\{x\}$.

В качестве примера применения признака Дини изучим вопрос о характере сходимости последовательности

$$\{(x^2 + y^2)^n\}$$

в круге $x^2 + y^2 \leq 1/4$ радиуса $1/2$ с центром в точке $(0, 0)$. Сходимость является равномерной в этом круге, так как рассматриваемая последовательность сходится в каждой точке этого круга к предельной функции $f(x, y) \equiv 0$, не возрастает в каждой точке круга и состоит из функций, непрерывных в нем.

Чтобы сформулировать еще два признака равномерной сходимости функциональных рядов, введем некоторые новые понятия.

Определение 1. Последовательность $\{f_n(x)\}$ называется равномерно ограниченной на множестве $\{x\}$, если существует такое вещественное число $M > 0$, что для всех номеров n и всех точек x множества $\{x\}$ справедливо неравенство

$$|f_n(x)| \leq M.$$

Определение 2. Функциональная последовательность $\{v_n(x)\}$ называется последовательностью, обладающей на множестве $\{x\}$ равномерно ограниченным изменением, если функциональный ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} |v_{k+1}(x) - v_k(x)| \quad (2.19)$$

сходится равномерно на множестве $\{x\}$.

Отметим сразу же, что всякая последовательность, обладающая на множестве $\{x\}$ равномерно ограниченным изменением, сходится равномерно на множестве $\{x\}$ к некоторой предельной функции. В самом деле, из равномерной на множестве $\{x\}$ сходимости ряда (2.19) и из критерия Коши вытекает равномерная на множестве сходимость ряда

$$\sum_{k=1}^{\infty} [v_{k+1}(x) - v_k(x)], \quad (2.19')$$

n -я частичная сумма $S_n(x)$ которого имеет вид $S_n(x) = v_{n+1}(x) - v_1(x)$.

Из последнего равенства вытекает равномерная сходимость последовательности $\{v_n(x)\}$ к предельной функции $v(x)$, равной $S(x) + v_1(x)$, где $S(x)$ — сумма ряда (2.19').

Теперь мы можем сформулировать и доказать следующие два признака.

Теорема 2.5 (первый признак Абеля). *Если функциональный ряд (2.1)*

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$$

обладает равномерно ограниченной на множестве $\{x\}$ последовательностью частичных сумм, а функциональная последовательность $\{v_n(x)\}$ обладает равномерно ограниченным на множестве $\{x\}$ изменением и имеет предельную функцию, тождественно равную нулю, то функциональный ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} [u_n(x) v_n(x)] \quad (2.20)$$

сходится равномерно на множестве $\{x\}$.

Доказательство. По условию существует число $M > 0$ такое, что последовательность $S_n(x)$ частичных сумм ряда (2.1) для всех номеров n и всех точек x из множества $\{x\}$ удовлетворяет неравенству $|S_n(x)| \leq M$.

Фиксируем произвольное $\varepsilon > 0$ и по нему номер N такой, что для всех n , превосходящих N , всех натуральных p и всех точек x множества $\{x\}$ справедливы неравенства

$$|v_n(x)| < \frac{\varepsilon}{3M}, \quad (2.21)$$

$$\sum_{k=n+1}^{n+p-1} |v_{k+1}(x) - v_k(x)| < \frac{\varepsilon}{3M}. \quad (2.22)$$

Здесь мы воспользовались равномерной на множестве $\{x\}$ сходимостью последовательности $\{v_n(x)\}$ к нулю и равномерной на множестве $\{x\}$ сходимостью ряда (2.19).

В силу тождества Абеля (1.77) и в силу того, что модуль суммы трех величин не превосходит сумму их модулей, имеем

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} [u_k(x) v_k(x)] \right| &\leq \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} S_k(x) [v_k(x) - v_{k+1}(x)] \right| + \\ &+ |S_{n+p}(x)| \cdot |v_{n+p}(x)| + |S_n(x)| \cdot |v_{n+1}(x)|. \end{aligned}$$

Учитывая, что для всех номеров n и всех x из $\{x\}$ справедливо неравенство $|S_n(x)| \leq M$, получим

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} [u_k(x) v_k(x)] \right| &\leq M \sum_{k=n+1}^{n+p-1} |v_{k+1}(x) - v_k(x)| + \\ &+ M |v_{n+p}(x)| + M |v_{n+1}(x)|. \end{aligned}$$

Сопоставление последнего неравенства с (2.21) и (2.22), позволяет записать неравенство

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} [u_k(x) v_k(x)] \right| < \varepsilon,$$

справедливое для всех номеров n , превосходящих N , всех натуральных p и всех точек x множества $\{x\}$, а это и означает, что ряд (2.20) сходится равномерно на множестве $\{x\}$ (в силу теоремы 2.2). Теорема доказана.

Теорема 2.6 (второй признак Абеля). Если функциональный ряд (2.1) сходится равномерно на множестве $\{x\}$ к сумме $S(x)$, ограниченной на этом множестве, а функциональная последовательность $\{v_n(x)\}$ обладает равномерно ограниченным на множестве $\{x\}$ изменением и имеет ограниченную на этом множестве предельную функцию $v(x)$, то функциональный ряд (2.20) сходится равномерно на множестве $\{x\}$.

Доказательство. Будем исходить из тождества Абеля (1.77). Это тождество можно переписать в виде

$$\begin{aligned} \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) v_k(x) &\equiv \sum_{k=n+1}^{n+p-1} S_k(x) [v_k(x) - v_{k+1}(x)] + \\ &+ [S_{n+p}(x) - S_n(x)] v_{n+p}(x) + S_n(x) [v_{n+p}(x) - v_{n+1}(x)]. \end{aligned}$$

(Здесь символом $S_k(x)$ обозначена k -я частичная сумма ряда (2.1).)

Из последнего тождества вытекает неравенство

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) v_k(x) \right| &\leq \sum_{k=n+1}^{n+p-1} |S_k(x)| \cdot |v_{k+1}(x) - v_k(x)| + \\ &+ |S_{n+1}(x) - S_n(x)| \cdot |v_{n+p}(x)| + |S_n(x)| \cdot |v_{n+p}(x) - v_{n+1}(x)|. \end{aligned} \quad (2.23)$$

Так как по условию сумма $S(x)$ ряда (2.1) и предельная функция $v(x)$ последовательности $\{v_n(x)\}$ ограничены на множестве $\{x\}$, то найдутся постоянные M_1 и M_2 такие, что для всех x из множества $\{x\}$

$$|S(x)| \leq M_1, \quad |v(x)| \leq M_2. \quad (2.24)$$

Из неравенств (2.24) и из равномерной на множестве $\{x\}$ сходимости последовательностей $\{S_n(x)\}$ и $\{v_n(x)\}$ к предельным функциям $S(x)$ и $v(x)$ соответственно вытекает существование такого номера N_1 , что для всех точек x множества $\{x\}$ и всех номеров n , удовлетворяющих условию $n \geq N_1$, будут справедливы неравенства

$$|S_n(x)| \leq M_1 + 1, \quad |v_n(x)| \leq M_2 + 1. \quad (2.25)$$

Далее, из равномерной на множестве $\{x\}$ сходимости функциональных рядов (2.1) и (2.19) и из критерия Коши равномерной сходимости вытекает, что для произвольного $\varepsilon > 0$ найдутся номера $N_2(\varepsilon)$ и $N_3(\varepsilon)$ такие, что неравенство

$$|S_{n+p}(x) - S_n(x)| < \frac{\varepsilon}{3(M_2 + 1)} \quad (2.26)$$

будет справедливо для точек x множества $\{x\}$, всех натуральных p и всех номеров n , удовлетворяющих условию $n \geq N_2(\varepsilon)$, а неравенство

$$\sum_{k=n+1}^{n+p-1} |v_{k+1}(x) - v_k(x)| < \frac{\varepsilon}{3(M_1 + 1)} \quad (2.27)$$

— для всех точек x множества $\{x\}$, всех натуральных p и всех номеров n , удовлетворяющих условию $n \geq N_3(\varepsilon)$.

Наконец, из тождества

$$v_{n+p}(x) - v_n(x) = \sum_{k=n+1}^{n+p-1} [v_{k+1}(x) - v_k(x)],$$

из вытекающего из него неравенства

$$|v_{n+p}(x) - v_n(x)| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p-1} |v_{k+1}(x) - v_k(x)|$$

и из неравенства (2.27) получаем

$$|v_{n+p}(x) - v_n(x)| < \frac{\varepsilon}{3(M_1 + 1)} \quad (2.28)$$

для всех точек x множества $\{x\}$, всех натуральных p и всех номеров n , удовлетворяющих условию $n \geq N_3(\varepsilon)$.

Обозначим через $N(\varepsilon)$ наибольший из трех номеров N_1 , $N_2(\varepsilon)$, и $N_3(\varepsilon)$. Тогда при $n \geq N(\varepsilon)$ для всех точек x множества $\{x\}$ и всех натуральных p будет справедливо каждое из четырех неравенств (2.25) — (2.28).

Из этих неравенств и из (2.23) вытекает, что

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) v_k(x) \right| < \varepsilon$$

при всех $n \geq N(\varepsilon)$, всех натуральных p и для всех точек x множества $\{x\}$.

В силу критерия Коши ряд (2.20) сходится равномерно на множестве $\{x\}$. Теорема доказана.

Следствие из теоремы 2.5 (признак Дирихле — Абеля). Если функциональный ряд (2.1) обладает равномерно ограниченной на множестве $\{x\}$ последовательностью частичных сумм, а функциональная последовательность $\{v_n(x)\}$ не возрастает в каждой точке множества $\{x\}$ и равномерно на этом множестве сходится к нулю, то функциональный ряд (2.20) сходится равномерно на множестве $\{x\}$.

Достаточно заметить, что невозрастающая в каждой точке множества $\{x\}$ и сходящаяся равномерно на этом множестве к нулю последовательность $\{v_n(x)\}$ заведомо обладает на множестве $\{x\}$ равномерно ограниченным изменением, так как для нее n -я частичная сумма $S_n(x)$ ряда (2.19) равна $v_1(x) - v_{n+1}(x)$. Поэтому существует равномерный на множестве $\{x\}$ предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} [v_1(x) - v_{n+1}(x)] = v_1(x).$$

В качестве примера изучим вопрос о равномерной сходимости ряда

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin kx}{k + (1 + |x|)^k}. \quad (2.29)$$

Так как последовательность

$$v_n(x) = \frac{1}{n + (1 + |x|)^n}$$

не возрастает в каждой точке бесконечной прямой $-\infty < x < \infty$ и равномерно на этой прямой сходится к нулю, то в силу признака Дирихле—Абеля ряд (2.29) сходится равномерно на любом множестве, на котором ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} \sin kx \quad (2.30)$$

обладает равномерно ограниченной последовательностью частичных сумм.

Для вычисления n -й частичной суммы $S_n(x)$ ряда (2.30) просуммируем тождество

$$2 \sin \frac{x}{2} \sin kx = \cos \left(k - \frac{1}{2} \right) x - \cos \left(k + \frac{1}{2} \right) x$$

по всем номерам k от 1 до n . При этом получим соотношение

$$2 \sin \frac{x}{2} S_n(x) = \cos \frac{x}{2} - \cos \left(n + \frac{1}{2} \right) x,$$

из которого вытекает равенство

$$S_n(x) = \frac{\cos \frac{x}{2} - \cos \left(n + \frac{1}{2}\right) x}{2 \sin \frac{x}{2}}.$$

Следовательно, для всех номеров n справедливо неравенство

$$|S_n(x)| \leq \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|},$$

которое означает, что последовательность частичных сумм ряда (2.30) равномерно ограничена на любом фиксированном сегменте, не содержащем точек $x_m = 2\pi m$, где $m = 0, \pm 1, \dots$ (так как на любом таком сегменте $\left| \sin \frac{x}{2} \right|$ имеет положительную точную нижнюю грань).

Итак, ряд (2.29) сходится равномерно на любом фиксированном сегменте, не содержащем точек $x_m = 2\pi m$, $m = 0, \pm 1, \dots$

В силу второго признака Абеля можно утверждать, что ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left\{ \left[\frac{\sin kx}{k + (1 + |x|)^k} \right] \frac{k + 1 + |x|}{k + |x|} \right\}$$

также сходится равномерно на любом сегменте, не содержащем точек $x_m = 2\pi m$, $m = 0, \pm 1, \dots$, поскольку ряд (2.29) равномерно сходится на таком сегменте, причем к ограниченной сумме, а последовательность $v_k = \frac{k + 1 + |x|}{k + |x|}$ обладает равномерно ограниченным на любом сегменте изменением (так как ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} |v_{k+1} - v_k| = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k + |x|)(k + |x| + 1)}$$

на всей прямой мажорируется сходящимся числовым рядом

$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$) и на всей прямой сходится равномерно к ограниченной функции $v(x) \equiv 1$.

§ 3. ПОЧЛЕННЫЙ ПЕРЕХОД К ПРЕДЕЛУ

Рассмотрим произвольную точку x^0 пространства E^m и произвольное множество $\{x\}$ пространства E^m , для которого эта точка

является предельной. При этом точка x^0 может сама не принадлежать множеству $\{x\}$.

Теорема 2.7. Если функциональный ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) \quad (2.31)$$

сходится равномерно на множестве $\{x\}_0$ к сумме $S(x)$ и у всех членов этого ряда существует в точке x предел

$$\lim_{x \rightarrow x^0} u_k(x) = b_k,$$

то и сумма ряда $S(x)$ имеет в точке x^0 предел, причем

$$\lim_{x \rightarrow x^0} S(x) = \sum_{k=1}^{\infty} [\lim_{x \rightarrow x^0} u_k(x)] = \sum_{k=1}^{\infty} b_k, \quad (2.32)$$

т. е. символ $\lim$ предела и символ Σ суммирования можно переставлять местами (или, как говорят, к пределу можно переходить почленно).

Доказательство. Сначала докажем сходимость числового ряда $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$. В силу критерия Коши, примененного к функциональному ряду (2.31), для любого $\epsilon > 0$ найдется номер $N(\epsilon)$ такой, что

$$|u_{n+1}(x) + u_{n+2}(x) + \dots + u_{n+p}(x)| < \epsilon \quad (2.33)$$

для всех номеров n , удовлетворяющих условию $n \geq N(\epsilon)$, всех натуральных p и всех точек x множества $\{x\}$. Считая в неравенстве (2.33) фиксированными номерами n и p и переходя в этом неравенстве к пределу при $x \rightarrow x^0$ (такой предельный переход можно осуществить по любой последовательности точек множества $\{x\}$, сходящейся к точке x^0), получим

$$|b_{n+1} + b_{n+2} + \dots + b_{n+p}| \leq \epsilon < 2\epsilon$$

(для каждого $n \geq N(\epsilon)$ и каждого натурального p). В силу критерия Коши ряд $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ сходится.

Оценим теперь разность

$$S(x) - \sum_{k=1}^{\infty} b_k$$

для всех точек x множества $\{x\}$ из достаточно малой окрестности точки x . Так как

$$S(x) = \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$$

для всех точек x множества $\{x\}$, то для любого номера n справедливо тождество

$$S(x) - \sum_{k=1}^n b_k = \left[\sum_{k=1}^n u_k(x) - \sum_{k=1}^n b_k \right] + \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x) - \sum_{k=n+1}^{\infty} b_k,$$

из которого получаем неравенство

$$\left| S(x) - \sum_{k=1}^n b_k \right| \leq \left| \sum_{k=1}^n u_k(x) - \sum_{k=1}^n b_k \right| + \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x) \right| + \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} b_k \right|, \quad (2.34)$$

справедливое для всех точек x множества $\{x\}$.

Фиксируем произвольное $\varepsilon > 0$. Так как ряд $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ сходится,

а ряд $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ сходится равномерно на множестве $\{x\}$, то для фиксированного $\varepsilon > 0$ найдется номер n такой, что для всех точек x множества $\{x\}$

$$\left| \sum_{k=n+1}^{\infty} b_k \right| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x) \right| < \frac{\varepsilon}{3}. \quad (2.35)$$

Так как предел конечной суммы равен сумме пределов слагаемых, то для фиксированного нами $\varepsilon > 0$ и выбранного номера n можно указать $\delta > 0$ такое, что

$$\left| \sum_{k=1}^n u_k(x) - \sum_{k=1}^n b_k \right| < \frac{\varepsilon}{3} \quad (2.36)$$

для всех точек x множества $\{x\}$, удовлетворяющих условию $0 < \rho(x, x) < \delta$. Из (2.34) — (2.36) следует, что для всех таких x

$$\left| S(x) - \sum_{k=1}^{\infty} b_k \right| < \varepsilon.$$

Это доказывает существование предела $S(x)$ в точке x , а следовательно, и справедливость равенства (2.32). Теорема доказана.

В терминах функциональных последовательностей теорема 2.7 звучит так:

Теорема 2.7*. Если функциональная последовательность $\{f_n(x)\}$ сходится равномерно на множестве $\{x\}$ к предельной функции $f(x)$ и все элементы этой последовательности имеют предел в точке x , то и предельная функция $f(x)$ имеет предел в точке x , причем

$$\lim_{x \rightarrow x} f(x) = \lim_{x \rightarrow x} (\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\lim_{x \rightarrow x} f_n(x)),$$

т. е. символ $\lim_{n \rightarrow \infty}$ предела последовательности и символ $\lim_{x \rightarrow x}$ предела функции можно переставлять местами (или, как говорят, к пределу при $x \rightarrow x$ можно переходить почленно).

Следствие 1 из теоремы 2.7. Если в условиях теоремы 2.7 дополнительно потребовать, чтобы точка x принадлежала множеству $\{x\}$ и чтобы все члены $u_k(x)$ функционального ряда (2.31) были непрерывны в точке x , то и сумма $S(x)$ этого ряда будет непрерывна в точке x .

В самом деле, в этом случае $b_k = u_k(x)$ и равенство (2.32) принимает вид

$$\lim_{x \rightarrow x} S(x) = \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) = S(x),$$

а это и означает непрерывность суммы $S(x)$ в точке x .

Следствие 2 из теоремы 2.7. Если все члены функционального ряда (функциональной последовательности) непрерывны на плотном в себе множестве $\{x\}$ ³⁾ и если этот функциональный ряд (эта функциональная последовательность) сходится равномерно на множестве $\{x\}$, то и сумма указанного ряда (предельная функция указанной последовательности) непрерывна на множестве $\{x\}$.

Для доказательства достаточно применить предыдущее следствие к каждой точке x множества $\{x\}$.

³⁾ Напомним, что множество $\{x\}$ называется плотным в себе, если каждая его точка является предельной точкой этого множества.

§ 4. ПОЧЛЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ И ПОЧЛЕННОЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ И РЯДОВ

1. Почленное интегрирование. Докажем следующую основную теорему.

Теорема 2.8. Если функциональная последовательность $\{f_n(x)\}$ сходится к предельной функции $f(x)$ равномерно на сегменте $[a, b]$ и если каждая функция $f_n(x)$ интегрируема на сегменте $[a, b]$, то и предельная функция $f(x)$ интегрируема на этом сегменте, причем указанную последовательность можно интегрировать на сегменте $[a, b]$ почленно, т. е. предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx$$

существует и равен $\int_a^b f(x) dx$.

Доказательство. Сначала докажем, что предельная функция $f(x)$ интегрируема на сегменте $[a, b]$.

Фиксируем произвольное $\varepsilon > 0$. Достаточно доказать, что для предельной функции $f(x)$ найдется хотя бы одно разбиение сегмента $[a, b]$, для верхней суммы S и нижней суммы s которого справедливо неравенство $S - s < \varepsilon$ (см. п. 1 § 3 гл. 9 ч. 1).

Для этого достаточно доказать, что для фиксированного нами произвольного $\varepsilon > 0$ найдется такой номер n , что для любого разбиения сегмента $[a, b]$ верхняя сумма S и нижняя сумма s функции $f(x)$ и верхняя сумма S_n и нижняя сумма s_n функции $f_n(x)$ связаны неравенством

$$S - s \leq (S_n - s_n) + \frac{\varepsilon}{2}. \quad (2.37)$$

(В самом деле, если для любого разбиения будет доказана справедливость для некоторого номера n неравенства (2.37), то в силу интегрируемости на $[a, b]$ функции $f_n(x)$ разбиение можно выбрать так, что будет справедливо неравенство $S_n - s_n < \frac{\varepsilon}{2}$,

из которого в силу (2.37) следует $S - s < \varepsilon$, что и завершает доказательство интегрируемости на $[a, b]$ функции $f(x)$.) Рассмотрим произвольное разбиение $\{x_k\}$ ($k=1, 2, \dots, m$) сегмента $[a, b]$ и обозначим символом $\omega_k(f_n)$ колебание⁴⁾ на k -м частичном сегменте $[x_{k-1}, x_k]$ функции $f_n(x)$, а символом $\omega_k(f)$ колебание на том же частичном сегменте предельной функции $f(x)$.

⁴⁾ Напомним, что колебанием функции на любом сегменте называется разность между точной верхней и точной нижней границами этой функции на указанном сегменте.

Неравенство (2.37) будет доказано, если мы установим, что для достаточно большого номера n справедливо неравенство

$$\omega_k(f) \leq \omega_k(f_n) + \frac{\varepsilon}{2(b-a)}. \quad (2.38)$$

(В самом деле, умножая (2.38) на длину $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$ частичного сегмента $[x_{k-1}, x_k]$ и суммируя получающееся при этом неравенство по всем $k=1, 2, \dots, m$, получим неравенство (2.37).)

Установим для любого частичного сегмента $[x_{k-1}, x_k]$ и для любого достаточно большого номера n справедливость неравенства (2.38). Для любого номера n и любых двух точек x' и x'' сегмента $[x_{k-1}, x_k]$ справедливо тождество

$$f(x') - f(x'') \equiv [f(x') - f_n(x')] + [f_n(x') - f_n(x'')] + [f_n(x'') - f(x'')],$$

из которого вытекает неравенство

$$|f(x') - f(x'')| \leq |f(x') - f_n(x')| + |f_n(x') - f_n(x'')| + |f_n(x'') - f(x'')|. \quad (2.39)$$

В силу равномерной на сегменте $[a, b]$ сходимости последовательности $\{f_n(x)\}$ к функции $f(x)$ для фиксированного нами произвольного $\varepsilon > 0$ найдется номер n такой, что для всех точек x сегмента $[a, b]$

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{4(b-a)}. \quad (2.40)$$

Используя в правой части (2.39) неравенство (2.40), взятое для точки $x=x'$ и для точки $x=x''$, получим из (2.39)

$$|f(x') - f(x'')| \leq |f_n(x') - f_n(x'')| + \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \quad (2.41)$$

(для выбранного нами достаточно большого номера n и для любых двух точек x' и x'' сегмента $[x_{k-1}, x_k]$).

Так как при любом расположении точек x' и x'' на сегменте $[x_{k-1}, x_k]$ справедливо неравенство

$$|f_n(x') - f_n(x'')| \leq \omega_k(f_n),$$

то из (2.41) получим

$$|f(x') - f(x'')| \leq \omega_k(f_n) + \frac{\varepsilon}{2(b-a)}. \quad (2.42)$$

Заметим, что неравенство (2.42) справедливо при любом расположении точек x' и x'' на частичном сегменте $[x_{k-1}, x_k]$.

Обозначая точную верхнюю и точную нижнюю грани функции $f(x)$ на указанном частичном сегменте соответственно через M_k и m_k , в силу определения точных граней найдем две последова-

тельности точек $\{x_p'\}$ и $\{x_p''\}$ ($p=1, 2, \dots$) сегмента $[x_{k-1}, x_k]$ такие, что

$$\lim_{p \rightarrow \infty} x_p' = M_k, \quad \lim_{p \rightarrow \infty} x_p'' = m_k.$$

В силу (2.42) для любого номера p

$$|f(x_p') - f(x_p'')| \leq \omega_k(f_n) + \frac{\varepsilon}{2(b-a)}. \quad (2.43)$$

Переходя в неравенстве (2.43) к пределу при $p \rightarrow \infty$ и замечая, что предел левой части (2.43) равен $M_k - m_k = \omega_k(f)$, получим в пределе из (2.43) требуемое неравенство (2.38).

Таким образом, доказательство интегрируемости предельной функции $f(x)$ на сегменте $[a, b]$ завершено.

Заметим, что если бы мы в условиях теоремы 2.8 дополнительно потребовали непрерывности каждой функции $f_n(x)$ на сегменте $[a, b]$ (что делается в большинстве учебников по математическому анализу), то доказательство интегрируемости предельной функции $f(x)$ на сегменте $[a, b]$ стало бы совсем тривиальным: в силу следствия 2 из теоремы 2.7 при таком дополнительном требовании предельная функция $f(x)$ являлась бы непрерывной на сегменте $[a, b]$, а потому и интегрируемой на этом сегменте.

Остается доказать второе утверждение теоремы 2.8 о том, что интегрирование последовательности $\{f_n(x)\}$ на сегменте $[a, b]$ можно производить почленно. Достаточно доказать, что для любого $\varepsilon > 0$ найдется номер $N(\varepsilon)$ такой, что для всех $n \geq N(\varepsilon)$

$$\left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| < \varepsilon.$$

Но это вытекает из того, что в силу равномерной сходимости $\{f_n(x)\}$ к $f(x)$ на сегменте $[a, b]$ существует номер $N(\varepsilon)$ такой, что для всех x из сегмента $[a, b]$ и для всех номеров n , удовлетворяющих условию $n \geq N(\varepsilon)$,

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}. \quad (2.44)$$

Из неравенства (2.44) и из известных оценок из теории определенного интеграла⁵⁾ получим

⁵⁾ Имеются в виду следующие установленные в п. 2 § 4 гл. 9 ч. 1 оценки: 1) если $F(x)$ интегрируема на $[a, b]$, то и $|F(x)|$ интегрируема на $[a, b]$, причем $\left| \int_a^b F(x) dx \right| \leq \int_a^b |F(x)| dx$; 2) если $f(x)$ и $g(x)$ интегрируемы на сегменте

$[a, b]$ и всюду на этом сегменте $f(x) \leq g(x)$, то $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$.

$$\left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| = \left| \int_a^b [f_n(x) - f(x)] dx \right| \leq \\ \leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx \leq \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \int_a^b dx = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

Доказательство теоремы 2.8 полностью завершено.

Приведем формулировку теоремы 2.8 в терминах функциональных рядов:

Теорема 2.8*. Если функциональный ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$$

сходится к своей сумме $S(x)$ равномерно на сегменте $[a, b]$ и если каждый член этого ряда $u_k(x)$ представляет собой функцию, интегрируемую на сегменте $[a, b]$, то и сумма $S(x)$ интегрируема на сегменте $[a, b]$, причем указанный ряд можно интегрировать на сегменте $[a, b]$ почленно, т. е. можно утверждать, что числовой ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b u_k(x) dx$$

сходится и имеет своей суммой $\int_a^b S(x) dx$.

Замечание. В следующей главе будет указан аналог теоремы 2.8 (см. теорему 3.9) для случая, когда функциональная последовательность определена и интегрируема в некоторой области m -мерного евклидова пространства E^m (при $m \geq 2$).

2. Почленное дифференцирование. В дальнейшем под словами «функция $f(x)$ имеет производную на сегменте $[a, b]$ » мы будем подразумевать, что функция $f(x)$ имеет обычную (двустороннюю) производную в любой внутренней точке сегмента $[a, b]$, правую производную $f'(a+0)$ в точке a и левую производную $f'(b-0)$ в точке b .

Теорема 2.9. Если каждая функция $f_n(x)$ имеет производную на сегменте $[a, b]$, причем последовательность производных сходится равномерно на сегменте $[a, b]$, а сама последовательность $\{f_n(x)\}$ сходится хотя бы в одной точке x_0 сегмента $[a, b]$, то последовательность $\{f_n(x)\}$ сходится к некоторой предельной функции $f(x)$ равномерно на сегменте $[a, b]$, причем эту последовательность можно дифференцировать на сегменте $[a, b]$ почленно, т. е. всюду на сегменте $[a, b]$ предельная функция

имеет производную⁶⁾ $f'(x)$, являющуюся предельной функцией последовательности $\{f'_n(x)\}$.

Доказательство. Докажем сначала, что последовательность $\{f_n(x)\}$ сходится равномерно на сегменте $[a, b]$. Из сходимости числовой последовательности $\{f_n(x_0)\}$ и из равномерной на сегменте $[a, b]$ сходимости $\{f'_n(x)\}$ следует, что для любого $\varepsilon > 0$ найдется номер $N(\varepsilon)$ такой, что

$$|f_{n+p}(x_0) - f_n(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad |f'_{n+p}(x) - f'_n(x)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \quad (2.45)$$

для всех $n \geq N(\varepsilon)$, всех натуральных p и для всех x из сегмента $[a, b]$.

Пусть x — произвольная точка сегмента $[a, b]$. Так как для функции $[f_{n+p}(t) - f_n(t)]$ при любых фиксированных номерах n и p выполнены на сегменте, ограниченном точками x и x_0 , все условия теоремы Лагранжа, то между x и x_0 найдется точка ξ такая, что

$$[f_{n+p}(x) - f_n(x)] - [f_{n+p}(x_0) - f_n(x_0)] = [f'_{n+p}(\xi) - f'_n(\xi)](x - x_0).$$

Из этого равенства и из того, что модуль суммы двух величин не превосходит сумму их модулей, получим, учитывая (2.45) и неравенство $|x - x_0| \leq b - a$, что

$$|f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \varepsilon$$

(для любого x из $[a, b]$, для любого $n \geq N(\varepsilon)$ и любого натурального p).

Это и означает в силу критерия Коши, что последовательность $\{f_n(x)\}$ сходится равномерно на сегменте $[a, b]$ к некоторой предельной функции $f(x)$.

Остается доказать, что эта предельная функция в любой фиксированной точке x сегмента $[a, b]$ имеет производную (в граничных точках одностороннюю производную) и эта производная является предельной функцией последовательности $\{f'_n(x)\}$.

Фиксируем произвольную точку x сегмента $[a, b]$ и по ней $\delta > 0$ такое, чтобы δ -окрестность точки x целиком содержалась в $[a, b]$ (в случае, если x является граничной точкой сегмента $[a, b]$ под δ -окрестностью точки x будем подразумевать правую полуокрестность $[a, a + \delta)$ точки a и левую полуокрестность $(b - \delta, b]$ точки b).

Обозначим символом $\{\Delta x\}$ множество всех чисел Δx , удовлетворяющих условию $0 < |\Delta x| < \delta$ при $a < x < b$, условию $0 < \Delta x < \delta$ при $x = a$ и условию $-\delta < \Delta x < 0$ при $x = b$, и докажем, что последовательность функций аргумента Δx

⁶⁾ В граничных точках $[a, b]$ имеется в виду односторонняя производная.

$$\varphi_n(\Delta x) = \frac{f_n(x + \Delta x) - f_n(x)}{\Delta x} \quad (2.46)$$

сходится равномерно на указанном множестве $\{\Delta x\}$.

Для произвольного $\varepsilon > 0$ в силу критерия Коши равномерной сходимости последовательности $\{f'_n(x)\}$ найдется номер $N(\varepsilon)$ такой, что

$$|f'_{n+p}(x) - f'_n(x)| < \varepsilon \quad (2.47)$$

для всех x из $[a, b]$, всех $n \geq N(\varepsilon)$ и всех натуральных p .

Фиксируем теперь произвольное Δx из множества $\{\Delta x\}$ и при любых фиксированных номерах n и p применим к функции

$$[f_{n+p}(t) - f_n(t)]$$

по сегменту, ограниченному точками x и $x + \Delta x$, теорему Лагранжа. Согласно этой теореме найдется число θ из интервала $0 < \theta < 1$ такое, что

$$\begin{aligned} \frac{[f_{n+p}(x + \Delta x) - f_n(x + \Delta x)] - [f_{n+p}(x) - f_n(x)]}{\Delta x} = \\ = f'_{n+p}(x + \theta \Delta x) - f'_n(x + \theta \Delta x). \end{aligned}$$

Используя обозначение (2.46), последнее равенство можно переписать в виде

$$\varphi_{n+p}(\Delta x) - \varphi_n(\Delta x) = f'_{n+p}(x + \theta \Delta x) - f'_n(x + \theta \Delta x).$$

Из этого равенства и из (2.47) заключаем, что

$$|\varphi_{n+p}(\Delta x) - \varphi_n(\Delta x)| < \varepsilon$$

для любого Δx из $\{\Delta x\}$, любого $n \geq N(\varepsilon)$ и любого натурального p . В силу критерия Коши (т. е. теоремы 2.1) последовательность $\{\varphi_n(\Delta x)\}$ сходится равномерно на множестве $\{\Delta x\}$. Но тогда к этой последовательности можно применить теорему 2.7 о почленном предельном переходе в точке $\Delta x = 0$ (в терминах функциональных последовательностей). Согласно этой теореме функция

$$\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x},$$

являющаяся предельной функцией последовательности (2.46), имеет предел в точке $\Delta x = 0$, причем этот предел можно вычислять почленно, т. е.

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(\Delta x)] = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} [\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \varphi_n(\Delta x)] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f_n(x + \Delta x) - f_n(x)}{\Delta x} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x). \end{aligned}$$

Это и доказывает, что производная предельной функции $f(x)$ в точке x существует и равна $\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x)$. Теорема доказана.

В терминах функциональных рядов теорема 2.9 формулируется так:

Теорема 2.9*. Если каждая функция $u_k(x)$ имеет производную на сегменте $[a, b]$ и если ряд из производных $\sum_{k=1}^{\infty} u'_k(x)$ сходится равномерно на сегменте $[a, b]$, а сам ряд $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ сходится хотя бы в одной точке x_0 сегмента $[a, b]$, то этот последний ряд сходится равномерно на сегменте $[a, b]$ к некоторой сумме $S(x)$, причем этот ряд можно дифференцировать на сегменте $[a, b]$ почленно, т. е. его сумма $S(x)$ имеет производную, являющуюся суммой ряда из производных $\sum_{k=1}^{\infty} u'_k(x)$.

Замечание 1. Подчеркнем, что в теореме 2.9 предполагается только существование на сегменте $[a, b]$ производной у каждого члена последовательности $f_n(x)$. Ни ограниченность, ни тем более непрерывность указанной производной (как это делается в большинстве учебников по математическому анализу) не предполагается.

Замечание 2. Если все же дополнительно предположить непрерывность производной у каждого члена последовательности на сегменте $[a, b]$, то в силу следствия 2 из теоремы 2.7 и предельная функция $f(x)$ будет иметь производную, непрерывную на сегменте $[a, b]$.

Замечание 3. Для функции m переменных теорема 2.9 может быть сформулирована в следующем виде:

Теорема 2.9.** Если каждая из функций $f_n(x) = f_n(x_1, x_2, \dots, x_m)$ имеет в замкнутой ограниченной области G пространства E^m частную производную $\frac{\partial f_n}{\partial x_k}$ по переменной x_k и если последовательность производных $\left\{ \frac{\partial f_n}{\partial x_k} \right\}$ сходится равномерно в области G , а сама последовательность $\{f_n(x)\}$ сходится в каждой точке области G , то последовательность $\{f_n(x)\}$ можно дифференцировать по переменной x_k в области G почленно.

Из теоремы 2.9 легко вытекает следующее утверждение.

Теорема 2.10. Если каждая функция $f_n(x)$ имеет первообразную на сегменте $[a, b]$ и если последовательность $\{f_n(x)\}$ сходится равномерно на сегменте $[a, b]$ к предельной функции $f(x)$, то и предельная функция $f(x)$ имеет первообразную на сегменте $[a, b]$. Более того, если x_0 — любая точка сегмента $[a, b]$, то по-

следовательность первообразных $\Phi_n(x)$ функций $f_n(x)$, удовлетворяющих условию $\Phi_n(x_0)=0$, сходится равномерно на сегменте $[a, b]$ к первообразной $\Phi(x)$ предельной функции $f(x)$, удовлетворяющей условию $\Phi(x_0)=0$.

Доказательство. Для последовательности первообразных $\Phi_n(x)$ функций $f_n(x)$, удовлетворяющих требованию $\Phi_n(x_0)=0$, выполнены все условия теоремы 2.9. Это обеспечивает равномерную на $[a, b]$ сходимость последовательности $\{\Phi_n(x)\}$ к предельной функции $\Phi(x)$, у которой в каждой точке $[a, b]$ существует производная, равная предельной функции последовательности $\{f_n(x)\}$. Теорема доказана.

Замечание к теореме 2.10. В теореме 2.10 не требуется ни ограниченность, ни тем более интегрируемость функций $f_n(x)$ на сегменте $[a, b]$.

Теоремы, доказанные в данном и в предыдущем параграфах позволяют нам сделать следующий замечательный вывод:

Утверждение. Равномерная сходимость не выводит из класса функций, имеющих предел в данной точке (теорема 2.7), из класса непрерывных функций (следствие 2 из теоремы 2.7), из класса интегрируемых функций (теорема 2.8), из класса функций, имеющих первообразную (теорема 2.10) и (в случае равномерной сходимости производных) из класса дифференцируемых функций (теорема 2.9).

3. Сходимость в среднем. Потребуем, чтобы каждая функция $f_n(x)$ из функциональной последовательности $\{f_n(x)\}$ и функция $f(x)$ являлись интегрируемыми на сегменте $[a, b]$.

Тогда (в силу § 4 гл. 9 ч. 1) и функция

$$[f_n(x) - f(x)]^2 = f_n^2(x) - 2f_n(x)f(x) + f^2(x)$$

также будет являться интегрируемой на сегменте $[a, b]$.

Введем фундаментальное понятие сходимости в среднем.

Определение 1. Будем говорить, что функциональная последовательность $\{f_n(x)\}$ сходится в среднем на сегменте $[a, b]$ к функции $f(x)$, если существует равный нулю предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b [f_n(x) - f(x)]^2 dx = 0. \quad (2.48)$$

Определение 2. Будем говорить, что функциональный ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$$

сходится в среднем на сегменте $[a, b]$ к сумме $S(x)$, если последовательность частичных сумм этого ряда сходится в среднем на сегменте $[a, b]$ к предельной функции $S(x)$.

Замечание. Из определений 1 и 2 непосредственно вытекает, что если функциональная последовательность (функциональный ряд) сходится в среднем к $f(x)$ на сегменте $[a, b]$, то эта последовательность (этот ряд) сходится в среднем к $f(x)$ и на любом сегменте $[c, d]$, содержащемся в $[a, b]$.

Выясним вопрос о связи между сходимостью в среднем и равномерной сходимостью последовательности.

Утверждение 1. Если последовательность $\{f_n(x)\}$ сходится к функции $f(x)$ равномерно на сегменте $[a, b]$, то эта последовательность сходится к $f(x)$ и в среднем на сегменте $[a, b]$.

Фиксируем произвольное $\varepsilon > 0$. В силу равномерной на сегменте $[a, b]$ сходимости последовательности $\{f_n(x)\}$ к $f(x)$ для положительного числа $\sqrt{\frac{\varepsilon}{2(b-a)}}$ найдется номер $N(\varepsilon)$ такой, что

$$|f_n(x) - f(x)| < \sqrt{\frac{\varepsilon}{2(b-a)}} \quad (2.49)$$

для всех номеров n , удовлетворяющих условию $n \geq N(\varepsilon)$, и всех точек x сегмента $[a, b]$.

Но тогда в силу известной оценки из теории определенного интеграла (см. п. 2 § 4 гл. 9 ч. 1)

$$\int_a^b [f_n(x) - f(x)]^2 dx \leq \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \int_a^b dx = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

для всех номеров n , удовлетворяющих условию $n \geq N(\varepsilon)$. Это и означает сходимость последовательности $\{f_n(x)\}$ к $f(x)$ на сегменте $[a, b]$ в среднем.

Утверждение 2. Сходимость последовательности на некотором сегменте в среднем не влечет за собой не только равномерной на этом сегменте сходимости, но и сходимости хотя бы в одной точке указанного сегмента.

Рассмотрим последовательность принадлежащих $[0, 1]$ сегментов $I_1, I_2, \dots, I_n, \dots$, имеющих следующий вид:

$$I_1 = [0, 1],$$

$$I_2 = \left[0, \frac{1}{2}\right], I_3 = \left[\frac{1}{2}, 1\right],$$

$$I_4 = \left[0, \frac{1}{4}\right], I_5 = \left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right], I_6 = \left[\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right], I_7 = \left[\frac{3}{4}, 1\right],$$

$$\dots$$

$$I_{2^n} = \left[0, \frac{1}{2^n}\right], I_{2^n+1} = \left[\frac{1}{2^n}, \frac{2}{2^n}\right], \dots, I_{2^{n+1}-1} = \left[1 - \frac{1}{2^n}, 1\right],$$

$$\dots$$

Определим n -й член $f_n(x)$ функциональной последовательности $\{f_n(x)\}$ следующим соотношением:

$$f_n(x) = \begin{cases} 1 & \text{на сегменте } I_n, \\ 0 & \text{в остальных точках } [0, 1]. \end{cases}$$

Убедимся в том, что последовательность $\{f_n(x)\}$ сходится к предельной функции $f(x) \equiv 0$ в среднем на сегменте $[0, 1]$.

В самом деле,

$$\int_0^1 [f_n(x) - f(x)]^2 dx = \int_{I_n} dx = \text{длина сегмента } I_n,$$

так что существует предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 [f_n(x) - f(x)]^2 dx = 0.$$

Убедимся, наконец, в том, что построенная последовательность не сходится ни в одной точке сегмента $[0, 1]$. В самом деле, какую бы точку x_0 сегмента $[0, 1]$ мы ни фиксировали, среди как угодно больших номеров n найдутся как такие, для которых сегмент I_n содержит точку x_0 (для этих номеров $f_n(x_0) = 1$), так и такие, для которых сегмент I_n не содержит точку x_0 (для таких номеров $f_n(x_0) = 0$). Таким образом, последовательность $\{f_n(x_0)\}$ содержит бесконечно много членов, равных единице, и бесконечно много членов, равных нулю. Такая последовательность является расходящейся.

Оказывается, сходимость последовательности в среднем обеспечивает возможность почленного интегрирования этой последовательности:

Теорема 2.11. Если последовательность $\{f_n(x)\}$ сходится в среднем к $f(x)$ на сегменте $[a, b]$, то эту последовательность можно почленно интегрировать на сегменте $[a, b]$, т. е. предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx$$

существует и равен $\int_a^b f(x) dx$.

Доказательство. Фиксируем произвольное $\varepsilon > 0$. В силу сходимости последовательности $\{f_n(x)\}$ к $f(x)$ в среднем на сегменте $[a, b]$ найдется номер $N(\varepsilon)$ такой, что для всех $n \geq N(\varepsilon)$

$$\int_a^b [f_n(x) - f(x)]^2 dx < \frac{\varepsilon^2}{b-a}. \quad (2.50)$$

Записав очевидное неравенство ⁷⁾ $|A| \cdot |B| \leq \frac{A^2}{2} + \frac{B^2}{2}$ для величин

$$A = [f_n(x) - f(x)] \sqrt{\frac{b-a}{\varepsilon}}; \quad B = \sqrt{\frac{\varepsilon}{b-a}},$$

получим

$$|f_n(x) - f(x)| \leq [f_n(x) - f(x)]^2 \frac{b-a}{2\varepsilon} + \frac{\varepsilon}{2(b-a)}. \quad (2.51)$$

Из (2.51) и известной оценки из теории определенного интеграла следует

$$\int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx \leq \frac{b-a}{2\varepsilon} \int_a^b [f_n(x) - f(x)]^2 dx + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Отсюда и из (2.50) ясно, что при всех $n \geq N(\varepsilon)$

$$\int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \quad (2.52)$$

Так как

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| &= \left| \int_a^b [f_n(x) - f(x)] dx \right| \leq \\ &\leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx, \end{aligned}$$

то из (2.52) получим, что для всех номеров $n \geq N(\varepsilon)$

$$\left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| < \varepsilon.$$

Теорема доказана.

§ 5. РАВНОСТЕПЕННАЯ НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ФУНКЦИЙ

Предположим, что каждая из функций $f_n(x)$ функциональной последовательности $\{f_n(x)\}$ определена на некотором плотном в себе множестве $\{x\}$ пространства E^m .

Определение. Последовательность $\{f_n(x)\}$ называется равностепенно непрерывной на множестве $\{x\}$, если для любого $\varepsilon > 0$ найдется $\delta > 0$ такое, что неравенство

⁷⁾ Это неравенство эквивалентно неравенству $(|A| + |B|)^2 \geq 0$.

$$|f_n(x') - f_n(x'')| < \varepsilon \quad (2.53)$$

справедливо для всех номеров n и всех точек x' и x'' множества $\{x\}$, связанных условием $\rho(x', x'') < \delta$.

Из этого определения очевидно, что если вся последовательность $\{f_n(x)\}$ равномерно непрерывна на множестве $\{x\}$, то и любая ее подпоследовательность равномерно непрерывна на этом множестве.

Для простоты будем рассматривать последовательность $\{f_n(x)\}$ функций одной переменной x , равномерно непрерывную на сегменте $[a, b]$. По определению для любого $\varepsilon > 0$ найдется $\delta > 0$ такое, что неравенство (2.53) справедливо для всех номеров n и всех точек x' и x'' сегмента $[a, b]$, связанных условием $|x' - x''| < \delta$.

Докажем утверждение, представляющее собой функциональный аналог теоремы Больцано — Вейерштрасса.

Теорема 2.12 (теорема Арцела). Если функциональная последовательность $\{f_n(x)\}$ равномерно непрерывна и равномерно ограничена на сегменте $[a, b]$, то из этой последовательности можно выделить подпоследовательность, сходящуюся равномерно на сегменте $[a, b]$.

Доказательство. Рассмотрим на сегменте $[a, b]$ следующую специальную последовательность точек $\{x_n\}$: в качестве x_1 возьмем ту точку, которая делит сегмент $[a, b]$ на две равные части, в качестве x_2 и x_3 возьмем те две точки, которые вместе с x_1 делят сегмент $[a, b]$ на четыре равные части, в качестве x_4, x_5, x_6 и x_7 возьмем те четыре точки, которые вместе с x_1, x_2 и x_3 делят сегмент $[a, b]$ на восемь равных частей (см. рис. 2.3), и т. д.




Рис. 2.3

Построенная последовательность обладает следующим свойством: для любого $\delta > 0$ найдется номер n_0 такой, что на любом принадлежащем $[a, b]$ сегменте длины δ лежит хотя бы один из элементов $x_1, x_2, \dots, x_{n_0}$ ⁸⁾.

Приступим теперь к выделению из последовательности $\{f_n(x)\}$ равномерно на сегменте $[a, b]$ сходящейся подпоследовательности. Сначала рассмотрим последовательность $\{f_n(x)\}$ в точке x_1 . Получим ограниченную числовую последовательность $\{f_n(x_1)\}$, из которой на основании теоремы Больцано — Вейер-

⁸⁾ Про последовательность, обладающую таким свойством, говорят, что она является всюду плотной на сегменте $[a, b]$.

$[a, b]$, то для фиксированного $\varepsilon > 0$ найдется $\delta > 0$ такое, что каковы бы ни были две точки x и x_m из сегмента $[a, b]$, связанные неравенством $|x - x_m| < \delta$, для всех номеров n справедливо неравенство

$$|f_n(x) - f_n(x_m)| < \varepsilon/3. \quad (2.55)$$

Заметив это, разобьем сегмент $[a, b]$ на конечное число отрезков длины, меньшей δ . Из последовательности $\{x_n\}$ выберем конечное число n_0 первых членов $x_1, x_2, \dots, x_{n_0}$ настолько большое, чтобы в каждом из упомянутых отрезков содержалась хотя бы одна из точек $x_1, x_2, \dots, x_{n_0}$.

Очевидно, диагональная последовательность сходится в каждой из точек $x_1, x_2, \dots, x_{n_0}$. Поэтому для фиксированного выше $\varepsilon > 0$ найдется номер N такой, что

$$|f_{n+p}(x_m) - f_n(x_m)| < \varepsilon/3 \quad (2.56)$$

для всех $n \geq N$, всех натуральных p и всех $m=1, 2, \dots, n_0$.

Пусть теперь x — произвольная точка сегмента $[a, b]$. Эта точка обязательно лежит в одном из упомянутых выше отрезков длины, меньшей δ . Поэтому для этой точки x найдется хотя одна точка x_m (m — один из номеров, равных $1, 2, \dots, n_0$), удовлетворяющая условию $|x - x_m| < \delta$.

В силу того что модуль суммы трех величин не превосходит суммы их модулей, можем записать:

$$\begin{aligned} |f_{n+p}(x) - f_n(x)| &\leq |f_{n+p}(x) - f_{n+p}(x_m)| + \\ &+ |f_{n+p}(x_m) - f_n(x_m)| + |f_n(x_m) - f_n(x)|. \end{aligned} \quad (2.57)$$

Второй член правой части (2.57) оценим с помощью неравенства (2.56), а для оценки первого и третьего членов правой части (2.57) учтем, что $|x - x_m| < \delta$, и используем неравенство (2.55), справедливое для любого номера n (а следовательно, и для любого $n+p$). Окончательно получим, что для произвольного $\varepsilon > 0$ найдется номер N такой, что

$$|f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \varepsilon$$

для всех $n \geq N$, всех натуральных p и любой точки x из $[a, b]$. Равномерная сходимость диагональной последовательности доказана. Теорема 2.12 доказана.

Замечание 1. В теореме Арцела вместо равномерной ограниченности последовательности $\{f_n(x)\}$ на сегменте $[a, b]$ достаточно потребовать ограниченности этой последовательности хотя бы в одной точке этого сегмента. В самом деле, справедливо следующее утверждение: *если последовательность $\{f_n(x)\}$ равномерно непрерывна на сегменте $[a, b]$ и ограничена хотя бы в одной точке x_0 этого сегмента, то эта последовательность равномерно ограничена на сегменте $[a, b]$.* Для доказательства этого

утверждения заметим, что по определению равностепенной непрерывности для $\varepsilon=1$ найдется $\delta>0$ такое, что колебание любой функции $f_n(x)$ на любом сегменте длины, не превышающей δ , не превосходит числа $\varepsilon=1$. Так как весь сегмент $[a, b]$ можно покрыть конечным числом n_0 сегментов длины, не превышающей δ , то колебание любой функции $f_n(x)$ на всем сегменте $[a, b]$ не превосходит числа n_0 . Но тогда из неравенства $|f_n(x_0)| \leq A$, выражающего ограниченность последовательности $\{f_n(x)\}$ в точке x_0 , вытекает неравенство $|f_n(x)| \leq A+n_0$, справедливое для любой точки x из сегмента $[a, b]$ и выражающее равномерную ограниченность рассматриваемой последовательности на этом сегменте.

Замечание 2. Установим достаточный признак равностепенной непрерывности: *если последовательность $\{f_n(x)\}$ состоит из дифференцируемых на сегменте $[a, b]$ функций и если последовательность производных $\{f'_n(x)\}$ равномерно ограничена на этом сегменте, то последовательность $\{f_n(x)\}$ равностепенно непрерывна на сегменте $[a, b]$.*

Для доказательства возьмем на сегменте $[a, b]$ две произвольные точки x' и x'' и запишем для функции $f_n(x)$ на сегменте $[x', x'']$ формулу Лагранжа (см. § 3 гл. 6 ч. 1).

Согласно теореме Лагранжа на сегменте $[x', x'']$ найдется точка ξ_n такая, что

$$|f_n(x') - f_n(x'')| = |f'_n(\xi_n)| \cdot |x' - x''|. \quad (2.58)$$

Поскольку последовательность производных $\{f'_n(x)\}$ равномерно ограничена на сегменте $[a, b]$, найдется постоянная A такая, что для всех номеров n справедливо неравенство

$$|f'_n(\xi_n)| \leq A. \quad (2.59)$$

Подставляя (2.59) в (2.58), получим

$$|f_n(x') - f_n(x'')| \leq A|x' - x''|. \quad (2.60)$$

Фиксируем любое $\varepsilon>0$. Тогда, взяв $\delta=\varepsilon/A$ и используя (2.60), получим, что для всех номеров n и для всех x' и x'' из $[a, b]$, связанных условием $|x' - x''| < \delta$, будет справедливо неравенство

$$|f_n(x') - f_n(x'')| < \varepsilon.$$

Равностепенная непрерывность последовательности $\{f_n(x)\}$ доказана.

В качестве примера рассмотрим последовательность $\{\sin nx/n\}$. Эта последовательность равностепенно непрерывна на любом сегменте $[a, b]$, так как на любом сегменте $[a, b]$ последовательность из производных $\{\cos nx\}$ равномерно ограничена.

Замечание 3. Понятие равностепенной непрерывности можно вводить не по отношению к последовательности функций, а по отношению к любому бесконечному множеству функций.

§ 6. СТЕПЕННЫЕ РЯДЫ

1. Степенной ряд и область его сходимости. Степенным рядом называется функциональный ряд вида

$$a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots, \quad (2.61)$$

где $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ — постоянные вещественные числа, называемые коэффициентами ряда (2.61). Постараемся выяснить, как устроена область сходимости любого степенного ряда.

Заметим, что *всякий степенной ряд сходится в точке $x=0$* , причем существуют степенные ряды, сходящиеся только в этой точке

(например, ряд $\sum_{n=1}^{\infty} n! x^n$).

Составим с помощью коэффициентов a_n ряда (2.61) следующую числовую последовательность:

$$\{\sqrt[n]{|a_n|}\} \quad (n = 1, 2, \dots). \quad (2.62)$$

Могут представиться два случая: 1) последовательность (2.62) является неограниченной; 2) последовательность (2.62) является ограниченной.

В случае 2) у последовательности (2.62) существует конечный верхний предел (см. п. 1 § 3 гл. 3 ч. 1), который мы обозначим через L . Этот верхний предел L заведомо неотрицателен (так как все элементы последовательности (2.62) неотрицательны, а следовательно, и любая предельная точка этой последовательности неотрицательна).

Подводя итог, мы приходим к выводу, что могут представиться следующие три случая: I) последовательность (2.62) является неограниченной; II) последовательность (2.62) является ограниченной и имеет конечный верхний предел $L > 0$; III) последовательность (2.62) является ограниченной и имеет верхний предел $L = 0$.

Докажем теперь следующее замечательное утверждение.

Теорема 2.13 (теорема Коши — Адамара). I. Если последовательность (2.62) не ограничена, то степенной ряд (2.61) сходится лишь при $x=0$.

II. Если последовательность (2.62) ограничена и имеет верхний предел $L > 0$, то ряд (2.61) абсолютно сходится для значений x , удовлетворяющих неравенству $|x| < 1/L$, и расходится для значений x , удовлетворяющих неравенству $|x| > 1/L$.

III. Если последовательность (2.62) ограничена и ее верхний предел $L = 0$, то ряд (2.61) абсолютно сходится для всех значений x .

Доказательство о. I. Пусть последовательность (2.62) не ограничена. Тогда при $x \neq 0$ последовательность

$$|x| \sqrt[n]{|a_n|} = \sqrt[n]{|a_n x^n|}$$

также не ограничена, т. е. у этой последовательности имеются члены со сколь угодно большими номерами n , удовлетворяющие неравенству $\sqrt[n]{|a_n x^n|} > 1$, или $|a_n x^n| > 1$. Но это означает, что для ряда (2.61) (при $x \neq 0$) нарушено необходимое условие сходимости (см. п. 2 § 1 гл. 1), т. е. ряд (2.61) расходится при $x \neq 0$.

II. Пусть последовательность (2.62) ограничена и ее верхний предел $L > 0$. Докажем, что ряд (2.61) абсолютно сходится при $|x| < 1/L$ и расходится при $|x| > 1/L$.

а) Фиксируем сначала любое x , удовлетворяющее неравенству $|x| < 1/L$. Тогда найдется $\varepsilon > 0$, такое, что $|x| < 1/(L + \varepsilon)$. В силу свойств верхнего предела все элементы $\sqrt[n]{|a_n|}$, начиная с некоторого номера n , удовлетворяют неравенству

$$\sqrt[n]{|a_n|} < L + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Таким образом, начиная с этого номера n , справедливо неравенство

$$\sqrt[n]{|a_n x^n|} = |x| \sqrt[n]{|a_n|} < \frac{L + \varepsilon/2}{L + \varepsilon} < 1,$$

т. е. ряд (2.61) абсолютно сходится по признаку Коши (см. п. 3 § 2 гл. 1).

б) Фиксируем теперь любое x , удовлетворяющее неравенству $|x| > 1/L$. Тогда найдется $\varepsilon > 0$ такое, что $|x| > 1/(L - \varepsilon)$. По определению верхнего предела из последовательности (2.62) можно выделить подпоследовательность $\{\sqrt[n_k]{|a_{n_k}|}\}$ ($k = 1, 2, \dots$), сходящуюся к L . Но это означает, что, начиная с некоторого номера k , справедливо неравенство

$$L - \varepsilon < \sqrt[n_k]{|a_{n_k}|} < L + \varepsilon.$$

Таким образом, начиная с этого номера k , справедливо неравенство

$$\sqrt[n_k]{|a_{n_k} x^{n_k}|} = |x| \sqrt[n_k]{|a_{n_k}|} > \frac{L - \varepsilon}{L - \varepsilon} = 1,$$

или

$$|a_{n_k} x^{n_k}| > 1,$$

откуда видно, что нарушено необходимое условие сходимости ряда (2.61) и этот ряд расходится.

III. Пусть последовательность (2.62) ограничена и ее верхний предел $L=0$. Докажем, что ряд (2.61) абсолютно сходится при любом x .

Фиксируем произвольное $x \neq 0$ (при $x=0$ ряд (2.61) заведомо абсолютно сходится). Поскольку верхний предел $L=0$ и последовательность (2.62) не может иметь отрицательных предельных точек, число $L=0$ является единственной предельной точкой, а следовательно, является пределом этой последовательности, т. е. последовательность (2.62) является бесконечно малой.

Но тогда для положительного числа $1/(2|x|)$ найдется номер, начиная с которого

$$\sqrt[n]{|a_n|} < \frac{1}{2|x|}.$$

Стало быть, начиная с указанного номера,

$$\sqrt[n]{|a_n x^n|} = |x| \sqrt[n]{|a_n|} < \frac{1}{2} < 1,$$

т. е. ряд (2.61) абсолютно сходится к признаку Коши (см. п. 3 § 2 гл. 1). Теорема полностью доказана.

Доказанная теорема непосредственно приводит к следующему фундаментальному утверждению.

Теорема 2.14. *Для каждого степенного ряда (2.61), если он не является рядом, сходящимся лишь в точке $x=0$, существует положительное число R (возможно, равное бесконечности) такое, что этот ряд абсолютно сходится при $|x| < R$ и расходится при $|x| > R$.*

Это число R называется радиусом сходимости рассматриваемого степенного ряда, а интервал $(-R, R)$ называется промежутком сходимости этого ряда. Для вычисления радиуса сходимости справедлива формула

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}} \quad (2.63)$$

(в случае, когда $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 0$, $R = \infty$).

Замечание 1. На концах промежутка сходимости, т. е. в точках $x=-R$ и $x=R$, степенной ряд может быть как сходящимся, так и расходящимся⁹⁾.

⁹⁾ Отметим следующую теорему Абеля: если степенной ряд (2.61) сходится при $x=R$, то сумма его $S(x)$ является непрерывной в точке R слева. Без ограничения общности можно считать, что $R=1$, но в таком виде теорема Абеля (фактически утверждающая регулярность метода суммирования Пуассона—Абеля) доказана в п. 2 § 7 гл. 1.

Так, для ряда $1 + \sum_{n=1}^{\infty} x^n$ радиус сходимости R равен единице, промежуток сходимости имеет вид $(-1, +1)$, и этот ряд расходится на концах этого промежутка.

Для ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$ промежуток сходимости тот же $(-1, +1)$, но он сходится на обоих концах этого промежутка.

Замечание 2. Все результаты настоящего пункта справедливы для ряда (2.61), в котором вещественная переменная x заменена комплексной переменной z . Для такого ряда устанавливается существование положительного числа R такого, что ряд абсолютно сходится при $|z| < R$ и расходится при $|z| > R$.

Для вычисления R справедлива формула (2.63). Число R называется радиусом сходимости, а область $|z| < R$ — кругом сходимости степенного ряда.

2. Непрерывность суммы степенного ряда. Пусть степенной ряд (2.61) имеет радиус сходимости $R > 0$.

Лемма. *Каково бы ни было положительное число r , удовлетворяющее условию $r < R$, ряд (2.61) равномерно сходится на сегменте $[-r, +r]$, т. е. при $|x| \leq r$.*

Доказательство. В силу теоремы 2.14 ряд (2.61) абсолютно сходится при $x=r$, т. е. сходится ряд

$$|a_0| + \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| r^n.$$

Но этот числовой ряд служит мажорантным для ряда (2.61) при всех x из сегмента $[-r, +r]$. На основании признака Вейерштрасса ряд (2.61) сходится равномерно на сегменте $[-r, +r]$. Лемма доказана.

Следствие из леммы. *В условиях леммы сумма ряда (2.61) является функцией, непрерывной на сегменте $[-r, +r]$ (в силу теоремы 2.7).*

Теорема 2.15. *Сумма степенного ряда внутри его промежутка сходимости является непрерывной функцией.*

Доказательство. Пусть $S(x)$ — сумма степенного ряда (2.61), а R — его радиус сходимости. Фиксируем любое x внутри промежутка сходимости, т. е. такое, что $|x| < R$. Всегда найдется число r такое, что $|x| < r < R$. В силу следствия из леммы функция $S(x)$ непрерывна на сегменте $[-r, +r]$. Следовательно, $S(x)$ непрерывна и в точке x . Теорема доказана.

3. Почленное интегрирование и почленное дифференцирование степенного ряда.

Теорема 2.16. *Если $R > 0$ — радиус сходимости степенного ряда (2.61), а x удовлетворяет условию $|x| < R$, то ряд (2.61)*

можно почленно интегрировать на сегменте $[0, x]$. Полученный в результате почленного интегрирования ряд имеет тот же радиус сходимости R , что и исходный ряд.

Доказательство. Для любого x , удовлетворяющего условию $|x| < R$, найдется r такое, что $|x| < r < R$. Согласно лемме ряд (2.61) сходится равномерно на сегменте $[-r, +r]$, а следовательно, и на сегменте $[0, x]$. Но тогда в силу теоремы 2.8 этот ряд можно почленно интегрировать на сегменте $[0, x]$.

В результате почленного интегрирования получится степенной ряд

$$a_0 x + \frac{a_1}{2} x^2 + \dots + \frac{a_{n-1}}{n} x^n + \dots,$$

радиус сходимости которого (согласно теореме 2.14) является величиной, обратной верхнему пределу последовательности

$$\sqrt[n]{\frac{|a_{n-1}|}{n}} = \frac{\sqrt[n]{|a_{n-1}|}}{\sqrt[n]{n}}. \quad (2.64)$$

Так как верхний предел последовательности (2.64) тот же, что и у (2.62)¹⁰⁾, то теорема доказана.

Теорема 2.17 *Степенной ряд (2.61) внутри его промежутка сходимости можно дифференцировать почленно. Ряд, полученный почленным дифференцированием, имеет тот же радиус сходимости, что и исходный ряд.*

Доказательство. Достаточно (в силу теоремы 2.9 и леммы) доказать лишь второе утверждение теоремы.

В результате почленного дифференцирования (2.61) получим ряд

$$a_1 + 2a_2 x + \dots + na_n x^{n-1} + (n+1)a_{n+1} x^n + \dots,$$

радиус сходимости R которого (согласно теореме 2.14) обратен верхнему пределу последовательности

$$\left\{ \sqrt[n]{(n+1)|a_{n+1}|} \right\}. \quad (2.65)$$

Так как последовательность (2.65) имеет тот же верхний предел, что и (2.62)¹¹⁾, то теорема доказана.

¹⁰⁾ Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$, $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_{n-1}|} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n+1]{|a_n|} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left\{ \sqrt[n]{|a_n|} \right\}^{\frac{n}{n+1}} =$
 $= \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}.$

¹¹⁾ Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n+1} = 1$, $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_{n+1}|} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n-1]{|a_n|} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left\{ \sqrt[n]{|a_n|} \right\}^{\frac{n}{n-1}} =$
 $= \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}.$

Следствие из теоремы 2.17. *Степенной ряд внутри его промежутка сходимости можно дифференцировать почленно сколько угодно раз. Ряд, полученный n -кратным почленным дифференцированием исходного степенного ряда, имеет тот же радиус сходимости, что и исходный ряд.*

§ 7. РАЗЛОЖЕНИЕ ФУНКЦИЙ В СТЕПЕННЫЕ РЯДЫ

1. Разложение функции в степенной ряд.

Определение 1. Будем говорить, что функция $f(x)$ на интервале $(-R, +R)$ (на множестве $\{x\}$) может быть разложена в степенной ряд, если существует степенной ряд, сходящийся к $f(x)$ на указанном интервале (указанном множестве).

Приведем необходимые и достаточные условия того, чтобы функция $f(x)$ могла быть разложена в степенной ряд.

Утверждение 1. Для того чтобы функция $f(x)$ могла быть разложена в степенной ряд на интервале $(-R, +R)$, необходимо, чтобы эта функция имела на указанном интервале непрерывные производные любого порядка ⁽¹²⁾.

Действительно, степенной ряд внутри его промежутка сходимости, который во всяком случае содержит интервал $(-R, +R)$, можно почленно дифференцировать сколько угодно раз, причем все полученные при этом ряды сходятся внутри того же промежутка сходимости (теорема 2.17).

Но тогда суммы рядов, полученных сколь угодно кратным дифференцированием (в силу теоремы 2.15), представляют собой функции, непрерывные внутри указанного промежутка сходимости, а следовательно, непрерывные на интервале $(-R, +R)$.

Утверждение 2. Если функция $f(x)$ может быть на интервале $(-R, +R)$ разложена в степенной ряд, то лишь единственным образом.

В самом деле, пусть функция $f(x)$ может быть разложена на интервале $(-R, +R)$ в степенной ряд (2.61). Дифференцируя этот ряд почленно n раз (что заведомо можно делать внутри интервала $(-R, +R)$), получим

$$f^{(n)}(x) = a_n n! + a_{n+1} (n+1)! x + \dots$$

Отсюда при $x=0$ найдем

$$f^{(n)}(0) = a_n n!,$$

или

$$a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}. \quad (2.66)$$

⁽¹²⁾ Отметим, что существуют функции, имеющие на интервале непрерывные производные любого порядка, но не разложимые на этом интервале в степенной ряд. Примером такой функции может служить

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & \text{при } x \neq 0, \\ 0 & \text{при } x = 0. \end{cases}$$

Таким образом, коэффициенты степенного ряда (2.61), в который может быть разложена функция $f(x)$, однозначно определяются формулой (2.66).

Предположим теперь, что функция $f(x)$ имеет на интервале $(-R, +R)$ непрерывные производные любого порядка.

Определение 2. *Степенной ряд (2.61), коэффициенты которого определяются формулой (2.66), называется рядом Тейлора функции $f(x)$.*

Утверждение 2 приводит нас к следующему утверждению.

Утверждение 3. *Если функция $f(x)$ может быть разложена на интервале $(-R, +R)$ в степенной ряд, то этот ряд является рядом Тейлора функции $f(x)$.*

Из результатов § 8 гл. 6 ч. 1 непосредственно вытекает следующее

Утверждение 4. *Для того чтобы функция $f(x)$ могла быть разложена в ряд Тейлора на интервале $(-R, +R)$ (на множестве $\{x\}$), необходимо и достаточно, чтобы остаточный член в формуле Маклорена для этой функции стремился к нулю на указанном интервале (указанном множестве).*

2. **Разложение некоторых элементарных функций в ряд Тейлора.** В ч. 1 (см. п. 2 § 9 гл. 6) доказано, что остаточные члены в формуле Маклорена для функций e^x , $\cos x$ и $\sin x$ стремятся к нулю на всей числовой прямой, а остаточный член в формуле Маклорена для функции $\ln(1+x)$ стремится к нулю на полусегменте $-1 < x \leq 1$.

В силу утверждения 4 из предыдущего пункта это приводит нас к следующим разложениям:

$$\begin{aligned} e^x &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \\ \cos x &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \\ \sin x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \\ \ln(1+x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n}. \end{aligned}$$

Первые три из этих разложений сходятся для всех значений x , а последнее — для значений x из полусегмента $-1 < x \leq 1$.

Остановимся теперь на разложении в степенной ряд функции $(1+x)^\alpha$, или на так называемом биномиальном ряде. Если $f(x) = (1+x)^\alpha$, то

$$f^{(n)}(x) = \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n}.$$

Поэтому формула Маклорена с остаточным членом в форме Коши имеет вид (см. § 8 гл. 6 ч. 1)

$$(1+x)^\alpha = 1 + \sum_{k=1}^n \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-k+1)}{k!} x^k + R_{n+1}(x), \quad (2.67)$$

где

$$\begin{aligned} R_{n+1}(x) &= \frac{(1-\theta)^n}{n!} x^{n+1} f^{(n+1)}(\theta x) = \\ &= \frac{(1-\theta)^n}{n!} x^{n+1} \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-n)(1+\theta x)^{\alpha-n-1} = \\ &= \left(\frac{1-\theta}{1+\theta x}\right)^n \frac{(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-n)}{n!} \alpha(1+\theta x)^{\alpha-1} x^{n+1} \end{aligned} \quad (2.68)$$

(θ — некоторое число из интервала $0 < \theta < 1$).

Сначала убедимся в том, что при $\alpha > 0$ всюду на интервале $-1 < x < 1$ остаточный член $R_{n+1}(x)$ стремится к нулю (при $n \rightarrow \infty$).

В самом деле, все члены последовательности $\left\{ \left(\frac{1-\theta}{1+\theta x} \right)^n \right\}$ всюду на указанном интервале не превосходят единицы; последовательность $\left\{ \frac{(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-n)}{n!} \right\}$ ограничена, а число $\alpha(1+\theta x)^{\alpha-1}$ определено при любом фиксированном $\alpha > 0$ и при любом x из интервала $-1 < x < 1$; наконец, последовательность $\{x^{n+1}\}$ является бесконечно малой для любого x из интервала $-1 < x < 1$. Таким образом, в силу (2.68) остаточный член $R_{n+1}(x)$ стремится к нулю для любого фиксированного $\alpha > 0$ и любого x из интервала $-1 < x < 1$.

Следовательно, в силу (2.67) при $\alpha > 0$ всюду на интервале $-1 < x < 1$ справедливо разложение

$$(1+x)^\alpha = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-k+1)}{k!} x^k. \quad (2.69)$$

Докажем теперь, что при $\alpha > 0$ ряд, стоящий в правой части (2.69), равномерно сходится к функции $(1+x)^\alpha$ на замкнутом сегменте $-1 \leq x \leq 1$.

Всюду на указанном сегменте этот ряд мажорируется числовым рядом

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{|\alpha| \cdot |1-\alpha| \cdot \dots \cdot |k-1-\alpha|}{k!}. \quad (2.70)$$

В силу признака Вейерштрасса для установления равномерной на сегменте $-1 \leq x \leq 1$ сходимости ряда, стоящего в правой части (2.69), достаточно доказать сходимость мажорирующего ряда (2.70).

Обозначим k -й член ряда (2.70) символом p_k . Тогда для всех достаточно больших k получим

$$\frac{p_{k+1}}{p_k} = \frac{k - \alpha}{k + 1} = 1 - \frac{1 + \alpha}{k + 1}. \quad (2.71)$$

Из формулы (2.71) вытекает, что

$$\lim_{k \rightarrow \infty} k \left(1 - \frac{p_{k+1}}{p_k} \right) = (1 + \alpha) \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k}{k + 1} = (1 + \alpha) > 1,$$

т. е. ряд (2.70) сходится в силу признака Раабе (см. п. 5 § 2 гл. 1).

Таким образом, доказано, что при $\alpha > 0$ ряд, стоящий в правой части (2.69), сходится равномерно на сегменте $-1 \leq x \leq 1$. Остается доказать, что указанный ряд сходится на сегменте $-1 \leq x \leq 1$ к функции $(1+x)^\alpha$.

В силу доказанного выше сумма указанного ряда $S(x)$ и функция $(1+x)^\alpha$ совпадают всюду на интервале $-1 < x < 1$. Кроме того, обе функции $S(x)$ и $(1+x)^\alpha$ непрерывны на сегменте $-1 \leq x \leq 1$ (функция $S(x)$ как сумма равномерно сходящегося ряда из непрерывных функций; непрерывность функции $(1+x)^\alpha$ при $\alpha > 0$ очевидна).

Но тогда значения $S(x)$ и $(1+x)^\alpha$ в точках $x = -1$ и $x = 1$ обязаны совпадать, т. е. ряд, стоящий в правой части (2.69), равномерно сходится к $(1+x)^\alpha$ на замкнутом сегменте $-1 \leq x \leq 1$.

3. Элементарные представления о функциях комплексной переменной. Выше отмечалось, что на случай степенного ряда относительно комплексной переменной z

$$a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \dots + a_n z^n + \dots$$

переносятся теоремы 2.13 и 2.14 (о существовании и величине радиуса сходимости). Ряды такого типа используются для определения функций комплексной переменной z .

Функции e^z , $\cos z$ и $\sin z$ комплексной переменной z определяются как суммы следующих рядов:

$$e^z = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n!}. \quad (2.72)$$

$$\cos z = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!}, \quad (2.73)$$

$$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!}. \quad (2.74)$$

Легко проверить, что эти ряды абсолютно сходятся для всех значений z (их радиус сходимости $R=\infty$).

Установим теперь связь между функциями e^z , $\cos z$ и $\sin z$. Заменяя в формуле (2.72) z на iz , получим

$$\begin{aligned} e^{iz} &= 1 + iz + \frac{(iz)^2}{2!} + \frac{(iz)^3}{3!} + \frac{(iz)^4}{4!} + \frac{(iz)^5}{5!} + \dots = \\ &= \left(1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \dots\right) + i \left(z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \dots\right). \end{aligned} \quad (2.75)$$

Сопоставляя правую часть равенства (2.75) с разложениями (2.73) и (2.74), приходим к следующей замечательной формуле:

$$e^{iz} = \cos z + i \sin z. \quad (2.76)$$

Формула (2.76) играет фундаментальную роль в теории функций комплексной переменной и называется формулой Эйлера.

Полагая в формуле Эйлера переменную z равной сначала вещественному числу x , а затем вещественному числу $-x$, получим следующие формулы

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x, \quad e^{-ix} = \cos x - i \sin x.$$

Складывая и вычитая эти формулы, получим формулы, выражающие $\cos x$ и $\sin x$ через показательную функцию:

$$\begin{cases} \cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}, \\ \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}. \end{cases} \quad (2.77)$$

В заключение остановимся на определении логарифмической функции $w = \ln z$ комплексной переменной z . Эту функцию естественно определить как функцию, обратную показательной, т. е. из соотношения $z = e^w$. Полагая $w = u + iv$, $z = x + iy$, поставим перед собой цель — выразить u и v через $z = x + iy$.

Из соотношения

$$z = x + iy = e^{u+iv} = e^u (\cos v + i \sin v)$$

получим, используя понятия модуля и аргумента комплексного числа,

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = e^u, \quad \arg z = v - 2\pi k,$$

где

$$k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Из последних равенств находим, что

$$u = \ln |z| = \ln \sqrt{x^2 + y^2},$$

$$v = \arg z + 2\pi k \quad (k=0, \pm 1, \pm 2, \dots),$$

или окончательно

$$\ln z = \ln |z| + i(\arg z + 2\pi k), \text{ где } k=0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (2.78)$$

Формула (2.78) показывает, что логарифмическая функция в комплексной области *не является однозначной*: ее мнимая часть для одного и того же значения z имеет бесчисленное множество значений, отвечающих различным $k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$

Легко понять, что аналогичная ситуация будет иметь место и при определении в комплексной области обратных тригонометрических функций.

4. Теорема Вейерштрасса о равномерном приближении непрерывной функции многочленами.

Теорема 2.18 (теорема Вейерштрасса)¹³. Если функция $f(x)$ непрерывна на сегменте $[a, b]$, то существует последовательность многочленов $\{P_n(x)\}$, равномерно на сегменте $[a, b]$ сходящаяся к $f(x)$, т. е. для любого $\varepsilon > 0$ найдется многочлен $P_n(x)$ с номером n , зависящим от ε , такой, что

$$|P_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

сразу для всех x из сегмента $[a, b]$.

Иными словами, непрерывную на сегменте $[a, b]$ функцию $f(x)$ можно равномерно на этом сегменте приблизить многочленом с наперед заданной точностью ε .

Доказательство. Не ограничивая общности, мы можем вместо сегмента $[a, b]$ рассматривать сегмент $[0, 1]$ ¹⁴. Кроме того, достаточно доказать теорему для непрерывной функции $f(x)$, обращающейся в нуль на концах сегмента $[0, 1]$, т. е. удовлетворяющей условиям $f(0)=0$ и $f(1)=0$. В самом деле, если бы $f(x)$ не удовлетворяла этим условиям, то, положив

$$g(x) = f(x) - f(0) - x[f(1) - f(0)],$$

мы получили бы непрерывную на сегменте $[0, 1]$ функцию $g(x)$, удовлетворяющую условиям $g(0)=0$ и $g(1)=0$. Тогда из возможности представления $g(x)$ в виде предела равномерно сходящейся последовательности многочленов вытекало бы, что и $f(x)$ пред-

¹³ Эта фундаментальная теорема была доказана Вейерштрассом в 1895 г.

¹⁴ Поскольку один из этих сегментов преобразуется в другой линейной заменой $x = (b-a)t + a$.

ставима в виде предела равномерно сходящейся последовательности многочленов (так как разность $f(x) - g(x)$ является многочленом первой степени).

Итак, пусть функция $f(x)$ непрерывна на сегменте $[0, 1]$ и удовлетворяет условиям $f(0)=0$, $f(1)=0$. Такую функцию $f(x)$ можно продолжить на всю прямую, положив ее равной нулю за пределами сегмента $[0, 1]$, и утверждать, что так продолженная функция является равномерно непрерывной на всей прямой.

Рассмотрим следующую конкретную последовательность неотрицательных многочленов степени $2n$:

$$Q_n(x) = c_n(1-x^2)^n \quad (n=1, 2, \dots), \quad (2.79)$$

у каждого из которых постоянная c_n выбрана так, чтобы выполнялось равенство

$$\int_{-1}^1 Q_n(x) dx = 1 \quad (n=1, 2, \dots). \quad (2.80)$$

Не вычисляя точного значения постоянной c_n , оценим ее сверху. Для этого заметим, что для любого номера $n=1, 2, \dots$ и для всех x из сегмента $[0, 1]$ справедливо неравенство¹⁵⁾

$$(1-x^2)^n \geq 1-nx^2. \quad (2.81)$$

Применяя неравенство (2.81) и учитывая, что $\frac{1}{\sqrt{n}} \leq 1$ при любом $n \geq 1$, будем иметь

$$\begin{aligned} \int_{-1}^{+1} (1-x^2)^n dx &= 2 \int_0^1 (1-x^2)^n dx \geq 2 \int_0^{1/\sqrt{n}} (1-x^2)^n dx \geq \\ &\geq 2 \int_0^{1/\sqrt{n}} (1-nx^2) dx = \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} > \frac{1}{\sqrt{n}}. \end{aligned} \quad (2.82)$$

Из (2.79), (2.80) и (2.82) заключаем, что для всех номеров $n=1, 2, \dots$ справедлива следующая оценка сверху для постоянной c_n :

$$c_n < \sqrt{n}. \quad (2.83)$$

¹⁵⁾ Это неравенство вытекает из того, что при любом $n \geq 1$ функция $\varphi(x) = (1-x^2)^n - (1-nx^2)$ неотрицательна всюду на сегменте $0 \leq x \leq 1$, так как эта функция обращается в нуль при $x=0$ и имеет всюду на этом сегменте неотрицательную производную $\varphi'(x) = 2nx[1 - (1-x^2)^{n-1}]$.

Из (2.83) и (2.79) вытекает, что при любом $\delta > 0$ для всех x из сегмента $\delta \leq |x| \leq 1$ справедливо неравенство

$$0 \leq Q_n(x) \leq \sqrt[n]{n} (1 - \delta^2)^n. \quad (2.84)$$

Из (2.84) следует, что при любом фиксированном $\delta > 0$ последовательность неотрицательных многочленов $\{Q_n(x)\}$ сходится к нулю равномерно на сегменте $\delta \leq |x| \leq 1$ ¹⁶⁾.

Положим теперь для любого x из сегмента $0 \leq x \leq 1$

$$P_n(x) = \int_{-1}^{+1} f(x+t) Q_n(t) dt \quad (2.85)$$

и убедимся в том, что для любого $n=1, 2, \dots$ функция $P_n(x)$ есть многочлен степени $2n$, причем $\{P_n(x)\}$ и является искомой последовательностью многочленов, равномерно сходящейся на сегменте $[0, 1]$ к функции $f(x)$.

Так как изучаемая функция $f(x)$ равна нулю за пределами сегмента $[0, 1]$, то для любого x из сегмента $[0, 1]$ интеграл (2.85) можно записать в виде

$$P_n(x) = \int_{-x}^{1-x} f(x+t) Q_n(t) dt.$$

Заменяя в последнем интеграле переменную t на $t-x$, мы придадим ему вид

$$P_n(x) = \int_0^1 f(t) Q_n(t-x) dt. \quad (2.86)$$

Из (2.86) и (2.79) ясно, что функция $P_n(x)$ представляет собой многочлен степени $2n$.

Остается доказать, что последовательность $\{P_n(x)\}$ сходится к $f(x)$ равномерно на сегменте $0 \leq x \leq 1$. Фиксируем произвольное $\varepsilon > 0$. Для фиксированного ε в силу равномерной непрерывности $f(x)$ на всей числовой прямой найдется $\delta > 0$ такое, что

$$|f(x) - f(y)| < \varepsilon/2 \text{ при } |x-y| < \delta. \quad (2.87)$$

Заметим еще, что так как $f(x)$ непрерывна на сегменте $[0, 1]$, то она ограничена на этом сегменте, а следовательно, и всюду на

¹⁶⁾ В самом деле, достаточно доказать, что последовательность $a_n = (1 - \delta^2)^n \sqrt[n]{n}$ сходится к нулю, а это вытекает, например, из того, что, поскольку

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = (1 - \delta^2) \lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/2n} = (1 - \delta^2) < 1$, ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится по признаку Коши (см. теорему 1.6.).

числовой прямой. Это означает, что существует постоянная A такая, что для всех x

$$|f(x)| \leq A. \quad (2.88)$$

Используя (2.80), (2.84), (2.87) и (2.88) и учитывая неотрицательность $Q_n(x)$, оценим разность $P_n(x) - f(x)$. Для всех x из сегмента $0 \leq x \leq 1$ будем иметь

$$\begin{aligned} |P_n'(x) - f(x)| &= \left| \int_{-1}^1 [f(x+t) - f(x)] Q_n(t) dt \right| \leq \\ &\leq \int_{-1}^1 |f(x+t) - f(x)| Q_n(t) dt \leq 2A \int_{-1}^{-\delta} Q_n(t) dt + \\ &+ \frac{\varepsilon}{2} \int_{-\delta}^{\delta} Q_n(t) dt + 2A \int_{\delta}^1 Q_n(t) dt \leq 4A\sqrt{n} (1 - \delta^2)^n + \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

Для завершения доказательства теоремы достаточно заметить, что для всех достаточно больших номеров n справедливо неравенство

$$4A\sqrt{n} (1 - \delta^2)^n < \varepsilon/2.$$

Следствие из теоремы 2.18. Если не только сама функция $f(x)$, но и ее производные до некоторого порядка k включительно непрерывны на сегменте $[0, 1]$ ¹⁷⁾, то существует последовательность многочленов $\{P_n(x)\}$ такая, что каждая из последовательностей $\{P_n(x)\}$, $\{P_n'(x)\}$, ..., $\{P_n^{(k)}(x)\}$ сходится равномерно на сегменте $[0, 1]$ соответственно к $f(x)$, $f'(x)$, ..., $f^{(k)}(x)$.

В самом деле, не ограничивая общности, мы можем считать, что каждая из функций $f(x)$, $f'(x)$, ..., $f^{(k)}(x)$ обращается в нуль при $x=0$ и при $x=1$ ¹⁸⁾, а при таких условиях функцию $f(x)$ можно продолжить на всю прямую, полагая ее равной нулю вне $[0, 1]$, так что продолженная функция и все ее производные до порядка k включительно окажутся равномерно непрерывными на всей числовой прямой.

Но тогда, обозначая через $P_n(x)$ тот же многочлен (2.85), что и выше, и повторяя рассуждения, проведенные при доказательстве теоремы 2.18, мы докажем, что каждая из разностей

$$P_n(x) - f(x), P_n'(x) - f'(x), \dots, P_n^{(k)}(x) - f^{(k)}(x)$$

¹⁷⁾ Конечно, вместо $[0, 1]$ можно взять $[a, b]$.

¹⁸⁾ Если бы $f(x)$ не удовлетворяла этим условиям, то мы нашли бы многочлен $\bar{p}_k(x)$ степени $2k$ такой, что для функций $g(x) = f(x) - \bar{p}_k(x)$ эти условия были бы выполнены.

является бесконечно малой, равномерно относительно x на сегменте $0 \leq x \leq 1$.

Замечание 1. Изложенное нами доказательство легко обобщается на случай функции m переменных $f(x_1, x_2, \dots, x_m)$, непрерывной в m -мерном кубе $0 \leq x_i \leq 1$ ($i=1, 2, \dots, m$).

Совершенно аналогично теореме 2.18 доказывается, что для такой функции $f(x_1, x_2, \dots, x_m)$ существует равномерно сходящаяся к ней в m -мерном кубе последовательность многочленов от m переменных $x_1, x_2, \dots, x_m$.

Замечание 2. Заметим, что фигурирующие в теореме 2.18 многочлены можно заменить функциями более общей природы, сохраняя при этом утверждение о возможности равномерного приближения такими функциями любой непрерывной функции f .

Договоримся называть произвольную совокупность A функций, определенных на некотором множестве E , алгеброй, если ¹⁹⁾ 1) $f+g \in A$; 2) $fg \in A$; 3) $\alpha f \in A$ при произвольных $f \in A$ и $g \in A$ и при вещественном α .

Иными словами, алгебра есть совокупность функций, замкнутая относительно сложения и умножения функций и умножения функций на вещественные числа.

Если для каждой точки x множества E найдется некоторая функция $g \in A$ такая, что $g(x) \neq 0$, то говорят, что алгебра A не исчезает ни в одной точке x множества E .

Говорят, что совокупность A функций, определенных на множестве E , разделяет точки множества E , если для любых двух различных точек x_1 и x_2 этого множества найдется функция f из A такая, что $f(x_1) \neq f(x_2)$.

Имеет место следующее замечательное утверждение:

Теорема 2.19 (теорема Вейерштрасса — Стоуна ²⁰⁾). Пусть A — алгебра непрерывных на компактном ²¹⁾ множестве E функций, которая разделяет точки множества E и не исчезает ни в одной точке этого множества. Тогда каждая непрерывная на множестве E функция $f(x)$ может быть представлена в виде предела равномерно сходящейся последовательности функций алгебры A .

¹⁹⁾ Напомним, что символ $f \in A$ означает принадлежность f к A .

²⁰⁾ М. Стоун — современный американский математик.

²¹⁾ Напомним, что компактным называется замкнутое ограниченное множество.

ДВОЙНЫЕ И n -КРАТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ

Во вводной главе ч. 1 были указаны важные задачи о вычислении площади криволинейной трапеции и о нахождении пройденного материальной точкой пути, приводящие к понятию однократного определенного интеграла. Аналогичные «многомерные» задачи, такие, например, как задача о вычислении объема или задача о вычислении массы неоднородного тела, естественным образом приводят к рассмотрению двойных и тройных интегралов.

В настоящей главе излагается теория n -кратных интегралов ($n \geq 2$). Построение теории n -кратных интегралов проводится в полной аналогии с построением теории однократного интеграла. Для более эффективного использования аналогии с однократным интегралом сначала вводится понятие двойного интеграла для прямоугольника. Затем вводится понятие двойного интеграла по произвольной области как с помощью прямолинейного, так и с помощью произвольного разбиения этой области. Построенная теория переносится на случай n -кратного интеграла. В конце главы изучаются кратные несобственные интегралы.

§ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ДВОЙНОГО ИНТЕГРАЛА

1. Определение двойного интеграла для прямоугольника. Рассмотрим произвольную функцию $f(x, y)$, определенную всюду на прямоугольнике $R = [a \leq x \leq b] \times [c \leq y \leq d]$ (рис. 3.1). Введем понятие интегральной суммы функции $f(x, y)$.

Разобьем сегмент $[a, b]$ на n частичных сегментов при помощи точек $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$, а сегмент $[c, d]$ на p частичных сегментов при помощи точек $c = y_0 < y_1 < y_2 < \dots < y_p = d$. Этому разбиению сегментов соответствует разбиение прямоугольника R прямыми, параллельными осям Ox и Oy , на $n \cdot p$ частичных прямоугольников




Рис. 3.1

$$R_{kl} = [x_{k-1} \leq x \leq x_k] \times [y_{l-1} \leq y \leq y_l] \quad (k = 1, 2, \dots, n; l = 1, 2, \dots, p).$$

Указанное разбиение прямоугольника R обозначим символом T . Разбиение прямоугольника R , полученное из разбиения T добавлением прямых, параллельных осям Ox и Oy , назовем измельчением разбиения T и будем обозначать символом T' .

Всюду в этой главе под термином «прямоугольник» мы будем понимать прямоугольник со сторонами, параллельными координатным осям. На каждом частичном прямоугольнике R_{kl} выберем произвольную точку (ξ_k, η_l) . Положим $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$, $\Delta y_l = y_l - y_{l-1}$ и обозначим через ΔR_{kl} площадь прямоугольника R_{kl} . Очевидно, $\Delta R_{kl} = \Delta x_k \cdot \Delta y_l$. Длину диагонали прямоугольника R_{kl} , равную $\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_l)^2}$, назовем диаметром этого прямоугольника. Наибольший из диаметров всех частичных прямоугольников назовем диаметром разбиения T прямоугольника R и обозначим символом Δ .

Определение 1. Число

$$\sigma = \sigma(f, T) = \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^p f(\xi_k, \eta_l) \Delta R_{kl} \quad (3.1)$$

назовем интегральной суммой функции $f(x, y)$, соответствующей данному разбиению T прямоугольника R и данному выбору промежуточных точек (ξ_k, η_l) на частичных прямоугольниках разбиения T .

Определение 2. Число I называется пределом интегральных сумм (3.1) при $\Delta \rightarrow 0$, если для любого положительного числа ε можно указать такое положительное число δ , что при $\Delta < \delta$ независимо от выбора промежуточных точек (ξ_k, η_l) на R_{kl} выполняется неравенство $|\sigma - I| < \varepsilon$.

Отметим, что интегральную сумму (3.1) можно рассматривать как прямоугольную частичную сумму S_{np} двойного ряда, а предел интегральных сумм (3.1) при $\Delta \rightarrow 0$ — как предел $\lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ p \rightarrow \infty}} S_{np}$ при

независимом стремлении n и p к бесконечности, т. е. как сумму соответствующего двойного ряда. (Элементы теории двойных рядов изложены в гл. 1.)

Определение 3. Функция $f(x, y)$ называется интегрируемой (по Риману) на прямоугольнике R , если существует конечный предел I интегральных сумм этой функции при $\Delta \rightarrow 0$.

Указанный предел I называется двойным интегралом от функции $f(x, y)$ по прямоугольнику R и обозначается одним из следующих символов:

$$I = \iint_R f(x, y) dx dy = \iint_R f(M) d\sigma.$$

З а м е ч а н и е. Точно так же, как и для однократного определенного интеграла (см. § 1 гл. 9 ч. 1), методом доказательства от противного устанавливается, что любая интегрируемая на прямоугольнике R функция $f(x, y)$ является ограниченной на этом прямоугольнике. Поэтому везде в этой главе, кроме последнего параграфа, не оговаривая это дополнительно, будем рассматривать лишь ограниченные функции.

2. Условия существования двойного интеграла для прямоугольника. Теория Дарбу, развитая в гл. 9 ч. 1 для однократного определенного интеграла, полностью переносится на случай двойного интеграла в прямоугольнике R . Ввиду полной аналогии мы ограничимся указанием общей схемы рассуждений.

Составим для данного разбиения T прямоугольника R две суммы: верхнюю сумму

$$S = \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^p M_{kl} \Delta R_{kl} \quad (M_{kl} = \sup_{R_{kl}} f(x, y))$$

и нижнюю сумму

$$s = \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^p m_{kl} \Delta R_{kl} \quad (m_{kl} = \inf_{R_{kl}} f(x, y)).$$

Справедливы следующие утверждения (доказательства их полностью аналогичны доказательствам, приведенным в п. 2 § 2 гл. 9 ч. 1).

Утверждение 1. Для любого разбиения T прямоугольника R при любом выборе промежуточных точек (ξ_k, η_l) на частичных прямоугольниках R_{kl} интегральная сумма σ удовлетворяет неравенствам $s \leq \sigma \leq S$.

Утверждение 2. Для любого фиксированного разбиения T и любого числа $\varepsilon > 0$ промежуточные точки $(\xi_k, \eta_l) \in R_{kl}$ можно выбрать так, что интегральная сумма σ будет удовлетворять неравенствам $0 \leq S - \sigma < \varepsilon$.

Точки (ξ_k, η_l) можно выбрать и таким образом, что интегральная сумма σ будет удовлетворять неравенствам $0 \leq \sigma - s < \varepsilon$.

Утверждение 3. Пусть T' — измельчение разбиения T прямоугольника R и S', s' — соответственно верхняя и нижняя суммы разбиения T' . Тогда справедливы неравенства

$$s \leq s', S' \leq S.$$

Утверждение 4. Пусть T' и T'' — любые два разбиения прямоугольника R , S', s' и S'', s'' — верхние и нижние суммы этих разбиений соответственно. Тогда

$$s' \leq S'', s'' \leq S'.$$

Утверждение 5. Множество $\{S\}$ верхних сумм данной функции $f(x, y)$ для всевозможных разбиений прямоугольника R ограничено снизу. Множество нижних сумм $\{s\}$ ограничено сверху.

Таким образом, существуют числа

$$\bar{I} = \inf \{S\}, \quad \underline{I} = \sup \{s\},$$

называемые соответственно верхним и нижним интегралами Дарбу (от функции $f(x, y)$ по прямоугольнику R). Легко убедиться в том, что $\underline{I} \leq \bar{I}$.

Утверждение 6. Пусть T' — измельчение разбиения T прямоугольника R , полученное из T добавлением p новых прямых, и пусть S', s' и S, s — верхние и нижние интегральные суммы разбиений T' и T соответственно. Тогда имеют место оценки

$$|S - S'| \leq (M_R - m_R) p \Delta d; \quad s' - s \leq (M_R - m_R) p \Delta d,$$

где $M_R = \sup_R f(x, y)$, $m_R = \inf_R f(x, y)$, Δ — диаметр разбиения T , d — диаметр прямоугольника R .

В полной аналогии с понятием предела интегральных сумм (определение 2 п. 1) вводится понятие предела верхних и нижних сумм. Так, число $\bar{I}$ называется пределом верхних сумм S при $\Delta \rightarrow 0$, если для любого $\varepsilon > 0$ можно указать $\delta > 0$ такое, что $|S - \bar{I}| < \varepsilon$ при $\Delta < \delta$.

Утверждение 7. Верхний и нижний интегралы Дарбу $\bar{I}$ и $\underline{I}$ от функции $f(x, y)$ по прямоугольнику R являются пределами соответственно верхних и нижних сумм при $\Delta \rightarrow 0$.

Из приведенных утверждений 1—7 вытекает следующая

Теорема 3.1. Для того чтобы ограниченная на прямоугольнике R функция $f(x, y)$ была интегрируема на этом прямоугольнике, необходимо и достаточно, чтобы для любого $\varepsilon > 0$ нашлось такое разбиение T прямоугольника R , для которого $S - s < \varepsilon$.

Как и в гл. 9 ч. 1, теорема 3.1 в соединении с теоремой о равномерной непрерывности позволяет выделить важнейшие классы интегрируемых функций.

Теорема 3.2. Любая непрерывная в прямоугольнике R функция $f(x, y)$ интегрируема на этом прямоугольнике.

Определение 1. Назовем элементарной фигурой множество точек, представляющих собой объединение конечного числа прямоугольников (со сторонами, параллельными осям Ox и Oy).

Заметим, что в определении 1 можно брать прямоугольники, как имеющие общие внутренние точки, так и не имеющие их.

Определение 2. Будем говорить, что функция $f(x, y)$ обладает в прямоугольнике R (в произвольной замкнутой области D) I -свойством, если: 1) $f(x, y)$ ограничена в R (в D); 2) для лю-

бого $\varepsilon > 0$ найдется элементарная фигура площади, меньшей ε , содержащая все точки и линии разрыва функции $f(x, y)$.

Теорема 3.3. Если функция $f(x, y)$ обладает в прямоугольнике 1-свойством, то она интегрируема на этом прямоугольнике.

Доказательство теорем 3.2 и 3.3 полностью аналогично доказательству теорем 9.1 и 9.2 ч. 1.

3. Определение и условия существования двойного интеграла для произвольной области. В п. 2 § 2 гл. 10 ч. 1 были введены понятия квадратуемости и площади плоской фигуры. Напомним, что плоской фигурой мы называли часть плоскости, ограниченную простой замкнутой кривой. Плоская фигура называется квадратуемой, если верхняя и нижняя площади этой фигуры¹⁾ равны между собой. Это число называется площадью фигуры. Эти понятия без каких-либо изменений переносятся на случай произвольного ограниченного множества Q точек плоскости.

Во всех определениях и утверждениях указанного пункта вместо плоской фигуры можно брать произвольное ограниченное множество Q на плоскости.

В том же пункте было дано определение кривой (или границы фигуры) площади нуль: Γ называется кривой площади нуль, если для любого $\varepsilon > 0$ найдется многоугольник, содержащий все точки Γ и имеющий площадь, меньшую ε . В этом определении термин «многоугольник» можно заменить термином «элементарная фигура». Это следует из того, что любая элементарная фигура является многоугольником, а любой многоугольник с площадью, меньшей числа ε , содержится в элементарной фигуре, имеющей площадь, меньшую числа 32ε (см. теорему 10.2' ч. 1).

Утверждение 1. Пусть кривая Γ имеет площадь нуль и плоскость покрыта квадратной сеткой с шагом h . Тогда для любого $\varepsilon > 0$ найдется число $h > 0$ такое, что сумма площадей всех квадратов, имеющих общие точки с Γ , меньше ε .

Действительно, для каждого $\varepsilon > 0$ можно фиксировать некоторую элементарную фигуру Q , содержащую внутри себя Γ и имеющую площадь, меньшую $\varepsilon/4$. При достаточно малом h все квадраты, имеющие общие с Γ точки, содержатся в элементарной фигуре, получающейся заменой каждого прямоугольника прямоугольником со вдвое большими сторонами и с тем же центром.

Отметим, что класс кривых площади нуль весьма широк. Этому классу принадлежит, например, любая спрямляемая кривая (см. § 1 гл. 10 ч. 1).

Введем понятие двойного интеграла для произвольной двумерной области D . Пусть D — замкнутая ограниченная область, граница Γ которой имеет площадь нуль, а $f(x, y)$ — произвольная

¹⁾ Верхняя площадь определяется как точная нижняя грань площадей всех многоугольников, содержащих фигуру, а нижняя площадь — как точная верхняя грань площадей всех многоугольников, содержащихся в фигуре.

ограниченная функция, определенная в области D . Обозначим через R любой прямоугольник (со сторонами, параллельными координатным осям), содержащий область D (рис. 3.2). Определим в прямоугольнике R следующую функцию:

$$F(x, y) = \begin{cases} f(x, y), & (x, y) \in D; \\ 0, & (x, y) \in R \setminus D. \end{cases} \quad (3.2)$$




Рис. 3.2

Определение. Функцию $f(x, y)$ назовем *интегрируемой* в области D , если функция $F(x, y)$ интегрируема в прямоугольнике R . Число $I = \iint_R F(x, y) dx dy$ назовем *двойным интегралом* от функции $f(x, y)$ по области D и обозначим символом

$$I = \iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(M) d\sigma.$$

Из этого определения вытекает следующее

Утверждение 2. Интеграл $\iint_D 1 dx dy$ равен площади области D .

Действительно, подвергая соответствующий прямоугольник R все более мелким разбиениям, получим, что верхние интегральные суммы этих разбиений будут равны площадям элементарных фигур, содержащих D , а нижние суммы — площадям элементарных фигур, содержащихся в D . Интегрируемость функции $f(x, y) = 1$ в области D следует из теоремы 3.3.

Утверждение 3. Пусть функция $f(x, y)$ интегрируема в ограниченной квадратуемой области D , плоскость покрыта квадратной сеткой с шагом h , $C_1, C_2, \dots, C_{n(h)}$ — квадраты указанной сетки, целиком содержащиеся в области D , (ξ_k, η_k) — произвольная точка квадрата C_k , $m_k = \inf_{C_k} f(x, y)$, $k = 1, 2, \dots, n(h)$. Тогда каждая из сумм

$$\sum_{k=1}^{n(h)} f(\xi_k, \eta_k) h^2, \quad \sum_{k=1}^{n(h)} m_k h^2$$

имеет предел при $h \rightarrow 0$, равный $\iint_D f(x, y) dx dy$.

Для доказательства достаточно заметить, что указанные суммы отличаются от обычной интегральной суммы (соответственно от нижней суммы) функции $f(x, y)$ в области D только отсутствием

слагаемых по квадратам, имеющим общие точки с границей Γ области D , причем сумма всех отсутствующих слагаемых по модулю меньшей произведения числа $M = \sup_D |f(x, y)|$ на площадь S элементарной фигуры, состоящей из квадратов, имеющих общие точки с Γ . Поскольку граница Γ имеет площадь нуль, то согласно утверждению 1 $S \rightarrow 0$ при $h \rightarrow 0$.

Из теоремы 3.3 и приведенного выше определения двойного интеграла вытекает следующая основная теорема.

Теорема 3.4. *Если функция $f(x, y)$ обладает в области D I -свойством, то она интегрируема в этой области.*

Доказательство. Функция $F(x, y)$, определенная формулой (3.2), в данном случае обладает I -свойством в прямоугольнике R . В самом деле, функция $F(x, y)$ ограничена в R и все ее точки и линии разрыва либо совпадают с соответствующими разрывами $f(x, y)$, либо лежат на границе Γ области D . Но граница Γ имеет площадь нуль. Таким образом, утверждение теоремы следует из теоремы 3.3. Теорема доказана.

Следствие 1 из теоремы 3.4. *Если функция $f(x, y)$ ограничена в области D и имеет в этой области разрывы лишь на конечном числе спрямляемых линий, то $f(x, y)$ интегрируема в области D .*

Следствие 2 из теоремы 3.4. *Если функция $f(x, y)$ обладает в области D I -свойством, а $g(x, y)$ ограничена и совпадает с $f(x, y)$ всюду в D , за исключением множества точек площади нуль, то функция $g(x, y)$ интегрируема в области D , причем*

$$\iint_D g(x, y) dx dy = \iint_D f(x, y) dx dy.$$

В отношении данного нами определения двойного интеграла возникает вопрос о его корректности. Зависит ли факт существования двойного интеграла и его величина 1) от выбора на плоскости координатных осей Ox и Oy , 2) от выбора прямоугольника R , на котором определяется функция $F(x, y)$?

В следующем пункте будет дано другое определение интегрируемости функции $f(x, y)$ и двойного интеграла, не зависящее ни от выбора координатных осей, ни от выбора прямоугольника R , и доказана эквивалентность этого определения приведенному выше.

4. Общее определение двойного интеграла. Пусть D — замкнутая ограниченная область с границей Γ площади нуль. Разобьем область D при помощи конечного числа произвольных кривых площади нуль на конечное число r (не обязательно связных) замкнутых частичных областей $D_1, D_2, \dots, D_r$. Каждая область D_i имеет границу площади нуль и потому квадратуема. Обозначим площадь области D_i символом ΔD_i . В каждой области D_i выберем произвольную точку $P_i(\xi_i, \eta_i)$.

Определение 1. Число

$$\tilde{\sigma} = \sum_{i=1}^r f(P_i) \Delta D_i \quad (3.3)$$

называется *интегральной суммой* функции $f(x, y)$, соответствующей данному разбиению области D на частичные области D_i и данному выбору промежуточных точек P_i в частичных областях.

Назовем диаметром области D_i число $d_i = \sup_{M_1, M_2 \in D_i} \rho(M_1, M_2)$ ($\rho(M_1, M_2)$ — расстояние между точками M_1, M_2). Диаметр разбиения области D назовем число $\tilde{\Delta} = \max_{1 \leq i \leq r} d_i$.

Определение 2. Число I называется *пределом интегральных сумм* (3.3) при $\tilde{\Delta} \rightarrow 0$, если для любого положительного числа ε можно указать такое положительное число δ , что при $\tilde{\Delta} < \delta$ независимо от выбора точек P_i в частичных областях D_i выполняется неравенство $|\tilde{\sigma} - I| < \varepsilon$.

Определение 3 (общее определение интегрируемости). Функция $f(x, y)$ называется *интегрируемой* (по Риману) в области D , если существует конечный предел I интегральных сумм $\tilde{\sigma}$ этой функции при $\tilde{\Delta} \rightarrow 0$. Этот предел I называется *двойным интегралом* от функции $f(x, y)$ по области D .

Докажем следующую фундаментальную теорему.

Теорема 3.5. *Общее определение интегрируемости эквивалентно определению, данному в п. 3.*

Доказательство. 1) Пусть функция $f(x, y)$ интегрируема в области D согласно общему определению интегрируемости и ее двойной интеграл согласно этому определению равен I . Заклучим D в прямоугольник R , разобьем его на частичные прямоугольники и введем на R функцию $F(x, y)$ по правилу (3.2). Рассмотрим интегральную сумму (3.3) $\tilde{\sigma}$ функции $f(x, y)$ и интегральную сумму (3.1) σ функции $F(x, y)$. Эти суммы могут отличаться друг от друга лишь слагаемыми, соответствующими частичным прямоугольникам разбиения, имеющим общие точки с границей Γ области D . Поскольку Γ имеет площадь нуль, а функция $f(x, y)$ ограничена, то эта функция интегрируема и согласно определению п. 3. По этому же определению она имеет тот же самый двойной интеграл I .

2) Пусть функция $f(x, y)$ интегрируема в области D согласно определению п. 3 и I — двойной интеграл от $f(x, y)$ по области D согласно этому определению. Докажем, что для функции $f(x, y)$ существует равный I предел интегральных сумм $\tilde{\sigma}$ при $\tilde{\Delta} \rightarrow 0$.

Составим для данного разбиения области D верхнюю и нижнюю суммы

$$\tilde{S} = \sum_{i=1}^r \tilde{M}_i \Delta D_i \quad \text{и} \quad \tilde{s} = \sum_{i=1}^r \tilde{m}_i \Delta D_i$$

(здесь $\tilde{M}_i = \sup_{D_i} f(x, y)$, $\tilde{m}_i = \inf_{D_i} f(x, y)$). Так как для любого разбиения (при любом выборе промежуточных точек в интегральной сумме $\tilde{\sigma}$)

$$\tilde{s} \leq \tilde{\sigma} \leq \tilde{S},$$

то достаточно доказать, что обе суммы $\tilde{S}$ и $\tilde{s}$ стремятся к I при $\tilde{\Delta} \rightarrow 0$: для любого $\varepsilon > 0$ найдется $\delta > 0$ такое, что каждая из сумм $\tilde{S}$ и $\tilde{s}$ отклоняется от I меньше чем на ε при $\tilde{\Delta} < \delta$.

Фиксируем произвольное $\varepsilon > 0$. В силу теоремы 3.1 и утверждения 1 для этого ε найдется разбиение T прямоугольника $R (D \subset R)$ на частичные прямоугольники R_k такое, что для него

$$S - s < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{и} \quad \sum_{R_k \cap \Gamma \neq \emptyset} \Delta R_k < \frac{\varepsilon}{6M_0}, \quad (3.4)$$

где $M_0 = \sup_D |f(x, y)|$.

Заклучим все отрезки прямых, производящих разбиение T , и границу Γ области D строго внутрь элементарной фигуры Q , площадь которой меньше числа $\frac{\varepsilon}{6M_0}$. Тогда заведомо существует положительная точная нижняя грань δ расстояния между двумя точками, одна из которых принадлежит границе фигуры Q , а другая — отрезкам прямых, производящим разбиение T , или границе Γ области D . Построение фигуры Q может быть проведено по схеме, предложенной при обосновании утверждения 1 в п. 3.

Докажем, что для сумм $\tilde{S}$ и $\tilde{s}$ любого разбиения области D , удовлетворяющего условию $\tilde{\Delta} < \delta$, справедливы неравенства

$$\tilde{S} < S + \varepsilon/2, \quad s - \varepsilon/2 < \tilde{s}. \quad (3.5)$$

Докажем первое неравенство (3.5) (второе неравенство доказывается аналогично).

Удалим из суммы $\tilde{S}$ все слагаемые $\tilde{M}_i \Delta D_i$, соответствующие областям D_i , каждая из которых не лежит целиком в одном частичном прямоугольнике разбиения T . Все такие области $D_i \subset Q$ (так как $d_i \leq \tilde{\Delta} < \delta$), а поэтому общая сумма площадей таких областей меньше числа $\varepsilon/6M_0$.

Следовательно, сумма всех удаленных слагаемых $\tilde{M}_i \Delta D_i$ меньше числа $\varepsilon/6$, и справедлива оценка

$$\tilde{S} < \sum_i' \tilde{M}_i \Delta D_i + \frac{\varepsilon}{6}, \quad (3.6)$$

где штрих обозначает, что сумма распространена лишь на области D_i , каждая из которых целиком содержится в одном из прямоугольников разбиения T .

Заменим теперь в правой части (3.6) точные грани $\tilde{M}_i$ в областях D_i , содержащихся в частичном прямоугольнике R_k , точной верхней гранью M_k в прямоугольнике R_k . Введем обозначение $\tilde{R}_k = \bigcup_{i \subset R_k} D_i$ и через $\Delta \tilde{R}_k$ обозначим площадь области $\tilde{R}_k$. Тогда получим

$$\tilde{S} < \sum_k M_k \Delta \tilde{R}_k + \frac{\varepsilon}{6}. \quad (3.7)$$

Для прямоугольников $R_k \subset D$ области $R_k \setminus \tilde{R}_k \subset Q$, поэтому для них

$$\sum_k \Delta(R_k \setminus \tilde{R}_k) = \sum_k (\Delta R_k - \Delta \tilde{R}_k) \leq \Delta Q < \frac{\varepsilon}{6M_0};$$

для прямоугольников R_k , пересекающихся с Γ ,

$$\sum_k \Delta(R_k \setminus \tilde{R}_k) \leq \sum_k \Delta R_k < \frac{\varepsilon}{6M_0},$$

и, следовательно,

$$\left| S - \sum_k M_k \Delta \tilde{R}_k \right| = \left| \sum_k M_k (\Delta R_k - \Delta \tilde{R}_k) \right| < \frac{\varepsilon}{6} + \frac{\varepsilon}{6} = \frac{\varepsilon}{3},$$

т. е.

$$\sum_k M_k \Delta \tilde{R}_k < S + \frac{\varepsilon}{3}.$$

Из последнего неравенства и из неравенства (3.7) получаем, что

$$\tilde{S} < S + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{6} = S + \frac{\varepsilon}{2},$$

и первое неравенство (3.5) доказано. Второе неравенство (3.5) доказывается аналогично.

Из (3.5) получим

$$s - \frac{\varepsilon}{2} < \tilde{s} \leq \tilde{S} < S + \frac{\varepsilon}{2}. \quad (3.8)$$

Так как в силу (3.4) каждая из сумм s и S отклоняется от I меньше чем на $\varepsilon/2$, то каждая из сумм $\bar{s}$ и $\bar{S}$ в силу (3.8) отклоняется от I меньше чем на ε . Теорема доказана.

§ 2. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ДВОЙНОГО ИНТЕГРАЛА

Свойства двойного интеграла вполне аналогичны соответствующим свойствам однократного определенного интеграла.

1°. Аддитивность. Если функция $f(x, y)$ интегрируема в области D и если область D при помощи кривой Γ площади нуль разбивается на две связные и не имеющие общих внутренних точек области D_1 и D_2 , то функция $f(x, y)$ интегрируема в каждой из областей D_1 и D_2 , причем

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D_1} f(x, y) dx dy + \iint_{D_2} f(x, y) dx dy. \quad (3.9)$$

Для доказательства этого свойства разобьем области D_1 и D_2 на конечное число квадратуемых областей, тем самым получим разбиение области D . Пусть S и $\bar{s}$, S_1 и $\bar{s}_1$, S_2 и $\bar{s}_2$ — верхние и нижние суммы функции $f(x, y)$ соответственно в областях D , D_1 , D_2 .

Так как $D_1 \subset D$ и $D_2 \subset D$, то $S_1 - \bar{s}_1 \leq S - \bar{s}$ и $S_2 - \bar{s}_2 \leq S - \bar{s}$, откуда и вытекает интегрируемость функции $f(x, y)$ в каждой из областей D_1 и D_2 .

Справедливость соотношения (3.9) следует из того, что

$$S = S_1 + S_2, \quad \bar{s} = \bar{s}_1 + \bar{s}_2. \quad (3.10)$$

З а м е ч а н и е. Справедливо и обратное утверждение: из интегрируемости функции $f(x, y)$ в каждой из областей D_1 и D_2 следует интегрируемость функций в области D и справедливость формулы (3.9).

Действительно, разбивая область D на конечное число квадратуемых частей D_i и вводя верхние и нижние суммы функции $f(x, y)$ в областях D , D_1 , D_2 , мы получим равенства (3.10), верные с точностью до слагаемых, отвечающих тем областям D_i , которые имеют общие внутренние точки с кривой Γ . Кривая Γ имеет площадь нуль, функция $f(x, y)$ ограничена, поэтому общая сумма этих слагаемых будет стремиться к нулю при стремлении к нулю диаметра разбиения Δ .

Вывод последующих свойств (так же, как и вывод свойства 1) вполне аналогичен выводу соответствующих свойств однократного определенного интеграла. Ограничимся формулировкой этих свойств.

2°. Линейное свойство. Пусть функции $f(x, y)$ и $g(x, y)$ интегрируемы в области D , α и β — произвольные вещественные

числа. Тогда функция $\alpha f(x, y) + \beta g(x, y)$ также интегрируема в области D , причем

$$\iint_D [\alpha f(x, y) + \beta g(x, y)] dx dy = \alpha \iint_D f(x, y) dx dy + \beta \iint_D g(x, y) dx dy.$$

3°. Если функции $f(x, y)$ и $g(x, y)$ интегрируемы в области D , то и произведение этих функций интегрируемо в D .

4°. Если функции $f(x, y)$ и $g(x, y)$ интегрируемы в области D и всюду в этой области $f(x, y) \leq g(x, y)$, то

$$\iint_D f(x, y) dx dy \leq \iint_D g(x, y) dx dy.$$

5°. Если функция $f(x, y)$ интегрируема в области D , то и функция $|f(x, y)|$ интегрируема в области D , причем

$$\left| \iint_D f(x, y) dx dy \right| \leq \iint_D |f(x, y)| dx dy.$$

(Обратное утверждение неверно: из интегрируемости $|f(x, y)|$ в D , вообще говоря, не вытекает интегрируемость $f(x, y)$ в D .)

6°. Если функция $f(x, y)$ интегрируема в области D , а $g(x, y)$ ограничена и совпадает с $f(x, y)$ всюду в D , за исключением множества точек площади нуль, то и $g(x, y)$ интегрируема в области D .

7°. Теорема о среднем значении. Если функции $f(x, y)$ и $g(x, y)$ интегрируемы в области D , функция $g(x, y)$ неотрицательна (неположительна) всюду в этой области, $M = \sup_D f(x, y)$, $m = \inf_D f(x, y)$, то найдется число $\mu \in [m, M]$ такое, что справедлива формула

$$\iint_D f(x, y) g(x, y) dx dy = \mu \iint_D g(x, y) dx dy.$$

Если при этом функция $f(x, y)$ непрерывна в D , а область D связна, то в этой области найдется такая точка (ξ, η) , что $\mu = f(\xi, \eta)$.

8°. Геометрическое свойство. $\iint_D 1 dx dy$ равен площади области D (см. утверждение 2 из п. 3).

§ 3. СВЕДЕНИЕ ДВОЙНОГО ИНТЕГРАЛА К ПОВТОРНОМУ ОДНОКРАТНОМУ

Эффективным способом вычисления двойных интегралов является сведение их к однократным интегралам.

1. Случай прямоугольника. Начнем с простого случая, когда область интегрирования представляет собой прямоугольник $R = [a \leq x \leq b] \times [c \leq y \leq d]$.

Теорема 3.6. Пусть функция $f(x, y)$ интегрируема в прямоугольнике R , и пусть для каждого $x \in [a, b]$ существует однократный интеграл

$$I(x) = \int_c^d f(x, y) dy. \quad (3.11)$$

Тогда существует повторный интеграл

$$\int_a^b I(x) dx = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy$$

и справедливо равенство

$$\iint_R f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy. \quad (3.12)$$

Доказательство. Разобьем прямоугольник R с помощью точек $\{x_k\}, \{y_l\}$ на np частичных прямоугольников

$$R_{kl} = [x_{k-1} \leq x \leq x_k] \times [y_{l-1} \leq y \leq y_l]$$

($k=1, 2, \dots, n; l=1, 2, \dots, p$) так, что $x_0=a, x_n=b, y_0=c, y_p=d$ и $\Delta x_k = x_k - x_{k-1} > 0, \Delta y_l = y_l - y_{l-1} > 0$.

Пусть, как и в § 1, число Δ обозначает диаметр разбиения прямоугольника R , $M_{kl} = \sup_{R_{kl}} f(x, y)$, $m_{kl} = \inf_{R_{kl}} f(x, y)$, а S и s — верхняя и нижняя суммы функции $f(x, y)$. Тогда всюду на прямоугольнике R_{kl}

$$m_{kl} \leq f(x, y) \leq M_{kl}. \quad (3.13)$$

Фиксируем произвольное число $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$ и проинтегрируем неравенство (3.13) по y в пределах от y_{l-1} до y_l , положив в нем $x = \xi_k$. Получим

$$m_{kl} \Delta y_l \leq \int_{y_{l-1}}^{y_l} f(\xi_k, y) dy \leq M_{kl} \Delta y_l. \quad (3.14)$$

Умножим (3.14) на Δx_k , просуммируем полученные неравенства сначала по всем l от 1 до p , а затем по всем k от 1 до n . Используя обозначение (3.11), будем иметь

$$s = \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^p m_{kl} \Delta x_k \Delta y_l \leq \sum_{k=1}^n I(\xi_k) \Delta x_k \leq \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^p M_{kl} \Delta x_k \Delta y_l = S. \quad (3.15)$$

Пусть $\Delta \rightarrow 0$. Тогда и $\max \Delta x_k \rightarrow 0$. При этом s и S стремятся к двойному интегралу $\iint_R f(x, y) dx dy$. Следовательно, существует предел и среднего члена в (3.15), равный тому же самому двойному интегралу. Но этот предел по определению однократного интеграла равен

$$\int_a^b I(x) dx = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy.$$

Таким образом, доказано существование повторного интеграла и равенство (3.12). Теорема доказана.

З а м е ч а н и е. Из доказательства теоремы 3.6 ясно, что x и y можно поменять ролями, т. е. можно предположить существование двойного интеграла и существование для любого $y \in [c, d]$ однократного интеграла

$$K(y) = \int_a^b f(x, y) dx.$$

Тогда теорема будет утверждать существование повторного интеграла

$$\int_c^d K(y) dy = \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx$$

и равенство его двойному интегралу.

2. Случай произвольной области. Рассмотрим теперь произвольную ограниченную замкнутую квадрируемую область D с границей Γ .

Теорема 3.7. Пусть выполнены следующие условия: 1) область D такова, что любая прямая, параллельная оси Oy , пересекает границу Γ по целому отрезку $[y_1(x), y_2(x)]$ либо не более чем в двух точках, ординаты которых суть $y_1(x)$ и $y_2(x)$, где $y_1(x) \leq y_2(x)$ (рис. 3.3); 2) функция $f(x, y)$ интегрируема в области D и для любого $x \in [x_1, x_2]$ допускает существование однократного интеграла

$$\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$$

($[x_1, x_2]$ — проекция области D на ось Ox). Тогда существует повторный интеграл

$$\int_{x_1}^{x_2} dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$$

и справедливо равенство

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_{x_1}^{x_2} dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy. \quad (3.16)$$

Доказательство. Обозначим через R прямоугольник со сторонами, параллельными координатным осям, содержащий область D , а через $F(x, y)$ функцию (3.2), совпадающую с $f(x, y)$ в




Рис. 3.3




Рис. 3.4

D и равную нулю в остальных точках R . Для $F(x, y)$ выполнены в R все условия теоремы 3.6 и, следовательно, справедлива формула (3.12), которая переходит в формулу (3.16) (в силу выбора функции $F(x, y)$). Теорема доказана.

Замечание 1. В теореме 3.7 можно поменять ролями x и y , т. е. можно предположить, что выполнены следующие два условия: 1) область D такова, что любая прямая, параллельная оси Ox , пересекает границу Γ либо по целому отрезку $[x_1(y), x_2(y)]$, либо не более чем в двух точках, абсциссы которых суть $x_1(y)$ и $x_2(y)$, где $x_1(y) \leq x_2(y)$; 2) функция $f(x, y)$ интегрируема в области D и для любого $y \in [y_1, y_2]$ допускает существование однократного интеграла

$$\int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx$$

($[y_1, y_2]$ — проекция D на ось Oy).

§ 4. ТРОЙНЫЕ И n -КРАТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ

Изложенная нами теория двойного интеграла без каких-либо осложнений и новых идей переносится на случай тройного и вообще n -кратного интеграла. Остановимся на основных моментах теории n -кратного интеграла.

При определении класса квадратуемых множеств в E^2 и класса кубуемых множеств в E^3 мы заимствовали из курса средней школы понятия площади многоугольной фигуры и объема многогранного тела, которые обладают свойствами аддитивности, инвариантности, монотонности (см. § 2, 3 гл. 10 ч. 1). В пространстве E^n , $n > 3$ дело осложняется тем, что нам не известен объем множества (тела) в E^n , ограниченного гиперплоскостями. Для введения класса кубуемых тел в E^n будем считать известным способ вычисления объема частного вида тел в E^n — n -мерного прямоугольного параллелепипеда.

Напомним (см. § 1 гл. 13 ч. 1), что множество $R = [a_1, b_1] \times \times [a_2, b_2] \times \dots \times [a_n, b_n]$ всех точек $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ в E^n , для которых $a_i \leq x_i \leq b_i$, $i = 1, 2, \dots, n$, называется n -мерным координатным прямоугольным параллелепипедом. Если $b_i - a_i = h$ для всех i , то R называют n -мерным координатным кубом с ребром h . Точки $(c_1, c_2, \dots, c_n)$, где c_i равны либо a_i , либо b_i , назовем вершинами R , а сегменты, соединяющие вершины типа $(c_1, c_2, \dots, c_{i-1}, a_i, c_{i+1}, \dots, c_n)$ и $(c_1, c_2, \dots, c_{i-1}, b_i, c_{i+1}, \dots, c_n)$, — ребрами R . Все ребра R параллельны координатным осям.

По аналогии с E^1 , E^2 , E^3 естественно определить объем n -мерного прямоугольного параллелепипеда R как число, равное произведению длин всех его ребер, выходящих из одной вершины, т. е.

как число
$$\mu(R) = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i).$$

Назовем элементарным телом множество точек E^n , представляющее собой объединение конечного числа n -мерных прямоугольных параллелепипедов, не имеющих общих внутренних точек, ребра которых параллельны осям координат. Объем любого элементарного тела нам известен и равен сумме объемов составляющих его параллелепипедов.

Пусть теперь D — произвольная ограниченная область в E^n . Назовем нижним объемом области D точную нижнюю грань $\mu_* = \mu_*(D)$ объемов всех содержащихся в D элементарных тел, а верхним объемом области D — точную верхнюю грань $\mu^* = \mu^*(D)$ объемов всех элементарных тел, содержащихся области D . Легко убедиться в том, что $\mu_* \leq \mu^*$.

Область D называется кубуемой, если $\mu_* = \mu^*$. При этом число $\mu(D) = \mu_*(D) = \mu^*(D)$ называется n -мерным объемом области D .

В полной аналогии со случаем плоской области доказывается следующее утверждение:

для того чтобы n -мерная область D была кубируемой, необходимо и достаточно, чтобы для любого $\varepsilon > 0$ нашлись два элементарных тела, одно из которых содержит D , а другое содержится в D , разность объемов которых по модулю меньше числа ε .

Поверхностью (или многообразием) n -мерного объема нуль назовем замкнутое множество, все точки которого принадлежат элементарному телу как угодно малого n -мерного объема.

Из приведенного утверждения получаем, что n -мерная область D кубируема тогда и только тогда, когда граница этой области представляет собой многообразие n -мерного объема нуль.

Определим n -кратный интеграл от функции n переменных $f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ сначала в n -мерном координатном прямоугольном параллелепипеде R . С этой целью производим разбиение T параллелепипеда R конечным числом гиперплоскостей, параллельных координатным осям, на конечное число частичных n -мерных параллелепипедов.

Для указанного разбиения T в полной аналогии со случаем $n=2$ определяем интегральную, верхнюю и нижнюю суммы любой ограниченной в R функции $f(x)$. Теперь определим n -кратный интеграл от функции $f(x)$ по параллелепипеду R как предел интегральных сумм при стремлении к нулю диаметра разбиения T параллелепипеда R .

Как и для случая $n=2$, теория Дарбу устанавливает необходимое и достаточное условие интегрируемости в следующей форме:

Для интегрируемости функции $f(x)$ в параллелепипеде R необходимо и достаточно, чтобы для любого $\varepsilon > 0$ нашлось разбиение T параллелепипеда R , для которого разность верхней и нижней сумм была меньше ε .

Пусть теперь D — произвольная замкнутая ограниченная n -мерная область, граница которой имеет n -мерный объем нуль, n -кратный интеграл от функции f по области D определяется как интеграл по n -мерному координатному прямоугольному параллелепипеду R , содержащему область D , от функции F , совпадающей с f в D и равной нулю вне D .

Для обозначения n -кратного интеграла от функции $f(x)$ по области D естественно использовать один из следующих символов:

$$\int_D f(x) dx = \iiint_D \dots \int f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \dots dx_n. \quad (3.17)$$

Отметим, что произведение $dx = dx_1 dx_2 \dots dx_n$ обычно называют элементом объема в пространстве E^n .

Точно так же, как и для случая $n=2$, доказывается интегрируемость по n -мерной области D любой непрерывной функции, а

также функции f , обладающей в области D I -свойством (т. е. ограниченной в D функции, множество точек разрыва которой имеет n -мерный объем нуль). Вообще, изменение интегрируемой функции f на множестве точек n -мерного объема нуль не изменяет величину интеграла от этой функции.

Для определения n -кратного интеграла можно использовать разбиение области D и при помощи конечного числа произвольных многообразий объема нуль на конечное число частичных областей произвольной формы. В полной аналогии с теоремой 3.5 доказывается, что такое общее определение n -кратного интеграла эквивалентно указанному выше определению.

Для n -кратного интеграла остаются справедливыми 8 основных свойств, сформулированные в § 2 для двойного интеграла.

В полной аналогии с теоремами 3.6 и 3.7 устанавливается формула повторного интегрирования для интеграла (3.17).

Пусть n -мерная область D_n обладает тем свойством, что любая прямая, параллельная оси Ox_1 , пересекает ее границу не более чем в двух точках (или по целому отрезку, ограниченному двумя точками), проекции которых на ось Ox_1 суть $a(x_2, x_3, \dots, x_n)$ и $b(x_2, x_3, \dots, x_n)$, где $a(x_2, x_3, \dots, x_n) \leq b(x_2, x_3, \dots, x_n)$.

Пусть функция $f(x)$ интегрируема в области D_n и допускает существование для любых $x_2, x_3, \dots, x_n$ из $(n-1)$ -мерной области D_{n-1} , являющейся проекцией D_n на координатную гиперплоскость $Ox_2x_3\dots x_n$, однократного интеграла

$$J(x_2, \dots, x_n) = \int_{a(x_2, x_3, \dots, x_n)}^{b(x_2, x_3, \dots, x_n)} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1.$$

Тогда существует $(n-1)$ -кратный интеграл

$$\begin{aligned} & \int \dots \int_{D_{n-1}} J(x_2, \dots, x_n) dx_2 \dots dx_n = \\ & = \int \dots \int_{D_{n-1}} dx_2 dx_3 \dots dx_n \int_{a(x_2, \dots, x_n)}^{b(x_2, \dots, x_n)} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 \end{aligned}$$

по области D_{n-1} и справедлива формула повторного интегрирования

$$\begin{aligned} & \int \dots \int_{D_n} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \dots dx_n = \\ & = \int \dots \int_{D_{n-1}} dx_2 dx_3 \dots dx_n \int_{a(x_2, x_3, \dots, x_n)}^{b(x_2, x_3, \dots, x_n)} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1. \quad (3.18) \end{aligned}$$

В сформулированном утверждении в роли x_1 может выступать любая из переменных $x_2, x_3, \dots, x_n$.

Договоримся называть область D простой, если для каждой из координатных осей любая прямая, параллельная этой оси, либо пересекает границу этой области не более чем в двух точках, либо имеет на этой границе целый отрезок. Примером простой области может служить n -мерный прямоугольный параллелепипед (ребра которого не обязательно параллельны координатным осям). Для простой области формулу повторного интегрирования можно применять по любой из переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$.

В заключение отметим, что, как и для случая $n=2$, справедливо следующее утверждение:

Пусть функция $f(x)$ интегрируема в ограниченной кубируемой области D . Пусть пространство E^n покрыто сеткой n -мерных кубов с ребром h ; $C_1, C_2, \dots, C_{m(h)}$ — те кубы указанной сетки, которые целиком содержатся в D ; $\xi^{(k)} = (\xi_1^{(k)}, \xi_2^{(k)}, \dots, \xi_n^{(k)})$ — произвольная точка куба C_k ; $m_k = \inf_{C_k} f(x)$, $k=1, 2, \dots, m(h)$. Тогда каждая

из сумм

$$\sum_{k=1}^{m(h)} f(\xi^{(k)}) h^n \text{ и } \sum_{k=1}^{m(h)} m_k h^n$$

имеет предел при $h \rightarrow 0$, равный n -кратному интегралу (3.17) от функции $f(x)$ по области D .

Примеры. 1°. Вычислить объем $T_n(h)$ n -мерного симплекса

$$\{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in E^n: x_i \geq 0, i=1, 2, \dots, n; \sum_{i=1}^n x_i \leq h\}.$$

Применяя формулу (3.18) последовательно по переменным $x_1, x_2, \dots, x_n$, получим следующее выражение для объема:

$$T_n(h) = \int_0^h \left(\int_0^{h-x_1} \left(\dots \left(\int_0^{h-\sum_{i=1}^{n-1} x_i} 1 dx_n \right) \dots \right) dx_2 \right) dx_1. \quad (3.19)$$

Сделаем в каждом однократном интеграле в правой части (3.19) замену переменной $x_1 = h\xi_1, x_2 = h\xi_2, \dots, x_n = h\xi_n$. Получим

$$T_n(h) = h^n \int_0^1 \left(\int_0^{1-\xi_1} \left(\dots \left(\int_0^{1-\sum_{i=1}^{n-1} \xi_i} d\xi_n \right) \dots \right) d\xi_2 \right) d\xi_1. \quad (3.20)$$

Из (3.20) следует, что $T_n(h) = h^n T_n(1)$. Для вычисления $T_n(1)$ получаем следующую рекуррентную формулу:

$$T_n(1) = \int_0^1 \left(\int_0^{1-\xi_1} \left(\dots \left(\int_0^{1-\sum_{i=1}^{n-1} \xi_i} d\xi_n \right) \dots \right) d\xi_2 \right) d\xi_1 = \int_0^1 T_{n-1}(1-\xi_1) d\xi_1 = \\ = \int_0^1 (1-\xi_1)^{n-1} T_{n-1}(1) d\xi_1 = T_{n-1}(1) \int_0^1 (1-\xi_1)^{n-1} d\xi_1 = T_{n-1}(1) \frac{1}{n}.$$

Следовательно, $T_n(1) = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n-1} \cdot \dots \cdot \frac{1}{2} \cdot T_1(1)$, и так как $T_1(1) = 1$, то $T_n(h) = \frac{h^n}{n!}$.

2°. Вычислить объем $V_n(R)$ n -мерного шара $B(R)$ радиуса R :

$$B(R) = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) \in E^n : \sum_{i=1}^n x_i^2 \leq R^2 \right\}.$$

Используя формулу (3.18), получаем

$$V_n(R) = \iiint_{B(R)} 1 dx_1 dx_2 \dots dx_n = \\ = \int_{-R}^R \left(\int_{-\sqrt{R^2-x_1^2}}^{\sqrt{R^2-x_1^2}} \left(\dots \left(\int_{-\sqrt{R^2-\sum_{i=1}^{n-1} x_i^2}}^{\sqrt{R^2-\sum_{i=1}^{n-1} x_i^2}} 1 dx_n \right) \dots \right) dx_2 \right) dx_1.$$

В однократном интеграле по переменной x_i сделаем замену переменной $x_i = R\xi_i$ ($i=1, 2, \dots, n$). Получим

$$V_n(R) = R^n \int_{-1}^1 \left(\int_{-\sqrt{1-\xi_1^2}}^{\sqrt{1-\xi_1^2}} \left(\dots \left(\int_{-\sqrt{1-\sum_{i=1}^{n-1} \xi_i^2}}^{\sqrt{1-\sum_{i=1}^{n-1} \xi_i^2}} d\xi_n \right) \dots \right) d\xi_2 \right) d\xi_1 = R^n V_n(1).$$

Для вычисления $V_n(1)$, как и в предыдущем примере, получаем рекуррентную формулу

$$V_n(1) = \int_{-1}^1 V_{n-1}(\sqrt{1-\xi_1^2}) d\xi_1 = \int_{-1}^1 (1-\xi_1^2)^{\frac{n-1}{2}} V_{n-1}(1) d\xi_1 =$$

$$= V_{n-1}(1) \int_{-1}^1 (1 - \xi_1^2)^{\frac{n-1}{2}} d\xi_1.$$

Сделаем замену переменной $\xi_1 = \cos \theta$ в последнем интеграле, введем обозначение $I_k = \int_0^{\pi/2} \sin^k \theta d\theta$ и примем во внимание тот факт, что $V_1(1) = 2$. Тогда

$$\begin{aligned} V_n(1) &= 2V_{n-1}(1) \int_0^{\pi/2} \sin^n \theta d\theta = 2V_{n-1}(1) I_n = \dots = \\ &= 2^{n-1} I_n I_{n-1} \dots I_2 V_1(1) = 2^n I_n I_{n-1} \dots I_2. \end{aligned}$$

Таким образом, объем n -мерного шара радиуса R выражается формулой

$$V_n(R) = 2^n R^n I_n I_{n-1} \dots I_2,$$

откуда, используя известные формулы для интегралов I_k ²⁾, окончательно получаем

$$V_n(R) = \begin{cases} \frac{2^{\frac{n+1}{2}}}{n!!} R^n \pi^{\frac{n-1}{2}}, & \text{если } n \text{ нечетно;} \\ \frac{2^{\frac{n}{2}}}{n!!} R^n \pi^{\frac{n}{2}}, & \text{если } n \text{ четно.} \end{cases}$$

§ 5. ЗАМЕНА ПЕРЕМЕННЫХ В n -КРАТНОМ ИНТЕГРАЛЕ

Устанавливаемая в этом параграфе формула замены переменной является одним из важнейших средств вычисления n -кратного интеграла.

Предположим, что функция $f(y) = f(y_1, \dots, y_n)$ интегрируема в некоторой замкнутой, ограниченной кубируемой области D в пространстве E^n . Предположим, далее, что от переменных $y_1, y_2, \dots, y_n$ мы переходим к переменным $x_1, x_2, \dots, x_n$, т. е. совершаем преобразование

²⁾ В п. 4 § 5 гл. 9 ч. 1 показано, что

$$I_k = \begin{cases} \frac{(k-1)!!}{k!!}, & \text{если } k \text{ нечетно;} \\ \frac{(k-1)!!}{k!!} \cdot \frac{\pi}{2}, & \text{если } k \text{ четно.} \end{cases}$$

Доказательству теоремы 3.8 предположим семь лемм. Сначала дадим обоснование формулы (3.23) для случая, когда преобразование (3.21) является линейным (леммы 1—4), а затем сведем к этому случаю общее преобразование (3.21) (леммы 5—7).

Лемма 1. Если преобразование $z = \psi(x)$ является суперпозицией (или произведением) двух преобразований $z = \psi_1(y)$ и $y = \psi_2(x)$ (т. е. $z = \psi_1[\psi_2(x)]$), причем все участвующие в этих преобразованиях функции имеют непрерывные частные производные первого порядка, то якобиан $\frac{D(z)}{D(x)}$, взятый в точке $\overset{\circ}{x} = (\overset{\circ}{x}_1, \dots, \overset{\circ}{x}_n)$, равен произведению якобиана $\frac{D(y)}{D(x)}$, взятого в точке $\overset{\circ}{x}$, на якобиан $\frac{D(z)}{D(y)}$, взятый в точке $\overset{\circ}{y} = (\overset{\circ}{y}_1, \dots, \overset{\circ}{y}_n)$, где $\overset{\circ}{y} = \psi_2(\overset{\circ}{x})$, т. е.

$$\frac{D(z)}{D(x)} = \frac{D(z)}{D(y)} \cdot \frac{D(y)}{D(x)}, \quad (3.24)$$

или в подробной записи:

$$\frac{D(z_1, \dots, z_n)}{D(x_1, \dots, x_n)} = \frac{D(z_1, \dots, z_n)}{D(y_1, \dots, y_n)} \cdot \frac{D(y_1, \dots, y_n)}{D(x_1, \dots, x_n)}.$$

Доказательство леммы 1. Заметим, что для любых $i=1, 2, \dots, n$ и $k=1, 2, \dots, n$ элемент $\frac{\partial z_i}{\partial x_k}(\overset{\circ}{x})$, стоящий на пересечении i -й строки и k -го столбца якобиана $\frac{D(z)}{D(x)}$ и взятый в точке $\overset{\circ}{x} = (\overset{\circ}{x}_1, \dots, \overset{\circ}{x}_n)$, по правилу дифференцирования сложной функции равен

$$\frac{\partial z_i}{\partial x_k}(\overset{\circ}{x}) = \sum_{l=1}^n \frac{\partial z_i}{\partial y_l}(\overset{\circ}{y}) \cdot \frac{\partial y_l}{\partial x_k}(\overset{\circ}{x}), \quad (3.25)$$

где $\overset{\circ}{y} = \psi_2(\overset{\circ}{x})$.

Но по правилу перемножения определителей равенство (3.25) и означает, что якобиан $\frac{D(z)}{D(x)}$, взятый в точке $\overset{\circ}{x}$, равен произведению якобиана $\frac{D(y)}{D(x)}$, взятого в точке $\overset{\circ}{x}$, на якобиан $\frac{D(z)}{D(y)}$, взятый в точке $\overset{\circ}{y}$. Лемма 1 доказана.

Напомним, что линейным преобразованием координат называется преобразование вида

[illegible]

Легко видеть, что

$$\det T_{ij} = \begin{vmatrix} 1 & & & 0 \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \dots & 1 \\ 0 & & & & 1 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \\ & & & & & & & i \\ & & & & & & & & j \\ & & & & & & & & & 1 \end{vmatrix} = 1, \quad \det T_i^\lambda = \begin{vmatrix} 1 & & & 0 \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & \lambda \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 1 \\ 0 & & & & & & i \end{vmatrix} = \lambda,$$

поэтому преобразования T_{ij} и T_i^λ невырожденные.

Лемма 2. Для преобразований T_{ij} и T_i^λ при любой непрерывной в области D функции $f(y)$ справедлива формула замены переменных (3.28).

Доказательство леммы 2. Пусть R — n -мерный прямоугольный параллелепипед, содержащий D , функция $F(y)$ имеет вид

$$F(y) = \begin{cases} f(y) & \text{при } y \in D, \\ 0 & \text{при } y \in R \setminus D. \end{cases}$$

Достаточно доказать, что

$$\int_R F(y) dy = \int_{T^{-1}R} F(Tx) |\det T| dx, \quad (3.28')$$

где символом T обозначено одно из преобразований T_{ij} или T_i^λ .

Заметим, что если R — прямоугольный параллелепипед $\{y_k: a_k \leq y_k \leq b_k, k=1, 2, \dots, n\}$, то $[T_i^\lambda]^{-1}R$ — снова прямоугольный параллелепипед

$$\left\{ x_k: a_k \leq x_k \leq b_k, k \neq i, \frac{a_i}{\lambda} \leq x_i \leq \frac{b_i}{\lambda} \text{ при } \lambda > 0 \text{ и } \frac{b_i}{\lambda} \leq x_i \leq \frac{a_i}{\lambda} \text{ при } \lambda < 0 \right\},$$

а $[T_{ij}]^{-1}R$ — кублируемая область

$$\{x_k: a_k \leq x_k \leq b_k, k \neq i, a_i - x_j \leq x_i \leq b_i - x_j\}.$$

На основании формулы повторного интегрирования (3.18)

$$\begin{aligned} & \int_R F(y) dy = \\ &= \int_{a_1}^{b_1} \dots \int_{a_{i-1}}^{b_{i-1}} \int_{a_{i+1}}^{b_{i+1}} \dots \int_{a_n}^{b_n} \left[\int_{a_i}^{b_i} F(y_1, \dots, y_n) dy_i \right] dy_1 \dots dy_{i-1} dy_{i+1} \dots dy_n. \end{aligned} \quad (3.29)$$

Применяя к однократному интегралу по переменной i формулу замены переменной $y_i = \lambda x_i$ для случая преобразования T_i^λ и $y_i = x_i + x_j$ для случая преобразования T_{ij} (см § 5 гл. 9 ч. 1), получим

а) для случая преобразования T_i^λ

$$\int_{a_i}^{b_i} F(y_1, \dots, y_n) dy_i =$$

$$= \begin{cases} \frac{b_i}{\lambda} \int_{\frac{a_i}{\lambda}}^{\frac{b_i}{\lambda}} F(y_1, \dots, y_{i-1}, \lambda x_i, y_{i+1}, \dots, y_n) \lambda dx_i & \text{при } \lambda > 0; \\ \frac{a_i}{\lambda} \int_{\frac{b_i}{\lambda}}^{\frac{a_i}{\lambda}} F(y_1, \dots, y_{i-1}, \lambda x_i, y_{i+1}, \dots, y_n) (-\lambda) dx_i & \text{при } \lambda < 0; \end{cases} \quad (3.30)$$

б) для случая преобразования T_{ij}

$$\int_{a_i}^{b_i} F(y_1, \dots, y_n) dy_i = \int_{a_i - x_j}^{b_i - x_j} F(y_1, \dots, y_{i-1}, x_i + x_j, y_{i+1}, \dots, y_n) dx_i. \quad (3.30')$$

Подставим (3.30) или (3.30') в (3.29); затем, воспользовавшись формулой повторного интегрирования (3.18) и тем, что

$$|\det T| = \begin{cases} 1 & \text{для } T = T_{ij}; \\ |\lambda| & \text{для } T = T_i^\lambda, \end{cases}$$

а также полагая $y_k = x_k$ при $k=1, 2, \dots, i-1, i+1, \dots, n$, придем к равенству (3.28'). Лемма 2 доказана.

Лемма 3. *Всякое невырожденное линейное преобразование (3.26) представимо в виде суперпозиции конечного числа преобразований вида T_{ij} и T_i^λ при $\lambda \neq 0$.*

Доказательство леммы 3. Разобьем доказательство на три этапа.

1. Покажем, что линейное преобразование T' , заключающееся в перестановке местами i -й и j -й координат (при сохранении всех остальных координат), представимо в виде суперпозиции шести преобразований типа T_{ij} и T_i^λ .

В самом деле, сохраняя при записи $(x_1, \dots, x_n)$ только i -ю и j -ю координаты (остальные не меняются), можем записать:

$$\begin{aligned}
 (x_i, x_j) &\xrightarrow{T_{ij}} (x_i + x_j, x_j) \xrightarrow{T_i^{-1}} (-x_i - x_j, x_j) \xrightarrow{T_{ji}} \\
 &\rightarrow (-x_i - x_j, -x_i) \xrightarrow{T_j^{-1}} (-x_i - x_j, x_i) \xrightarrow{T_{ij}} (-x_j, x_i) \xrightarrow{T_i^{-1}} (x_j, x_i),
 \end{aligned}$$

т. е. $T' = T_i^{-1} T_{ij} T_j^{-1} T_{ji} T_i^{-1} T_{ij}$.

2) Отметим, что путем конечного числа перестановок местами двух строк или двух столбцов (т. е. путем конечного числа преобразований типа T') мы можем привести любое линейное невырожденное преобразование к линейному преобразованию с матрицей $\|a_{ij}\|$, у которой отличны от нуля все главные миноры, т. е. определители

$$\Delta_k = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1k} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{k1} & \dots & a_{kk} \end{vmatrix}, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

3) Остается доказать, что линейное преобразование с отличными от нуля главными минорами можно представить в виде конечного числа преобразований типа T_{ij} и T_i^λ . Докажем это по индукции.

Для $n=1$ рассмотрим преобразование T с матрицей

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ 1 & \dots \\ & \dots \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \Delta_1 = a_{11} \neq 0.$$

Преобразование $T_1^{a_{11}}$ переводит $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ в $(a_{11}x_1, x_2, \dots, x_n) = Tx$, т. е. $T = T_1^{a_{11}}$; утверждение справедливо.

Рассмотрим теперь преобразование T с матрицей

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1k} & & \\ \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \\ a_{k1} & \dots & a_{kk} & & \\ & & & 1 & \\ 0 & & & & \ddots \\ & & & & & 1 \end{pmatrix}.$$

Предположим, что это преобразование T можно представить в виде конечного числа преобразований типа T_{ij} и T_i^λ , т. е. что существует конечное число преобразований вида T_{ij} и T_i^λ , переводящие $x = (x_1, \dots, x_k, x_{k+1}, \dots, x_n)$ в

$$(a_{11}x_1 + \dots + a_{1k}x_k, \dots, a_{k1}x_1 + \dots + a_{kk}x_k, x_{k+1}, \dots, x_n) = Tx. \quad (3.31)$$

Для завершения индукции достаточно доказать, что путем суперпозиции конечного числа преобразований типа T_{ij} и T_i^λ

можно привести последовательность координат (3.31) к виду

$$(a_{11}x_1 + \dots + a_{1(k+1)}x_{k+1}, \dots, a_{k1}x_1 + \dots + a_{k(k+1)}x_{k+1}, \quad (3.32)$$

$$a_{(k+1)1}x_1 + \dots + a_{(k+1)(k+1)}x_{k+1}, x_{k+2}, \dots, x_n),$$

т. е. представить преобразование T с матрицей

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1k} & a_{1(k+1)} & & \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \\ a_{k1} & \dots & a_{kk} & a_{k(k+1)} & 0 & \\ a_{(k+1)1} & \dots & a_{(k+1)k} & a_{(k+1)(k+1)} & 1 & \\ & & 0 & & \ddots & \\ & & & & & 1 \end{pmatrix} \quad (3.33)$$

в виде суперпозиции конечного числа преобразований вида T_{ij} и T_i^λ .

Для доказательства этого, сначала для каждого номера $i=1, 2, \dots, k$, для которого элемент $a_{i(k+1)} \neq 0$, произведем преобразование, представимое суперпозицией трех преобразований:

$T_{k+1}^{a_{i(k+1)}} T_{i(k+1)} T_{k+1}^{a_{i(k+1)}}$ (для тех i , для которых $a_{i(k+1)} = 0$, этого преобразования не производим). Суперпозиция всех указанных троек преобразований для всех $i=1, 2, \dots, k$ переведет элемент (3.31) в

$$(a_{11}x_1 + \dots + a_{1k}x_k + a_{1(k+1)}x_{k+1}, \dots, a_{k1}x_1 + \dots + a_{kk}x_k + \quad (3.34)$$

$$+ a_{k(k+1)}x_{k+1}, x_{k+1}, x_{k+2}, \dots, x_n).$$

Далее заметим, что поскольку минор Δ_k матрицы (3.33) отличен от нуля, то отличен от нуля и равный ему определитель матрицы

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1k} & a_{1(k+1)} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{k1} & \dots & a_{kk} & a_{k(k+1)} \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (3.35)$$

По теореме о базисном миноре существуют числа $\lambda_1, \dots, \lambda_{k+1}$, линейная комбинация с которыми строк матрицы (3.35) равна:

$$a_{(k+1)1}, \dots, a_{(k+1)k}, a_{(k+1)(k+1)},$$

т. е. равна первым $k+1$ элементам $(k+1)$ -й строки матрицы (3.33). Это означает, что если мы для каждого $j=1, 2, \dots, k+1$, для которого $\lambda_j \neq 0$, произведем преобразование, представимое суперпозицией трех преобразований: $T_j^{1/\lambda_j} T_{(k+1)j} T_j^{\lambda_j}$ (для тех j , для которых $\lambda_j = 0$, соответствующую тройку преобразований:

не производим), то суперпозиция $T_{k+1}^{\lambda_{k+1}}$ ($|\lambda_{k+1}| \geq 0$) и всех произведенных троек преобразований переведет элемент (3.34) в (3.32). Индукция завершена. Лемма 3 доказана.

Лемма 4. Для любого невырожденного линейного преобразования (3.26) и любой непрерывной в области D функции f справедлива формула замены переменных (3.28).

В самом деле, формула (3.28) справедлива для каждого из преобразований вида T_{ij} и T_i^{λ} (лемма 2), но любое линейное невырожденное преобразование представимо в виде суперпозиции конечного числа таких преобразований (лемма 3), причем якобиан этой суперпозиции преобразований равен произведению якобианов (лемма 1).

Следствие из леммы 4. Если G — произвольная кубируемая область в E^n , T — произвольное невырожденное линейное преобразование, то n -мерный объем $V(G)$ области G и n -мерный объем $V(TG)$ ее образа TG связаны равенством

$$V(TG) = |\det T| V(G). \quad (3.36)$$

Для доказательства этого утверждения достаточно в формуле (3.28) взять $f(y) \equiv 1$ в области D , $D = TG$, $D' = T^{-1}D = G$.

Пусть теперь дано любое преобразование (3.21) ((3.21')) и выполнены условия теоремы 3.8. При этом оба интеграла в (3.23) существуют, если только $D' = \psi^{-1}(D)$ — кубируемая область, так что нам нужно доказать кубируемость D' и равенство интегралов в (3.23).

Пусть $\frac{\partial \psi_i}{\partial x_j}(x) = J_{ij}(x)$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$) — элементы матрицы Якоби, взятые в точке $x = (x_1, \dots, x_n)$, саму матрицу Якоби $\|J_{ij}(x)\|$ обозначим символом $J_{\psi} = J_{\psi}(x)$. Назовем нормой точки $x = (x_1, \dots, x_n)$ величину $\|x\| = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$. Назовем нормой матрицы $A = \|a_{ij}\|$ ($i, j = 1, \dots, n$) величину

$$\|A\| = \max_{1 \leq i \leq n} \left[\sum_{j=1}^n |a_{ij}| \right].$$

Ясно, что если $y = Ax$, то

$$\|y\| = \|Ax\| \leq \|A\| \cdot \|x\|. \quad (3.37)$$

Кроме того, для единичной матрицы $\|E\| = 1$.

Лемма 5. Если выполнены условия теоремы 3.8 и C — n -мерный координатный куб, принадлежащий области D' , то n -мерные объемы куба C и его образа $\psi(C)$ связаны неравенством

$$V(\psi(C)) \leq \left[\max_{x \in C} \|J_{\psi}(x)\| \right]^n V(C). \quad (3.38)$$

Доказательство леммы 5. Пусть C — n -мерный куб с центром в точке $x = (x_1, \dots, x_n)$ и с ребром $2s$. Тогда куб C можно определить неравенством

$$\|x - x^0\| \leq s. \quad (3.39)$$

В силу формулы Тейлора для функции n переменных $\psi_i(x)$ (см. п. 3 § 5 гл. 12 ч. 1) найдется число θ_i из интервала $(0, 1)$ такое, что

$$\psi_i(x) - \psi_i(x^0) = \sum_{j=1}^n J_{ij} [x^0 + \theta_i (x - x^0)] (x_j - x_j^0).$$

Отсюда и из соотношения (3.37) заключаем, что

$$\|\psi(x) - \psi(x^0)\| \leq \max_{x \in C} \|J_\psi(x)\| \cdot \|x - x^0\|. \quad (3.40)$$

Полагая $y = \psi(x)$, $y^0 = \psi(x^0)$, получим из (3.40) и (3.39):

$$\|y - y^0\| \leq s \max_{x \in C} \|J_\psi(x)\|.$$

Таким образом, если точка x находится в кубе C с ребром $2s$ и с центром в точке x^0 , то образ $y = \psi(x)$ точки x находится в кубе с центром в точке y^0 и с ребром $2s \max_{x \in C} \|J_\psi(x)\|$. Поэтому множество $\psi(C)$ кубируемо и

$$V(\psi(C)) \leq [\max_{x \in C} \|J_\psi(x)\|]^n V(C).$$

Лемма 5 доказана.

Следствие 1 из леммы 5. Если выполнены условия теоремы 3.8 и область G кубируема, то и ее образ $\psi(G)$ кубируем. В частности, если D кубируема, то и $D' = \psi^{-1}(D)$ кубируема.

Действительно, граница любого кубируемого множества G является множеством n -мерного объема нуль, а такое множество согласно доказанному утверждению преобразуется в множество, n -мерный объем которого также равен нулю.

Кубируемость области $D' = \psi^{-1}(D)$ следует из того, что в условиях теоремы 3.8 для преобразования ψ^{-1} выполнены те же условия, что и для ψ .

Следствие 2 из леммы 5. Если функция $f(y)$ интегрируема в области D , $D' = \psi^{-1}(D)$ и выполнены условия теоремы 3.8, то $f(\psi(x))$, а потому и $f[\psi(x)] |\det J_\psi(x)|$ интегрируемы в D' .

Лемма 6. Пусть выполнены все условия теоремы 3.8 и пусть G — произвольное кубируемое подмножество D' , а $\psi(G)$ — его образ при преобразовании (3.21). Тогда для n -мерного объема области $\psi(G)$ справедливо неравенство

$$V(\psi(G)) \leq \int_G |\det J_\psi(x)| dx. \quad (3.41)$$

Доказательство леммы 6. Разобьем доказательство на два этапа.

1) Докажем, что для любого невырожденного линейного преобразования T и для любого n -мерного куба $C \subset D'$ справедливо неравенство

$$V(\psi(C)) \leq |\det T| \left[\max_{x \in C} \|T^{-1}J_\psi(x)\| \right]^n V(C). \quad (3.42)$$

В силу следствия из леммы 4 для любого кубируемого множества G и для линейного преобразования T справедливо равенство (3.36). Положим $G = T^{-1}\psi(C)$, тогда $TG = T(T^{-1}\psi(C)) = \psi(G)$ и

$$V(\psi(C)) = |\det T| V(T^{-1}\psi(C)). \quad (3.43)$$

Оценив правую часть (3.43) с помощью неравенства (3.38), в котором вместо преобразования ψ возьмем суперпозицию преобразований $T^{-1}\psi$, получим

$$V(\psi(C)) \leq |\det T| \left[\max_{x \in C} \|J_{T^{-1}\psi}(x)\| \right]^n V(C). \quad (3.44)$$

По лемме 1 $J_{T^{-1}\psi} = J_{T^{-1}} J_\psi = T^{-1} J_\psi$, ибо матрица Якоби линейного преобразования совпадает с матрицей этого преобразования. Но это и означает, что неравенство (3.44) может быть переписано в виде (3.42). Неравенство (3.42) доказано.

2) Докажем теперь непосредственно неравенство (3.41). Покроем пространство E^n сеткой n -мерных кубов с ребром h . Пусть $C_1, C_2, \dots, C_{m(h)}$ — те кубы, которые целиком содержатся в G , и пусть $G_h = \bigcup_{1 \leq k \leq m(h)} C_k$.

В каждом кубе C_k фиксируем произвольную точку x_k и запишем для этого куба C_k неравенство (3.42), полагая при этом $T = J_\psi(x_k)$. Получим

$$V(\psi(C_k)) \leq |\det J_\psi(x_k)| \left\{ \max_{x \in C_k} \|[J_\psi(x_k)]^{-1} J_\psi(x)\| \right\}^n V(C_k). \quad (3.45)$$

Поскольку элементы матрицы Якоби $J_\psi(x)$ являются непрерывными функциями переменной x во всей области D' , а следовательно, и равномерно непрерывными в D' , то $\|J_\psi(x)\|$ — равномерно непрерывная функция в $G \subset D'$. Отсюда заключаем,

что функция $\| [J_\psi(x_k)]^{-1} J_\psi(x) \|^n$ также равномерно непрерывна в G . Учитывая, что $\| [J_\psi(x_k)]^{-1} J_\psi(x_k) \| = 1$, получаем, что для любого $\varepsilon > 0$ найдется $\delta > 0$ такое, что для всех $x, x_k \in G$, для которых $\rho(x, x_k) < \delta$, выполняется неравенство $\| [J_\psi(x_k)]^{-1} \times J_\psi(x) \|^n < 1 + \varepsilon$. Таким образом, если выбрать $h > \delta$, то $\max_{x \in C_k} \| [J_\psi(x_k)]^{-1} J_\psi(x) \|^n < 1 + \varepsilon$ (для всех k) и оценку (3.45) можно записать в виде

$$V(\psi(C_k)) \leq (1 + \varepsilon) |\det J_\psi(x_k)| V(C_k).$$

Суммируя последнее неравенство по всем $k=1, 2, \dots, m(h)$, получим

$$V(\psi(G_h)) \leq (1 + \varepsilon) \sum_{k=1}^{m(h)} |\det J_\psi(x_k)| V(C_k). \quad (3.46)$$

Из утверждения, сформулированного в конце § 4 этой главы, следует, что предел при $h \rightarrow 0$ всей правой части (3.46) существует и равен $(1 + \varepsilon) \int_G |\det J_\psi(x)| dx$ ($\varepsilon > 0$ — произвольное число). Кроме того, $\lim_{h \rightarrow 0} G_h = G$, так что в пределе при $h \rightarrow 0$ из неравенства (3.46) получается неравенство (3.41). Лемма 6 доказана.

Лемма 7. Если выполнены все условия теоремы 3.8 и дополнительно предполагается, что функция $f(y)$ неотрицательна в D , то справедлива формула замены переменных (3.23).

Доказательство леммы 7. Покроем пространство E^n сеткой n -мерных кубов с ребром h и обозначим через $C_1, C_2, \dots, C_{m(h)}$ те из этих кубов, которые целиком содержатся в D . Пусть $G_k = \psi^{-1}(C_k)$. Для каждой области G_k запишем неравенство (3.41):

$$V(C_k) \leq \int_{G_k} |\det J_\psi(x)| dx. \quad (3.47)$$

Умножим обе части (3.47) на m_k , где

$$m_k = \inf_{C_k} f(y) = \inf_{G_k} f[\psi(x)],$$

и просуммируем полученные неравенства по всем k от 1 до $m(h)$:

$$\sum_{k=1}^{m(h)} m_k V(C_k) \leq \sum_{k=1}^{m(h)} m_k \int_{G_k} |\det J_\psi(x)| dx. \quad (3.48)$$

По теореме о среднем значении

$$\int_{G_k} f[\psi(x)] |\det J_\psi(x)| dx = \mu_k \int_{G_k} |\det J_\psi(x)| dx,$$

где $\mu_k \in [m_k, M_k]$, $M_k = \sup_{G_k} f[\psi(x)]$. Поэтому

$$m_k \int_{G_k} |\det J_\psi(x)| dx \leq \mu_k \int_{G_k} |\det J_\psi(x)| dx = \int_{G_k} f[\psi(x)] |\det J_\psi(x)| dx$$

и неравенство (3.48) можно усилить:

$$\sum_{k=1}^{m(h)} m_k V(G_k) \leq \sum_{k=1}^{m(h)} \int_{G_k} f[\psi(x)] |\det J_\psi(x)| dx. \quad (3.49)$$

В силу утверждения, сформулированного в конце § 4, левая часть (3.49) при $h \rightarrow 0$ имеет предел, равный $\int_D f(y) dy$, и по-

скольку $\lim_{h \rightarrow 0} \sum_{k=1}^{m(h)} G_k = G$, где $G = \psi^{-1}(D)$, то в пределе при $h \rightarrow 0$ получается

$$\int_D f(y) dy \leq \int_{D'} f[\psi(x)] |\det J_\psi(x)| dx. \quad (3.50)$$

Меняя в этих рассуждениях ролями D и D' , рассматривая в D' функцию $g(x) = f[\psi(x)] |\det J_\psi(x)|$ и используя лемму 1 и теорему об определителе произведения двух матриц, получим противоположное неравенство

$$\int_{D'} f[\psi(x)] |\det J_\psi(x)| dx \leq \int_D f(y) dy. \quad (3.51)$$

Из (3.50) и (3.51) вытекает доказываемая формула замены переменных. Лемма 7 доказана.

Доказательство теоремы 3.8. Пусть $f(y)$ — произвольная интегрируемая по области D функция и выполнены все условия теоремы 3.8.

Из интегрируемости функции $f(y)$ в области D получаем, что существует постоянная $M > 0$ такая, что $|f(y)| \leq M$ в D .

Для каждой из неотрицательных функций $f_1(y) \equiv M$ и $f_2(y) = M - f(y)$ теорема 3.8 справедлива (в силу леммы 7). Но тогда из линейного свойства интеграла вытекает справедливость формулы (3.23) и для разности $f_1(y) - f_2(y) = f(y)$. Теорема 3.8 доказана.

З а м е ч а н и е 1. В условиях теоремы 3.8 можно допустить обращение в нуль якобиана (3.22) на некотором принадлежащем D' множестве точек S , имеющем n -мерный объем нуль. В самом деле, множество S лежит внутри элементарной фигуры C как угодно малого объема, причем согласно доказанному выше справедлива формула

$$\int_{\psi(D' \setminus C)} f(y) dy = \int_{D \setminus C} f[\psi(x)] |\det J_\psi(x)| dx. \quad (3.52)$$

Осуществляя в формуле (3.52) предельный переход по последовательности элементарных фигур $\{C_k\}$, $S \subset C_k$, n -мерный объем $V(C_k)$ которых стремится к нулю, убедимся в справедливости формулы (3.23) и для рассматриваемого случая.

З а м е ч а н и е 2. Имеет место следующее утверждение, являющееся частным случаем так называемой теоремы Сарда³⁾.

У т в е р ж д е н и е. Пусть G — замкнутая ограниченная кубируемая область в E^n , а функции (3.21) имеют в G непрерывные частные производные первого порядка по всем переменным. Пусть $A = \{x \in G : \det J_\psi(x) = 0\}$. Тогда n -мерный объем множества A равен нулю.

Это утверждение и замечание 1 позволяют освободиться в теореме 3.8 от требования необращения якобиана (3.22) в нуль в области D' .

З а м е ч а н и е 3. Как показывает рассматриваемый ниже пример, требование взаимной однозначности преобразования ψ существенно даже в случае связной области и условия $\det J_\psi(x) \neq 0$ для всех $x \in E^n$.

П р и м е р. Пусть $D' = \{(x_1, x_2) \in E^2 : x_1 \in [0, 1]; x_2 \in [-2\pi, 2\pi]\}$, а $y = \psi(x)$ определено равенствами

$$y_1 = e^{x_1} \cos x_2, \quad y_2 = e^{x_1} \sin x_2.$$

Тогда $D = \psi(D') = \{(y_1, y_2) \in E^2 : 1 \leq (y_1^2 + y_2^2)^{1/2} \leq e\}$. Легко подсчитать, что якобиан преобразования $\det J_\psi(x) = e^{2x_1}$ не равен нулю для всех $x \in E^2$. Сравним между собой интегралы в формуле (3.23') для $f(y) \equiv 1$:

$$\begin{aligned} \iint_D dy_1 dy_2 &= \pi(e^2 - 1); \quad \iint_{D'} |\det J_\psi(x_1, x_2)| dx_1 dx_2 = \\ &= \int_{-2\pi}^{2\pi} dx_2 \int_0^1 e^{2x_1} dx_1 = 2\pi(e^2 - 1). \end{aligned}$$

Таким образом, формула замены переменных не имеет места.

³⁾ Артур Сард — американский математик (род. в 1909 г.)

Замечание 4. В условиях теоремы 3.8 можно допустить неоднозначность преобразования ψ на некотором принадлежащем D' множестве S , имеющем n -мерный объем нуль.

Доказательство этого факта полностью аналогично доказательству утверждения в замечании 1.

§ 6. ВЫЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ n -МЕРНЫХ ТЕЛ

В § 4 этой главы было отмечено, что интеграл

$$I = \iiint_D \dots \int 1 \, dy_1 dy_2 \dots dy_n \quad (3.53)$$

равен n -мерному объему $V(D)$ области D . Поэтому величину $dy_1 dy_2 \dots dy_n$ естественно назвать элементом объема в рассматриваемой декартовой системе координат $Oy_1 y_2, \dots, y_n$.

С помощью преобразования (3.21) перейдем от декартовых координат $y_1, y_2, \dots, y_n$ к новым, вообще говоря, криволинейным координатам $x_1, x_2, \dots, x_n$. Поскольку при таком переходе (согласно формуле замены переменных (3.23)) интеграл (3.53) преобразуется к виду

$$I = \iiint_{D'} \dots \int \left| \frac{D(y_1, y_2, \dots, y_n)}{D(x_1, x_2, \dots, x_n)} \right| dx_1 dx_2 \dots dx_n,$$

то величину

$$\left| \frac{D(y_1, y_2, \dots, y_n)}{D(x_1, x_2, \dots, x_n)} \right| = dx_1 dx_2 \dots dx_n$$

естественно назвать элементом объема в криволинейной системе координат $Ox_1 x_2 \dots x_n$.

Итак, модуль якобиана характеризует «растяжение» (или «сжатие») объема при переходе от декартовых координат $y_1, y_2, \dots, y_n$ к криволинейным координатам $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Подсчитаем элементы объема в сферических и цилиндрических координатах.

1°. Для сферических координат в пространстве E^3

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \sin \theta, \\ y = r \sin \varphi \sin \theta, \\ z = r \cos \theta \end{cases} \quad (r \geq 0, \theta \in [0, \pi], \varphi \in [0, 2\pi))$$

якобиан имеет вид

$$\frac{D(x, y, z)}{D(r, \varphi, \theta)} = \begin{vmatrix} \cos \varphi \sin \theta & -r \sin \varphi \sin \theta & r \cos \varphi \cos \theta \\ \sin \varphi \sin \theta & r \cos \varphi \sin \theta & r \sin \varphi \cos \theta \\ \cos \theta & 0 & -r \sin \theta \end{vmatrix} = r^2 \sin \theta.$$

Следовательно, элемент объема равен $r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$.

2°. Для цилиндрических координат в пространстве E^3

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi, \\ y = r \sin \varphi, \quad (r \geq 0, \varphi \in [0, 2\pi), z \in (-\infty, +\infty)) \\ z = z \end{cases}$$

якобиан имеет вид

$$\frac{D(x, y, z)}{D(r, \varphi, z)} = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -r \sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & r \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = r.$$

Следовательно, элемент объема равен $rdrd\varphi dz$. В частности, для полярных координат на плоскости элемент площади равен $rdrd\varphi$.

3°. В пространстве E^n сферические координаты определяются равенствами

$$\begin{cases} x_1 = r \sin \theta_1 \sin \theta_2 \dots \sin \theta_{n-1}; \\ x_m = r \cos \theta_{m-1} \prod_{k=m}^{n-1} \sin \theta_k, \quad m = 2, 3, \dots, n-1; \\ x_n = r \cos \theta_{n-1}, \quad (r \geq 0, \theta_1 \in [0, 2\pi), \theta_m \in [0, \pi], m = 2, 3, \dots, n-1), \end{cases}$$

якобиан имеет вид

$$\frac{D(x_1, x_2, \dots, x_n)}{D(r, \theta_1, \dots, \theta_{n-1})} = r^{n-1} \prod_{k=1}^{n-1} \sin^{k-1} \theta_k.$$

Таким образом, элемент объема в n -мерных сферических координатах равен $r^{n-1} dr \prod_{k=1}^{n-1} \sin^{k-1} \theta_k d\theta_k$.

Примеры. 1°. Вычислить объем V тела, вырезанного цилиндром $x^2 + y^2 = Rx$ из сферы $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ (рис. 3.6) ⁴⁾.

Тело симметрично относительно координатных плоскостей Oxy и Oxz и расположено направо от плоскости Oyz . Поэтому достаточно вычислить объем четверти тела, лежащей в первом октанте, т. е.

$$V = 4 \iiint_D dx dy dz,$$

$$D = \{(x, y, z) \in E^3 : x \in [0, R], y \in [0, \sqrt{Rx - x^2}],$$

⁴⁾ Эта фигура называется «телом Вивини» по имени итальянского математика XVII в.

$$z \in [0, \sqrt{R^2 - (x^2 + y^2)}].$$

Перейдем к цилиндрическим координатам. Область D' определяется так:

$$D' = \left\{ (\varphi, r, z) \in E^3 : \varphi \in \left[0, \frac{\pi}{2} \right], r \in [0, R \cos \varphi], z \in [0, \sqrt{R^2 - r^2}] \right\}.$$




Рис. 3.6




Рис. 3.7

Формула замены переменных дает

$$\begin{aligned} V &= 4 \iiint_{D'} r dr d\varphi dz = 4 \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^{R \cos \varphi} r dr \int_0^{\sqrt{R^2 - r^2}} 1 dz = \\ &= 4 \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^{R \cos \varphi} r \sqrt{R^2 - r^2} dr = \frac{4}{3} \int_0^{\pi/2} R^3 (1 - \sin^3 \varphi) d\varphi = \\ &= \frac{4}{3} R^3 \left(\frac{\pi}{2} - \frac{2}{3} \right). \end{aligned}$$

Таким образом,

$$V = \frac{4}{3} R^3 \left(\frac{\pi}{2} - \frac{2}{3} \right).$$

Записав результат в виде $V = (2/3)\pi R^3 - (8/9)R^3$, отметим, что вычисляемый объем на $(8/9)R^3$ меньше объема полушара радиуса R , из которого оно вырезано.

2°. Вычислить интеграл

$$I = \iiint_D \frac{xyz_i}{x^2 + y^2} dx dy dz,$$

где D — тело, ограниченное сверху поверхностью

$$(x^2 + y^2 + z^2)^2 = a^2 xy, \quad (3.54)$$

а снизу плоскостью $z=0$.

В сферических координатах уравнение поверхности (3.54) примет вид

$$r^2 = a^2 \sin^2 \theta \sin \varphi \cos \varphi.$$

Так как $z \geq 0$ для точек поверхности D , то, учитывая симметрию тела относительно оси Oz , после замены переменных получим

$$\begin{aligned} I &= 2 \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^{a \sin \theta \sqrt{\sin \varphi \cos \varphi}} r^3 \sin \varphi \cos \varphi \sin \theta \cos \theta dr = \\ &= \frac{a^4}{2} \int_0^{\pi/2} \sin^3 \varphi \cos^3 \varphi d\varphi \int_0^{\pi/2} \sin^5 \theta \cos \theta d\theta = \frac{a^4}{144}. \end{aligned}$$

3°. Вычислить интеграл

$$I = \iiint_D \dots \int \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2} dx_1 dx_2 \dots dx_n,$$

где D — n -мерный шар радиуса R с центром в начале координат:

$$D = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in E^n : \sum_{k=1}^n x_k^2 \leq R^2\}, \quad n \geq 2.$$

Перейдем к сферическим координатам в E^n :

$$D' = \{(r, \theta_1, \dots, \theta_{n-1}) \in E^n : r \in [0, R],$$

$$\theta_1 \in [0, 2\pi], \theta_k \in [0, \pi], k = 2, 3, \dots, n-1\},$$

т. е. область D' — параллелепипед.

Формулы замены переменных (3.23) и повторного интегрирования (3.18) приводят к интегралу

$$I = \int_0^R r^n dr \int_0^{2\pi} d\theta_1 \int_0^\pi \sin \theta_2 d\theta_2 \dots \int_0^\pi \sin^{n-2} \theta_{n-1} d\theta_{n-1}.$$

Воспользовавшись формулой, выражающей интегралы от степеней синуса (см. п. 4 § 5 гл. 9 ч. 1 или сноску на с. 138 этой книги), получим

$$I = 2^n \frac{R^{n+1}}{n+1} A(n),$$

$$\text{где } A(n) = \begin{cases} \frac{2^{\frac{n-1}{2}}}{(n-2)!!} \pi^{\frac{n-1}{2}}, & \text{если } n \text{ нечетное;} \\ \frac{2^{\frac{n-2}{2}}}{(n-2)!!} \pi^{\frac{n}{2}}, & \text{если } n \text{ четное.} \end{cases}$$

4°. Вычислить интеграл Пуассона

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx.$$

Рассмотрим на плоскости две области

$$C_R = \{(x, y) \in E^2 : x^2 + y^2 \leq R^2, x \geq 0, y \geq 0\},$$

$$K_R = \{(x, y) \in E^2 : 0 \leq x \leq R, 0 \leq y \leq R\}$$

и неотрицательную функцию двух переменных $e^{-(x^2+y^2)}$. На рис. 3.7 изображены области C_R, C_{2R} — четверти кругов радиусов R и $2R$ в первом квадранте, и область K_R — заштрихованный квадрат.

Поскольку $C_R \subset K_R \subset C_{2R}$, то

$$\iint_{C_R} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \leq \iint_{K_R} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \leq \iint_{C_{2R}} e^{-(x^2+y^2)} dx dy. \quad (3.55)$$

Для среднего интеграла (3.55) получим

$$\iint_{K_R} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \int_0^R e^{-x^2} dx \int_0^R e^{-y^2} dy = \left(\int_0^R e^{-x^2} dx \right)^2.$$

Чтобы подсчитать оставшиеся два интеграла, сделаем замену переменных, переходя к полярным координатам. Область, которая при этом преобразовании переходит в C_R , имеет вид

$$C'_R = \{(r, \varphi) \in E^2 : r \in [0, R], \varphi \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]\}.$$

Применяя формулу замены переменных, получим

$$\iint_{C_R} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \iint_{D_R} e^{-r^2} r dr d\varphi = \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^R e^{-r^2} r dr = \frac{\pi}{4} (1 - e^{-R^2});$$

$$\iint_{C_{2R}} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \frac{\pi}{4} (1 - e^{-4R^2}).$$

Подставим полученные выражения в (3.55):

$$\frac{\sqrt{\pi}}{2} \sqrt{1 - e^{-R^2}} \leq \int_0^R e^{-x^2} dx \leq \frac{\sqrt{\pi}}{2} \sqrt{1 - e^{-4R^2}}. \quad (3.56)$$

Перейдем к пределу в (3.56) при $R \rightarrow \infty$:

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

Этот элегантный прием вычисления принадлежит Пуассону.

§ 7. ТЕОРЕМА О ПОЧЛЕННОМ ИНТЕГРИРОВАНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ И РЯДОВ

В § 4 гл. 2 была доказана теорема 2.8 о почленном интегрировании функциональной последовательности $\{f_n(x)\}$ на сегменте $[a, b]$ числовой прямой. Аналогичная теорема имеет место и для случая, когда функциональная последовательность определена и интегрируема в некоторой области пространства E^m ($m \geq 2$).

Теорема 3.9. Пусть D — некоторая ограниченная замкнутая кубируемая область в E^m . Если функциональная последовательность $\{f_n(x)\}$ сходится к предельной функции $f(x)$ равномерно в D и если каждая функция $f_n(x)$ интегрируема в области D , то и предельная функция интегрируема в этой области, причем указанную последовательность можно интегрировать в области D почленно, т. е.

$$\int_D f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n(x) dx.$$

Доказательство. Фиксируем произвольное $\varepsilon > 0$. Как и при доказательстве теоремы 2.8, для доказательства интегрируемости f в области D достаточно доказать, что найдется номер n такой, что для любого разбиения области D верхняя сумма S и нижняя сумма s предельной функции $f(x)$ и верхняя сумма S_n и нижняя сумма s_n интегрируемой в D функции $f_n(x)$ связаны неравенством

$$S - s \leq (S_n - s_n) + \varepsilon/2. \quad (3.57)$$

Рассмотрим произвольное разбиение области D при помощи конечного числа произвольных многообразий m -мерного объема нуль на конечное число частичных областей D_i ($i=1, 2, \dots, r$) произвольной формы, не имеющих общих внутренних точек. Обозначим символом $\omega_i(f_n)$ колебание функции $f_n(x)$ в области

$D_i(\omega_i(f_n) = \sup_{D_i} f_n(x) - \inf_{D_i} f_n(x))$, а символом $\omega_i(f)$ колебание в D_i предельной функции $f(x)$.

Докажем, что для любого достаточно большого номера n справедливы неравенства

$$\omega_i(f) \leq \omega_i(f_n) + \varepsilon / (2\Delta D), \quad i=1, 2, \dots, r, \quad (3.58)$$

где ΔD — n -мерный объем области D . Умножая затем (3.58) на объем ΔD_i частичной области D_i и суммируя получающиеся при этом неравенства по всем i , получим неравенство (3.57).

Для любого номера n и любых двух точек x' и x'' области D справедливо тождество

$$f(x') - f(x'') = [f(x') - f_n(x')] + [f_n(x') - f_n(x'')] + [f_n(x'') - f(x'')]. \quad (3.59)$$

В силу равномерной на D сходимости последовательности $\{f_n(x)\}$ к функции $f(x)$, для фиксированного нами произвольного $\varepsilon > 0$ найдется номер n такой, что для всех точек x области D

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon / (4\Delta D). \quad (3.60)$$

Применяя к правой части (3.59) неравенство (3.60), взятое для точек $x = x'$ и $x = x''$, получим

$$|f(x') - f(x'')| \leq |f_n(x') - f_n(x'')| + \varepsilon / (2\Delta D). \quad (3.61)$$

Из неравенства (3.61) получаем

$$|f(x') - f(x'')| \leq \omega_i(f_n) + \varepsilon / (2\Delta D),$$

откуда, как и в случае теоремы 2.8, следует доказываемое неравенство (3.58). Таким образом, доказательство интегрируемости предельной функции $f(x)$ в области D завершено.

Утверждение о возможности почленного интегрирования последовательности $\{f_n(x)\}$ следует из оценки (3.60), справедливой для всех точек $x \in D$, и из отмеченного в § 4 факта: значение интеграла $\int_D 1 dx$ равно n -мерному объему ΔD области D . Теорема 3.9 доказана.

Приведем формулировку теоремы 3.9 в терминах функциональных рядов:

Теорема 3.9*. Если функциональный ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) \quad (x = (x_1, x_2, \dots, x_m) \in E^m)$$

сходится к своей сумме $S(x)$ равномерно на некоторой ограниченной замкнутой кубируемой области $D \subset E^m$ и если каждый член

этого ряда $u_k(x)$ представляет собой функцию, интегрируемую в области D , то и сумма $S(x)$ интегрируема в области D , причем указанный ряд можно интегрировать на множестве D почленно, т. е.

$$\int_D S(x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_D u_k(x) dx. \quad (3.62)$$

§ 8. КРАТНЫЕ НЕСОБСТВЕННЫЕ ИНТЕГРАЛЫ

Этот параграф посвящен обобщению понятия кратного интеграла на случаи неограниченной области интегрирования и неограниченной подынтегральной функции. Мы сформулируем понятие несобственного кратного интеграла так, что будут охвачены оба указанных случая.

1. Понятие кратных несобственных интегралов. Пусть D — открытое связное множество пространства E^n . Символом $\bar{D}$ обозначим замыкание D , которое получается путем присоединения к D его границы.

Определение 1. Будем говорить, что последовательность $\{D_n\}$ открытых связных множеств монотонно исчерпывает множество D , если: 1) для любого номера n $\bar{D}_n \subset D_{n+1}$; 2) объединение всех множеств D_n совпадает с D .

Пусть на множестве D задана функция $f(x)$, $x = (x_1, x_2, \dots, x_m)$, интегрируемая по Риману на любом замкнутом кубируемом подмножестве D . Будем рассматривать всевозможные последовательности $\{D_n\}$ открытых множеств, монотонно исчерпывающие D и такие, что замыкание $\bar{D}_n$ каждого множества D_n кубируемо (отсюда, в частности, вытекает, что каждое множество D_n ограничено).

Определение 2. Если для любой такой последовательности $\{D_n\}$ существует предел числовой последовательности

$$a_n = \int_{\bar{D}_n} f(x) dx \quad (3.63)$$

и этот предел не зависит от выбора последовательности $\{D_n\}$, то этот предел называется несобственным интегралом от функции $f(x)$ по множеству D и обозначается одним из следующих символов:

$$\int_D f(x) dx \text{ или } \int_D \dots \int f(x_1, x_2, \dots, x_m) dx_1 dx_2 \dots dx_m. \quad (3.64)$$

При этом несобственный интеграл (3.64) называется сходящимся.

Отметим, что символ (3.64) используется и в случае, когда предела указанных выше последовательностей не существует. В этом случае интеграл (3.64) называется расходящимся.

2. Два признака сходимости несобственных интегралов от неотрицательных функций.

Теорема 3.10. Для сходимости несобственного интеграла (3.64) от неотрицательной в области D функции $f(x)$ необходимо и достаточно, чтобы хотя бы для одной последовательности кубируемых областей $\{D_n\}$, монотонно исчерпывающей D , была ограниченной числовая последовательность (3.63).

Доказательство. Необходимость. Сходимость несобственного интеграла (3.64) по определению 2 означает, что последовательность $\{a_n\}$, определяемая равенством (3.63), сходится для всех последовательностей областей $\{D_n\}$, монотонно исчерпывающих D , а, следовательно, последовательность $\{a_n\}$ ограничена для каждой такой последовательности $\{D_n\}$.

Достаточность. Последовательность (3.63) ограничена и не убывает, так как $\bar{D}_n \subset \bar{D}_{n+1}$ и $f(x) \geq 0$, следовательно, она сходится к некоторому числу I . Остается доказать, что если мы выберем любую другую последовательность кубируемых областей $\{\bar{D}'_n\}$, монотонно исчерпывающую область D , то последовательность

$$a'_n = \int_{\bar{D}'_n} f(x) dx$$

сходится к тому же числу I . Фиксируем любой номер n_0 и рассмотрим область $\bar{D}'_{n_0}$. Найдется номер n_1 такой, что $\bar{D}'_{n_0} \subset \bar{D}_{n_1}$. Действительно, допустим, что это не так. Тогда для любого номера k можно указать такую точку $M_k \in \bar{D}'_{n_0}$, которая не принадлежит области $\bar{D}_k$. Из последовательности $\{M_k\}$ можно (в силу замкнутости и ограниченности $\bar{D}'_{n_0}$) выделить сходящуюся к некоторой точке $M \in \bar{D}'_{n_0}$ последовательности. Точка M вместе с некоторой окрестностью принадлежит одному из множеств $\bar{D}_{k_1}$. Но тогда этому же множеству $\bar{D}_{k_1}$ (и всем множествам $\bar{D}_k$ с большими номерами) принадлежат точки M_k с как угодно большими номерами. А это противоречит выбору точек M_k .

Итак, существует номер n_1 такой, что $\bar{D}'_{n_0} \subset \bar{D}_{n_1}$. Поэтому

$$a'_{n_0} \leq a_{n_1} \leq I.$$

Отсюда следует, что последовательность $\{a'_n\}$ сходится к некоторому числу $I' \leq I$. Меняя местами в наших рассуждениях последовательности $\{a'_n\}$ и $\{a_n\}$, придем к неравенству $I \leq I'$. Следовательно, $I' = I$. Теорема доказана.

В § 6 можно найти пример вычисления несобственного интеграла

$$I = \iint_D e^{-x^2-y^2} dx dy = \lim_{n \rightarrow \infty} \iint_{C_n} e^{-x^2-y^2} dx dy = \frac{\pi}{4},$$

где $D = \{(x, y) \in E^2, x \geq 0, y \geq 0\}$, $C_n = \{(x, y) \in E^2, x^2 + y^2 \leq n^2, x \geq 0, y \geq 0\}$; $n = 1, 2, \dots$ (см. пример 4° § 6, в котором следует заменить R на n).

Теорема 3.11 (общий признак сравнения). Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ всюду на открытом множестве D удовлетворяют условию $0 \leq f(x) \leq g(x)$. Тогда из сходимости несобственного интеграла $\int_D g(x) dx$ вытекает сходимость несобственного интеграла $\int_D f(x) dx$, а из расходимости $\int_D f(x) dx$ вытекает расходимость $\int_D g(x) dx$.

Доказательство. Пусть $\{D_n\}$ — последовательность кубиремых областей, монотонно исчерпывающих область D . Из очевидных неравенств

$$a_n = \int_{D_n} f(x) dx \leq \int_{D_n} g(x) dx = b_n$$

следует, что ограниченность $\{b_n\}$ влечет ограниченность $\{a_n\}$ и неограниченность $\{a_n\}$ влечет неограниченность $\{b_n\}$ (для любой последовательности областей $\{D_n\}$). Отсюда и из теоремы 3.10 вытекает справедливость сформулированной теоремы.

Обычно при исследовании несобственных интегралов на сходимость используют стандартные (эталонные) функции сравнения, наиболее употребительной из которых является функция $g(x) = |x|^{-p}$, $p > 0$, $|x| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_m^2}$. Легко проверить, что если область D — шар радиуса R ($R > 0$) с центром в начале координат, то несобственный интеграл от функции $|x|^{-p}$ по области D сходится при $p < m$ и расходится при $p \geq m$. Если же D — внешность того же шара, то несобственный интеграл от функции $|x|^{-p}$ по области D сходится при $p > m$ и расходится при $p \leq m$.

3. Несобственные интегралы от знакопеременных функций. В этом пункте мы выясним связь между сходимостью и абсолютной сходимостью кратных несобственных интегралов. При этом, как и в одномерном случае, несобственный интеграл $\int_D f(x) dx$ будем называть абсолютно сходящимся, если сходится интеграл $\int_D |f(x)| dx$. Кратные несобственные интегралы в отличие от одномерного случая обладают тем свойством, что из обыч-

ной сходимости несобственного кратного интеграла вытекает его абсолютная сходимость.

Теорема 3.12. *Для несобственных m -кратных интегралов при $m \geq 2$ понятия сходимости и абсолютной сходимости эквивалентны.*

Доказательство. 1) Докажем, что из абсолютной сходимости кратного несобственного интеграла в области D следует его обычная сходимость в этой области. Рассмотрим две неотрицательные функции

$$f_+(x) = \frac{|f(x)| + f(x)}{2}, \quad f_-(x) = \frac{|f(x)| - f(x)}{2}. \quad (3.65)$$

Представим их в виде

$$\begin{aligned} f_+(x) &= \begin{cases} f(x), & \text{если } f(x) \geq 0; \\ 0, & \text{если } f(x) < 0; \end{cases} \\ f_-(x) &= \begin{cases} -f(x), & \text{если } f(x) \leq 0; \\ 0, & \text{если } f(x) > 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (3.66)$$

и отметим следующие соотношения, непосредственно вытекающие из определения этих функций:

$$0 \leq f_+(x) \leq |f(x)|; \quad 0 \leq f_-(x) \leq |f(x)|; \quad (3.67)$$

$$f(x) = f_+(x) - f_-(x); \quad |f(x)| = f_+(x) + f_-(x). \quad (3.68)$$

Из интегрируемости в собственном смысле функции $f(x)$ по любой кубируемой подобласти области D вытекает интегрируемость по любой такой подобласти функции $|f(x)|$, а следовательно, и функций $f_+(x)$ и $f_-(x)$ (что следует из формул (3.65)). Используя сходимость интеграла $\int_D |f(x)| dx$, только

что указанное свойство функций $f_+(x)$, $f_-(x)$, неравенства (3.67) и теорему 3.11, убеждаемся в сходимости несобственных интегралов $\int_D f_+(x) dx$ и $\int_D f_-(x) dx$. Из определения несобственного интеграла следует, что если сходится несобственный интеграл по области D от каждой из функций $f_+(x)$ и $f_-(x)$, то сходятся интегралы от суммы и разности этих функций. Из первого соотношения (3.68) следует сходимость интеграла $\int_D f(x) dx$. Первая часть теоремы доказана.

2) Пусть кратный несобственный интеграл $\int_D f(x) dx$ сходится. Докажем, что он сходится абсолютно. Допустим, что это утверждение неверно. Тогда из теоремы 3.10 вытекает, что пос-

последовательность интегралов от функции $|f(x)|$ по любой монотонно исчерпывающей области D последовательности кубиремых областей $\{D_n\}$ будет монотонно возрастающей бесконечно большой последовательностью. В частности, последовательность $\{D_n\}$ можно выбрать так, что для любого $n=1, 2, \dots$ выполняется неравенство

$$\int_{\bar{D}_{n+1}} |f(x)| dx > 3 \int_{\bar{D}_n} |f(x)| dx + 2n + 4 \quad (3.69)$$

(достаточно взять любую последовательность $\{D_n\}$ и «проредить» ее, отбросив те области, для которых неравенство (3.69) не выполняется). Обозначим через P_n множество $D_{n+1} \setminus D_n$. Тогда из (3.69) получим, что для любого n

$$\int_{P_n} |f(x)| dx > 2 \int_{\bar{D}_n} |f(x)| dx + 2n + 4. \quad (3.70)$$

Из второго соотношения (3.68) следует, что

$$\int_{P_n} |f(x)| dx = \int_{P_n} f_+(x) dx + \int_{P_n} f_-(x) dx. \quad (3.71)$$

Фиксируем произвольный номер n . Пусть для этого n из двух интегралов в правой части (3.71) большим будет первый. Тогда из соотношений (3.70) и (3.71) получим

$$\int_{P_n} f_+(x) dx > \int_{\bar{D}_n} |f(x)| dx + n + 2. \quad (3.72)$$

Разобьем область P_n на конечное число областей P_n^i так, чтобы нижняя сумма $\sum_i m_i \Delta \sigma_i$ функции $f_+(x)$ для этого разбиения удовлетворяла неравенству ⁵⁾

$$0 \leq \int_{P_n} f_+(x) dx - \sum_i m_i \Delta \sigma_i < 1.$$

Тогда, заменив в левой части (3.72) интеграл нижней суммой, получим следующее неравенство:

$$\sum_i m_i \Delta \sigma_i > \int_{\bar{D}_n} |f(x)| dx + n + 1. \quad (3.73)$$

⁵⁾ Здесь $m_i = \inf_{P_n^i} f_+(x)$, $\Delta \sigma_i$ — m -мерный объем P_n^i .

Так как $m_i \geq 0$, то оставим в сумме $\sum_i m_i \Delta \sigma_i$ лишь те слагаемые, для которых $m_i > 0$. Объединение областей P_n^i , соответствующих оставшимся в сумме слагаемым, обозначим через $\bar{P}_n$.

В области $\bar{P}_n$ функция $f_+(x)$ положительна, поэтому в этой области $f_+(x) = f(x)$ (см. (3.66)). Следовательно, согласно (3.73) получаем неравенство

$$\int_{\bar{P}_n} f(x) dx > \int_{\bar{D}_n} |f(x)| dx + n + 1. \quad (3.74)$$

Обозначим через D_n^* объединение D_n и $\bar{P}_n$. Тогда, складывая неравенство (3.74) с неравенством

$$\int_{\bar{D}_n} f(x) dx \geq - \int_{\bar{D}_n} |f(x)| dx,$$

заведомо справедливым для фиксированного нами n , получим

$$\int_{D_n^*} f(x) dx > n + 1. \quad (3.75)$$

Если для фиксированного нами номера n из двух интегралов в правой части (3.71) большим (или равным первому) будет второй, то, проделав аналогичные преобразования, учитывая, что в области $\bar{P}_n$ $f_-(x) = -f(x)$, получим неравенство

$$\int_{\bar{D}_n^*} f(x) dx < -n - 1. \quad (3.76)$$

Из соотношений (3.75) и (3.76) следует, что для любого $n = 1, 2, \dots$

$$\left| \int_{D_n^*} f(x) dx \right| > n + 1. \quad (3.77)$$

Последовательность областей $\{D_{2n}^*\}$ удовлетворяет всем условиям определения 1, кроме, быть может, условия связности областей D_{2n}^* (связность областей D_n^* могла быть нарушена при отбрасывании из P_n тех областей P_n^i , на которых точная нижняя грань m_i равна нулю). Малой деформацией сделаем эти области связными ⁶⁾.

Соединим каждую область P_n^i из $\bar{P}_n$ с областью D_n m -мерной кубиреимой связной областью K_n^i (которую будем называть

⁶⁾ Именно этот момент доказательства существенно использует требование $m \geq 2$ (при $m = 1$ описываемые рассуждения не проходят).

связкой или каналом) так, чтобы полученное множество стало связным. Поскольку число областей P_n^i в $\bar{P}_n$ конечно, то и число каналов конечно. Обозначим объединение всех каналов через K_n . Наложим ограничение на m -мерный объем $V(K_n)$ каналов.

Так как функция $f(x)$ интегрируема, а следовательно, и ограничена на P_n , то

$$\left| \int_{\bar{K}_n} f(x) dx \right| \leq \int_{\bar{K}_n} |f(x)| dx \leq M \cdot V(K_n),$$

где $M = \sup_{\bar{P}_n} |f(x)|$. Потребуем, чтобы m -мерный объем каналов $V(K_n)$ удовлетворял условию $V(K_n) < 1/M$. Тогда

$$\left| \int_{\bar{K}_n} f(x) dx \right| < 1. \quad (3.78)$$

Из неравенства (3.77) и (3.78) получаем для любого n неравенство

$$\left| \int_{D_n^* \cup K_n} f(x) dx \right| > n. \quad (3.79)$$

Последовательность связанных кубируемых областей $\{D_{2n}^* \cup K_{2n}\}$ монотонно исчерпывает область D^7 . Из неравенства (3.79) следует, что последовательность интегралов в левой части этого неравенства расходится, т. е. несобственный интеграл $\int_D f(x) dx$ расходится. Но по условию теоремы этот интеграл сходится. Полученное противоречие доказывает справедливость нашего утверждения. Теорема полностью доказана.

4. Главное значение кратных несобственных интегралов. Обозначим через $B(R, x_0)$ m -мерный шар радиуса R с центром в точке x_0 , и пусть начало координат находится в точке $0 \in E^m$.

Определение. Пусть функция $f(x)$ определена при всех $x \in E^m$ и интегрируема в каждом шаре $B(R, 0)$. Будем говорить, что функция $f(x)$ интегрируема по Коши в E^m , если существует предел

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{B(R, 0)} f(x) dx.$$

Этот предел мы будем называть главным значением несоб-

⁷⁾ Мы берем $\{D_{2n}^* \cup K_{2n}\}$ вместо $\{D_n^* \cup K_n\}$, чтобы удовлетворить условию $D_{2n}^* \cup K_{2n} \subset D_{2(n+1)}^* \cup K_{2(n+1)}$ из определения 1.

ственного интеграла от функции $f(x)$ в смысле Коши и обозначать символом

$$\text{v. p. } \int_{E^m} f(x) dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{B(R, 0)} f(x) dx.$$

Пример. Нетрудно проверить, что для функции $f(x, y) = x$ в E^2

$$\int_{B(R, 0)} x dx dy = 0;$$

тем самым функция $f(x, y) = x$ интегрируема по Коши в E^2 и

$$\text{v. p. } \int_{E^2} x dx dy = 0.$$

Отметим, что несобственный интеграл $\int_{E^2} x dx dy$ расходится.

В случае, когда функция $f(x)$ имеет особенность в некоторой точке x_0 области $D \subset E^m$ и $f(x)$ интегрируема в каждой области $D_R = D \setminus B(R, x_0)$, где $B(R, x_0) \subset D$, интеграл в смысле Коши вводится как предел:

$$\text{v. p. } \int_D f(x) dx = \lim_{R \rightarrow 0} \int_{D_R} f(x) dx.$$

В этой главе мы перенесем понятие одномерного определенного интеграла, взятого по прямолинейному отрезку, на случай, когда областью интегрирования является отрезок некоторой плоской или пространственной кривой. Такого рода интегралы называются криволинейными.

§ 1. ПОНЯТИЯ КРИВОЛИНЕЙНЫХ ИНТЕГРАЛОВ ПЕРВОГО И ВТОРОГО РОДА

Рассмотрим на плоскости Oxy некоторую спрямляемую кривую L , не имеющую точек самопересечения и участков самоналегания. Предположим, что эта кривая определяется параметрическими уравнениями

$$\begin{cases} x = \varphi(t); \\ y = \psi(t) \end{cases} \quad (a \leq t \leq b), \quad (4.1)$$

и сначала будем считать ее незамкнутой и ограниченной точками A и B с координатами $A(\varphi(a), \psi(a))$, $B(\varphi(b), \psi(b))$.

Пусть на кривой $L=AB$ определены три функции: $f(x, y)$, $P(x, y)$, $Q(x, y)$, каждая из которых является непрерывной (а следовательно, и равномерно непрерывной) вдоль этой кривой (так, для функции $f(x, y)$ это означает, что для любого $\varepsilon > 0$ найдется $\delta > 0$ такое, что $|f(M_1) - f(M_2)| < \varepsilon$ для любых точек $M_1, M_2 \in L$, расстояние между которыми меньше δ).

Разобьем сегмент $[a, b]$ при помощи точек $a = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n = b$ на n частичных сегментов $[t_{k-1}, t_k]$ ($k=1, 2, \dots, n$). При этом кривая L распадается на n частичных дуг: $M_0M_1, M_1M_2, \dots, M_{n-1}M_n$, где точки $M_k(x_k, y_k)$, $k=0, 1, \dots, n$, имеют координаты $x_k = \varphi(t_k)$, $y_k = \psi(t_k)$.

Выберем на каждой частичной дуге $M_{k-1}M_k$ произвольную точку $N_k(\xi_k, \eta_k)$, координаты которой отвечают некоторому принадлежащему сегменту $[t_{k-1}, t_k]$ значению τ_k параметра t , так что $\xi_k = \varphi(\tau_k)$, $\eta_k = \psi(\tau_k)$. Обозначим символом Δl_k длину k -й частичной дуги $M_{k-1}M_k$ ($k=1, 2, \dots, n$). Как было доказано в § 10 гл. 10 ч. 1, для Δl_k справедлива формула

$$\Delta l_k = \int_{t_{k-1}}^{t_k} \sqrt{[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2} dt. \quad (4.2)$$

Назовем диаметром разбиения кривой L число $\Delta = \max_{1 \leq k \leq n} \Delta l_k$.

Составим три интегральные суммы:

$$\sigma_1 = \sum_{k=1}^n f(\xi_k, \eta_k) \Delta l_k; \quad (4.3^1)$$

$$\sigma_2 = \sum_{k=1}^n P(\xi_k, \eta_k) \Delta x_k; \quad (4.3^2)$$

$$\sigma_3 = \sum_{k=1}^n Q(\xi_k, \eta_k) \Delta y_k; \quad (4.3^3)$$

где $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$, $\Delta y_k = y_k - y_{k-1}$.

Определение 1. Назовем число I пределом интегральной суммы σ_s ($s=1, 2, 3$) при стремлении к нулю диаметра разбиения Δ , если для любого $\epsilon > 0$ найдется $\delta > 0$ такое, что (независимо от выбора точек N_k на частичных дугах $M_{k-1}M_k$) $|\sigma_s - I| < \epsilon$, как только $\Delta < \delta$.

Определение 2. Если существует предел интегральной суммы σ_1 при $\Delta \rightarrow 0$, то этот предел называется криволинейным интегралом первого рода от функции $f(x, y)$ по кривой L и обозначается одним из символов:

$$\int_L f(x, y) dl \quad \text{или} \quad \int_{AB} f(x, y) dl. \quad (4.4^1)$$

Определение 3. Если существует предел интегральной суммы σ_2 [соответственно σ_3] при $\Delta \rightarrow 0$, то этот предел называется криволинейным интегралом второго рода от функции $P(x, y)$ [$Q(x, y)$] по кривой $L=AB$ и обозначается символом

$$\int_{AB} P(x, y) dx \quad \left[\text{соответственно} \quad \int_{AB} Q(x, y) dy \right]. \quad (4.4^2)$$

Сумму

$$\int_{AB} P(x, y) dx + \int_{AB} Q(x, y) dy$$

принято называть общим криволинейным интегралом второго рода и обозначать символом

$$\int_{AB} P(x, y) dx + Q(x, y) dy. \quad (4.4^3)$$

Из определения криволинейных интегралов следует, что:

1) криволинейный интеграл первого рода не зависит от того, в каком направлении (от A к B или от B к A) пробегает кривая

L , а для криволинейного интеграла второго рода изменение направления на кривой ведет к изменению знака, т. е.

$$\int_{AB} P(x, y) dx + Q(x, y) dy = - \int_{BA} P(x, y) dx + Q(x, y) dy;$$

2) физически криволинейный интеграл первого рода (4.4¹) представляет собой массу кривой L , линейная плотность вдоль которой равна $f(x, y)$; общий криволинейный интеграл второго рода (4.4³) физически представляет собой работу по перемещению материальной точки из A в B вдоль кривой L под действием силы, имеющей составляющие $P(x, y)$ и $Q(x, y)$.

З а м е ч а н и е. Для пространственной кривой $L=AB$ аналогично вводятся криволинейный интеграл первого рода $\int_{AB} f(x, y, z) dl$

и три криволинейных интеграла второго рода

$$\int_{AB} P(x, y, z) dx, \quad \int_{AB} Q(x, y, z) dy, \quad \int_{AB} R(x, y, z) dz.$$

Сумму трех последних интегралов принято называть общим криволинейным интегралом второго рода и обозначать символом

$$\int_{AB} P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz.$$

§ 2. УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ КРИВОЛИНЕЙНЫХ ИНТЕГРАЛОВ

О п р е д е л е н и е. Кривая L называется гладкой, если функции $\varphi(t)$ и $\psi(t)$ из определяющих ее параметрических уравнений (4.1) имеют на сегменте $[a, b]$ непрерывные производные $\varphi'(t)$ и $\psi'(t)$ (т. е. производные непрерывны в интервале $a < t < b$ и обладают конечными предельными значениями в точке a справа и в точке b слева).

Напомним, что в гл. 13 ч. 1 мы договорились называть особыми точками кривой L точки, соответствующие тому значению параметра t из $[a, b]$, для которого $[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2 = 0$, т. е. обе производные обращаются в нуль. Те точки кривой L , для которых $[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2 \neq 0$, мы назвали обыкновенными точками.

Т е о р е м а 4.1. Если кривая $L=AB$ является гладкой и не содержит особых точек и если функции $f(x, y)$, $P(x, y)$ и $Q(x, y)$ непрерывны вдоль этой кривой, то криволинейные интегралы (4.4¹) и (4.4²) существуют и могут быть вычислены по следующим формулам, сводящим эти криволинейные интегралы к обычным определенным интегралам:

$$\int_{AB} f(x, y) dt = \int_a^b f[\varphi(t), \psi(t)] V[\varphi'(t)^2 + [\psi'(t)]^2] dt; \quad (4.5^1)$$

$$\int_{AB} P(x, y) dx = \int_a^b P[\varphi(t), \psi(t)] \varphi'(t) dt; \quad (4.5^2)$$

$$\int_{AB} Q(x, y) dy = \int_a^b Q[\varphi(t), \psi(t)] \psi'(t) dt. \quad (4.5^3)$$

Доказательство. Прежде всего отметим, что определенные интегралы, стоящие в правых частях формул (4.5¹), (4.5²), (4.5³), существуют, ибо при сделанных нами предположениях подынтегральные функции в каждом из этих интегралов непрерывны на сегменте $a \leq t \leq b$.

Отметим также, что вывод соотношений (4.5²) и (4.5³) для криволинейных интегралов второго рода вполне аналогичен, поэтому мы будем выводить только соотношения (4.5¹) и (4.5²) и доказывать существование интегралов (4.4¹) и (4.4²).

Как и в § 1, разобьем сегмент $[a, b]$ на n частичных сегментов $[t_{k-1}, t_k]$, $k=1, 2, \dots, n$, и составим интегральные суммы (4.3¹), (4.3²). Учитывая соотношение (4.2) и соотношение

$$\Delta x_k = \varphi(t_k) - \varphi(t_{k-1}) = \int_{t_{k-1}}^{t_k} \varphi'(t) dt,$$

представим интегральные суммы (4.3¹) и (4.3²) в следующем виде:

$$\sigma_1 = \sum_{k=1}^n \left\{ f[\varphi(\tau_k), \psi(\tau_k)] \int_{t_{k-1}}^{t_k} V[\varphi'(t)^2 + [\psi'(t)]^2] dt \right\};$$

$$\sigma_2 = \sum_{k=1}^n \left\{ P[\varphi(\tau_k), \psi(\tau_k)] \int_{t_{k-1}}^{t_k} \varphi'(t) dt \right\}.$$

Обозначим определенные интегралы, стоящие в правых частях формул (4.5¹) и (4.5²), соответственно через I_1 и I_2 и представим эти интегралы по сегменту $[a, b]$ в виде суммы n интегралов по частичным сегментам $[t_{k-1}, t_k]$, $k=1, 2, \dots, n$.

Рассмотрим и оценим разности

$$\sigma_1 - I_1 = \sum_{k=1}^n \int_{t_{k-1}}^{t_k} \{ f[\varphi(\tau_k), \psi(\tau_k)] - f[\varphi(t), \psi(t)] \} V[\varphi'(t)^2 + [\psi'(t)]^2] dt, \quad (4.6^1)$$

$$\sigma_2 - I_2 = \sum_{k=1}^n \int_{t_{k-1}}^{t_k} \{P[\varphi(\tau_k), \psi(\tau_k)] - P[\varphi(t), \psi(t)]\} \varphi'(t) dt. \quad (4.6^2)$$

При сделанных нами предположениях о функциях $f(x, y)$, $P(x, y)$ и функциях (4.1) функции $f[\varphi(t), \psi(t)]$ и $P[\varphi(t), \psi(t)]$ как сложные функции аргумента t непрерывны на сегменте $a \leq t \leq b$, а следовательно, и равномерно непрерывны на этом сегменте.

Заметим теперь, что при стремлении к нулю диаметра разбиения Δ кривой L стремится к нулю и наибольшая из разностей $\Delta t_k = t_k - t_{k-1}$.

Действительно, так как функции $\varphi'(t)$ и $\psi'(t)$ непрерывны на $[a, b]$ и не обращаются в нуль одновременно, то

$$m = \min_{a \leq t \leq b} \sqrt{[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2} > 0 \text{ и } \Delta t_k \geq m \int_{t_{k-1}}^{t_k} dt = m \Delta t_k, \text{ т. е.}$$

$\Delta t_k \leq \frac{1}{m} \Delta l_k$ (мы учли формулу (4.2) для длины Δl_k).

Таким образом, для любого $\varepsilon > 0$ можно указать $\delta > 0$ такое, что при $\Delta < \delta$ фигурная скобка в формуле (4.6¹) по модулю меньше ε/l , где l — длина кривой L , а фигурная скобка в (4.6²) по модулю меньше $\frac{\varepsilon}{M(b-a)}$, где $M = \max_{a \leq t \leq b} |\varphi'(t)|$.

Полагая, что диаметр разбиения Δ меньше δ , получим для разностей (4.6¹), (4.6²) следующие оценки:

$$|\sigma_1 - I_1| \leq \frac{\varepsilon}{l} \sum_{k=1}^n \int_{t_{k-1}}^{t_k} \sqrt{[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2} dt = \frac{\varepsilon}{l} \sum_{k=1}^n \Delta l_k = \varepsilon,$$

$$|\sigma_2 - I_2| \leq \frac{\varepsilon}{M(b-a)} \sum_{k=1}^n \int_{t_{k-1}}^{t_k} |\varphi'(t)| dt \leq \frac{\varepsilon}{M(b-a)} M \sum_{k=1}^n \Delta t_k = \varepsilon.$$

Итак, мы доказали, что интегральные суммы σ_1 и σ_2 при $\Delta \rightarrow 0$ имеют пределы, соответственно равные I_1 и I_2 . Таким образом, доказано существование криволинейных интегралов (4.4¹), (4.4²) и справедливость для них формул (4.5¹), (4.5²) соответственно. Отметим, что при выводе формулы (4.5²) мы не использовали условия непрерывности функции $\psi'(t)$. Теорема доказана.

Замечание 1. Будем называть кривую L кусочно гладкой, если она непрерывна и распадается на конечное число не имеющих общих внутренних точек кусков, каждый из которых представляет собой гладкую кривую. В случае кусочно гладкой кривой L криволинейные интегралы по этой кривой естественно определить как суммы соответствующих криволинейных интегра-

лов по всем гладким частям, составляющим кривую L . При этом равенства (4.5¹), (4.5²), (4.5³) будут справедливы и для кусочно гладкой кривой L . Эти равенства справедливы и в случае, когда функции $f(x, y)$, $P(x, y)$ и $Q(x, y)$ являются лишь кусочно непрерывными вдоль кривой L (т. е. когда кривая L распадается на конечное число не имеющих общих внутренних точек кусков, вдоль каждого из которых указанные функции непрерывны).

Замечание 2. Аналогичные результаты и формулы справедливы и для криволинейных интегралов, взятых по пространственной кривой

$$L = AB = \{(x, y, z) : x = \varphi(t), y = \psi(t), z = \chi(t) \text{ при } a \leq t \leq b\}.$$

Так, формулы для вычисления этих интегралов имеют следующий вид:

$$\int_{AB} f(x, y, z) dl = \int_a^b f[\varphi(t), \psi(t), \chi(t)] \sqrt{[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2 + [\chi'(t)]^2} dt;$$

$$\int_{AB} P(x, y, z) dx = \int_a^b P[\varphi(t), \psi(t), \chi(t)] \varphi'(t) dt;$$

$$\int_{AB} Q(x, y, z) dy = \int_a^b Q[\varphi(t), \psi(t), \chi(t)] \psi'(t) dt;$$

$$\int_{AB} R(x, y, z) dz = \int_a^b R[\varphi(t), \psi(t), \chi(t)] \chi'(t) dt.$$

Замечание 3. Выше было отмечено, что криволинейный интеграл второго рода зависит от направления обхода кривой $L = AB$. Поэтому следует договориться о том, что мы будем понимать под символом

$$\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy \quad (4.7)$$

в случае, когда L — замкнутая кривая (т. е. когда точка B совпадает с точкой A).

Из двух возможных направлений обхода замкнутого контура L назовем положительным то направление обхода, при котором область, лежащая внутри этого контура, остается по левую сторону по отношению к точке, совершающей обход (т. е. направление движения «против часовой стрелки»).

Будем считать, что в интеграле (4.7) по замкнутому контуру L этот контур всегда обходится в положительном направлении.

В случае, когда необходимо подчеркнуть, что контур L замк-

нут, будем использовать следующую форму записи интеграла (4.7):

$$\oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy.$$

Замечание 4. Криволинейные интегралы обладают теми же свойствами, что и обычные определенные интегралы (доказательства аналогичны изложенным в § 4 гл. 9 ч. 1). Отметим, что при более жестких предположениях указанные свойства сразу вытекают из формул (4.5¹), (4.5²), (4.5³). Перечислим эти свойства применительно к криволинейным интегралам первого рода.

1°. **Линейное свойство.** Если для функций $f(x, y)$ и $g(x, y)$ существуют криволинейные интегралы по кривой AB и если α и β — любые постоянные, то для функции $[\alpha f(x, y) + \beta g(x, y)]$ также существует криволинейный интеграл по кривой AB , причем

$$\int_{AB} [\alpha f(x, y) + \beta g(x, y)] dl = \alpha \int_{AB} f(x, y) dl + \beta \int_{AB} g(x, y) dl.$$

2°. **Аддитивность.** Если дуга AB составлена из двух дуг AC и CB , не имеющих общих внутренних точек, и если для функции $f(x, y)$ существует криволинейный интеграл по дуге AB , то для этой функции существует криволинейный интеграл по каждой из дуг AC и CB , причем

$$\int_{AB} f(x, y) dl = \int_{AC} f(x, y) dl + \int_{CB} f(x, y) dl.$$

3°. **Оценка модуля интеграла.** Если существует криволинейный интеграл по кривой AB от функции $f(x, y)$, то существует и криволинейный интеграл по кривой AB от функции $|f(x, y)|$, причем

$$\left| \int_{AB} f(x, y) dl \right| \leq \int_{AB} |f(x, y)| dl.$$

4°. **Формула среднего значения.** Если функция $f(x, y)$ непрерывна вдоль кривой AB , то на этой кривой найдется точка M такая, что

$$\int_{AB} f(x, y) dl = l f(M),$$

где l — длина кривой AB .

Замечание 5. В полной аналогии с изложенной здесь теорией криволинейного интеграла на плоскости строится теория криволинейного интеграла в пространстве E^n ($n > 2$).

Примеры. 1°. Найти длину дуги пространственной кривой L , определяемой параметрическими уравнениями

$$x=e^{-t} \cos t, \quad y=e^{-t} \sin t, \quad z=e^{-t} \quad \text{при } 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Задача сводится к вычислению криволинейного интеграла первого рода $\int_L 1 dl$. С помощью формулы для вычисления криволинейного интеграла первого рода, приведенной в замечании 2, получим

$$\begin{aligned} \int_L 1 dl &= \int_0^{2\pi} \sqrt{[(e^{-t} \cos t)']^2 + [(e^{-t} \sin t)']^2 + [(e^{-t})']^2} dt = \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{e^{-2t} + e^{-2t} + e^{-2t}} dt = \sqrt{3} (1 - e^{-2\pi}). \end{aligned}$$

2°. Вычислить криволинейный интеграл второго рода

$$I = \int_{AB} (x+y) dx + (x-y) dy,$$

в котором AB — часть эллипса $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, $y \geq 0$, $A(a, 0)$, $B(0, b)$. Указанную кривую можно задать параметрическими уравнениями

$$x = a \cos t, \quad y = b \sin t \quad \text{при } 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}.$$

Поэтому с помощью формул (4.5²), (4.5³) получим

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\pi/2} [(a \cos t + b \sin t)(-a \sin t) + (a \cos t - b \sin t)b \cos t] dt = \\ &= \left[\frac{ab}{2} \sin(2t) + \frac{a^2 + b^2}{4} \cos(2t) \right] \Big|_0^{\pi/2} = -\frac{a^2 + b^2}{2}. \end{aligned}$$

Отметим, что подынтегральное выражение $(x+y)dx + (x-y)dy$ является полным дифференциалом функции

$$u(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{2} + xy.$$

Как будет доказано в гл. 6, из этого факта следует, что интеграл I не зависит от кусочно гладкого пути интегрирования, соединяющего точки A и B (рассмотренная часть эллипса — лишь одна из таких кривых), и равен разности

$$u(B) - u(A) = u(0, b) - u(a, 0) = -\frac{a^2 + b^2}{2}.$$

Глава 5

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ

В этой главе будет рассмотрен вопрос об интегрировании функций, заданных на поверхностях в трехмерном евклидовом пространстве E^3 , а также исследуется вопрос о понятии поверхности и понятии площади поверхности.

§ 1. ПОНЯТИЯ ПОВЕРХНОСТИ И ЕЕ ПЛОЩАДИ

1. Понятие поверхности.

Определение 1. *Отображение f области G на плоскости на множество G^* трехмерного пространства называется гомеоморфным, если это отображение осуществляет взаимно однозначное соответствие между точками G и G^* , при котором каждая фундаментальная последовательность точек G переходит в фундаментальную последовательность точек G^* и, наоборот, каждая фундаментальная последовательность точек G^* является образом фундаментальной последовательности точек G .*

Определение 2. *Отображение f области G на G^* называется локально гомеоморфным, если у каждой точки G есть окрестность, которая гомеоморфно отображается на свой образ.*

Определение 3. *Область G на плоскости T называется элементарной, если эта область является образом открытого круга D при гомеоморфном отображении этого круга на плоскость T .*

Определение 4. *Связная область G на плоскости T называется простой, если любая точка G имеет окрестность, являющуюся элементарной областью.*

Определение 5. *Множество точек Φ пространства называется поверхностью, если это множество является образом простой плоской области G при локально гомеоморфном отображении f области G в пространство E^3 .*

В дальнейшем мы договоримся называть окрестностью точки M поверхности Φ подмножество точек Φ , принадлежащее окрестности точки M в E^3 .

Пример. Пусть G — простая область на плоскости Oxy (например, круг), (x, y) — координаты точек $M \in G$, $z = z(M)$ — непрерывная в G функция, G^* — график этой функции. Очевидно, отображение f области G на G^* , задаваемое соотношениями

$$x=u, \quad y=v, \quad z=z(u, v),$$

является гомеоморфным отображением этой области на множество G^* , а $\Phi=G^*$ является поверхностью.

Пусть на плоскости (u, v) задана простая область G и для всех точек этой области определены три функции:

$$x=x(u, v), \quad y=y(u, v), \quad z=z(u, v), \quad (5.1)$$

или, что то же самое, одна векторная функция

$$\mathbf{r}=\mathbf{r}(u, v), \quad (5.1')$$

где $\mathbf{r}(u, v)$ — вектор с компонентами $x(u, v)$, $y(u, v)$, $z(u, v)$.

Будем считать выполненными следующие два требования А:

1) функции (5.1) имеют в области G непрерывные частные производные первого порядка по переменным u и v ;

2) всюду в области G матрица

$$A=\begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{pmatrix} \quad (5.2)$$

имеет ранг, равный двум.

Утверждение. При выполнении этих двух требований А множество Φ точек, определяемых уравнениями (5.1), представляет собой поверхность, т. е. является образом плоской области G при локально гомеоморфном отображении G в E^3 .

Пусть $N_0(u_0, v_0)$ — любая точка G . Ясно, что малая окрестность этой точки отображается в малую окрестность точки $M(x_0, y_0, z_0)$, где $x_0=x(u_0, v_0)$, $y_0=y(u_0, v_0)$, $z_0=z(u_0, v_0)$ (для этого достаточно, чтобы функции (5.1) являлись непрерывными в G , что в нашем случае заведомо выполняется).

Ясно также, что если $N_n(u_n, v_n)$ — фундаментальная последовательность точек в малой окрестности точки N_0 , то последовательность образов этих точек $M_n(x_n, y_n, z_n)$, где $x_n=x(N_n)$, $y_n=y(N_n)$, $z_n=z(N_n)$, также является фундаментальной в Φ . Это сразу вытекает из непрерывности функций (5.1); например, разность $|x_{n+p}-x_n|=|x(N_{n+p})-x(N_n)|$ может быть сделана меньше произвольного числа $\varepsilon>0$ при $\rho(N_{n+p}, N_n)<\delta=\delta(\varepsilon)$.

Остается доказать, что при отображении, определяемом уравнениями (5.1), каждой точке множества Φ из достаточно малой окрестности точки M_0 отвечает определенная точка области G из малой окрестности точки N_0 , причем любой фундаментальной последовательности точек $\{M_n\}$ из указанной окрестности точки M_0 отвечает фундаментальная последовательность $\{N_n\}$ точек G .

Так как в каждой точке $N_0(u_0, v_0) \in G$ ранг матрицы (5.2) равен двум, то в этой точке N_0 отличен от нуля хотя бы один минор второго порядка матрицы (5.2).

Пусть это будет минор

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \frac{D(x, y)}{D(u, v)} \neq 0 \text{ в точке } N_0.$$

Объединяя это условие с первым из двух требований A , придем к выводу, что для системы

$$\begin{cases} x(u, v) - x = 0; \\ y(u, v) - y = 0 \end{cases} \quad (5.3)$$

в окрестности точки M_0 выполнены все условия теоремы Юнга — Ковалевского (см. § 2 гл. 13 ч. 1). Поэтому система (5.3) имеет в окрестности точки M_0 единственное непрерывное и дифференцируемое решение

$$\begin{cases} u = u(x, y); \\ v = v(x, y). \end{cases} \quad (5.4)$$

Это означает, что существует гомеоморфное отображение малой окрестности точки $N_0 \in G$ на малую окрестность точки $P_0(x_0, y_0)$ плоскости Oxy . (В одну сторону это отображение задается непрерывными функциями (5.4), а в другую сторону — первыми двумя соотношениями (5.1), в которых функции $x = x(u, v)$ и $y = y(u, v)$ также непрерывны; непрерывность и тех и других функций обеспечивает перевод фундаментальной последовательности в окрестности одной из точек N_0 или P_0 в фундаментальную последовательность в окрестности другой из этих точек.)

Подставляя функции (5.4) в третью функцию (5.1), получим непрерывную в окрестности точки $P_0(x_0, y_0)$ функцию

$$z = z[u(x, y), v(x, y)] = \varphi(x, y). \quad (5.5)$$

Эта функция осуществляет гомеоморфное отображение малой окрестности точки $P_0(x_0, y_0)$ плоскости Oxy на малую окрестность точки $M_0(x_0, y_0, z_0) \in \Phi$. Можно сказать, что (5.5) проектирует Φ в малой окрестности точки M_0 на плоскость Oxy .

Так как суперпозиция гомеоморфных отображений представляет собой снова гомеоморфное отображение, то гомеоморфно и отображение малой окрестности точки $N_0 \in G$ на малую окрестность точки $M_0 \in \Phi$.

Таким образом, множество Φ точек, определяемых уравнениями (5.1), при выполнении этих требований A представляет собой поверхность.

Замечание 1. Поверхность Φ , определяемую уравнениями (5.1), при выполнении первого из двух требований A принято называть гладкой, а при выполнении второго из требований A — не имеющей особых точек.

Итак, можно сказать, что поверхность Φ , определяемая уравнениями (5.1), при выполнении этих требований A , является гладкой и не имеет особых точек.

Замечание 2. Попутно мы установили, что гладкая без особых точек поверхность в достаточно малой окрестности каждой из своих точек однозначно проектируется хотя бы на одну из трех координатных плоскостей.

Рассмотрим поверхность Φ , определяемую уравнениями (5.1), для которых выполнены два требования A .

Записав уравнения (5.1) в векторном виде (5.1'), выясним геометрический смысл векторной функции $\mathbf{r}(u, v)$. Если фиксировать некоторое значение $v=v_0=\text{const}$ из области G , то уравнение $\mathbf{r}=\mathbf{r}(u, v_0)$ будет определять кривую на поверхности Φ , называемую координатной линией, а вектор $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}(u, v_0)$ будет являться касательным к этой линии. Аналогично при $u=u_0=\text{const}$ уравнение $\mathbf{r}=\mathbf{r}(u_0, v)$ будет определять другую координатную линию, а вектор $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}(u_0, v)$ будет касательным к этой линии. Через точку $M_0(x_0, y_0, z_0)$, где $x_0=x(u_0, v_0)$, $y_0=y(u_0, v_0)$, $z_0=z(u_0, v_0)$, будут проходить обе указанные линии.

Второе условие требований A , говорящее о том, что ранг матрицы (5.2) равен двум, т. е. условие отсутствия особых точек, означает, что векторы $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}(u_0, v_0)$ и $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}(u_0, v_0)$, компоненты которых составляют строки матрицы (5.2), являются линейно независимыми, т. е. неколлинеарными. Это означает, что эти два вектора определяют плоскость, которая является касательной плоскостью к поверхности Φ в точке M_0 . Нормальный вектор этой касательной плоскости называется вектором нормали (или нормалью) к поверхности Φ в точке M_0 . Этот вектор может быть определен как векторное произведение векторов $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}$ и $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}$. Таким образом, вектор

$$\mathbf{n} = \frac{\left[\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}, \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right]}{\left| \left[\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}, \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right] \right|} \quad (5.6)$$

представляет собой вектор единичной нормали к поверхности Φ . В силу требований, наложенных на функции (5.1), этот вектор непрерывен по u и v в некоторой окрестности произволь-

ной точки поверхности. В этом случае говорят, что *в окрестности любой точки гладкой поверхности без особых точек существует непрерывное векторное поле нормалей*.

В целом на всей поверхности такого непрерывного поля нормалей может и не существовать.

Пример. Лист Мёбиуса. Если склеить прямоугольник $ABB'A'$ так, чтобы A совпала с B' , а B совпала с A' , получится поверхность, называемая листом Мёбиуса¹⁾. При обходе по листу Мёбиуса нормаль меняет направление на противоположное (см. рис. 5.1).

В дальнейшем будем рассматривать только такие поверхности Φ , на которых в целом существует непрерывное поле нормалей. Такие поверхности принято называть двусторонними.

Поверхность Φ называется *полной*, если любая фундаментальная последовательность точек этой поверхности сходится к точке этой поверхности.

Поверхность Φ называется *ограниченной*, если существует трехмерный шар, содержащий все точки этой поверхности.

Плоскость, сфера, эллипсоид, однополостный гиперболоид — примеры полных поверхностей. При этом сфера и эллипсоид — ограниченные поверхности. Круг без границы, любое открытое связное множество на сфере — неполные поверхности.

В дальнейшем мы будем рассматривать поверхность Φ , определяемую уравнениями (5.1) и удовлетворяющую пяти требованиям: она должна быть 1) гладкой, 2) без особых точек, 3) двусторонней, 4) полной и 5) ограниченной.

2. Вспомогательные леммы.

Лемма 1. Если Φ — гладкая поверхность и M_0 — не особая ее точка, то достаточно малая окрестность точки M_0 однозначно проектируется на касательную плоскость, проходящую через любую точку этой окрестности.

Доказательство. Пусть окрестность $\hat{\Phi}$ точки M_0 такова, что: 1) нормаль в пределах этой окрестности составляет с нормалью в точке M_0 угол, меньший $\pi/4$, 2) окрестность $\hat{\Phi}$ однозначно проектируется на некоторый круг в одной из координатных плоскостей (например, Oxy). Возможность выбора такой окрестности $\hat{\Phi}$ вытекает из того, что в предыдущем пункте было установлено существование окрестности рассматриваемой точки M_0 , обладающей двумя свойствами: 1) в этой окрестности существует




Рис. 5.1

¹⁾ А. Мёбиус — немецкий математик (1790—1868).

непрерывное векторное поле нормалей; 2) эта окрестность однозначно проектируется на одну из координатных плоскостей (очевидно, в этой окрестности есть часть, проектирующаяся на некоторый круг в координатной плоскости).

Отметим, что любые две нормали к точкам $\hat{\Phi}$ составляют угол, меньший $\pi/2$.

Предположим, что рассматриваемая окрестность $\hat{\Phi}$ не проектируется однозначно на касательную плоскость, проходящую через некоторую точку $M \in \hat{\Phi}$. Тогда в этой окрестности найдутся две точки P и Q такие, что хорда PQ параллельна нормали к Φ в точке M . Рассмотрим линию пересечения $\hat{\Phi}$ с плоскостью, параллельной оси Oz и проходящей через хорду PQ (предполагаем, что $\hat{\Phi}$ однозначно проектируется на плоскость Oxy). На этой линии в силу теоремы Лагранжа найдется точка N , касательная к которой параллельна хорде PQ , а поэтому параллельна нормали в точке M . Это означает, что нормали в точках M и N составляют угол $\pi/2$, что противоречит выбору $\hat{\Phi}$. Полученное противоречие убеждает нас в справедливости леммы. Лемма доказана.

Будем говорить, что участок поверхности имеет размеры меньше δ ($\delta > 0$), если он лежит внутри некоторого шара радиуса $\delta/2$.

Лемма 2. Для гладкой ограниченной полной поверхности Φ без особых точек найдется число $\delta > 0$ такое, что любой участок Φ , размеры которого меньше δ , однозначно проектируется а) на одну из координатных плоскостей, б) на касательную плоскость, проходящую через любую точку этого участка.

Доказательство. Выше, в замечании 2 и в лемме 1, мы доказали, что для каждой точки поверхности Φ найдется достаточно малая окрестность $\hat{\Phi}$, которая однозначно проектируется а) на одну из координатных плоскостей, б) на касательную плоскость, проходящую через любую точку $\hat{\Phi}$.

Предположим, что утверждение леммы неверно, т. е. не найдется числа $\delta > 0$, указанного в формулировке леммы. Тогда для любого $\delta_n = 1/n$ ($n = 1, 2, \dots$) найдется участок $\hat{\Phi}_n$, имеющий размеры меньше δ_n и не проектирующийся однозначно либо на одну из координатных плоскостей, либо на касательную плоскость, проходящую через некоторую точку $M_n \in \hat{\Phi}_n$. Выберем в каждой части $\hat{\Phi}_n$ точку $\hat{M}_n$ и выделим из последовательности $\{\hat{M}_n\}$ точек ограниченной полной поверхности Φ подпоследовательность $\{\hat{M}_{n_k}\}$, сходящуюся к некоторой точке $M_0 \in \Phi$.

В силу замечания 2 и леммы 1 найдется достаточно малая окрестность $\hat{\Phi}$ точки M_0 , которая однозначно проектируется на одну из координатных плоскостей и на касательную плоскость,

проходящую через любую точку $\hat{\Phi}$. Все $\hat{\Phi}_{k_n}$, начиная с некоторого номера k_n , попадут внутрь $\hat{\Phi}$, а это противоречит выбору частей $\hat{\Phi}_n$. Лемма доказана.

Лемма 3. Пусть Φ — гладкая без особых точек двусторонняя полная ограниченная поверхность, определяемая уравнениями (5.1). Тогда для любого $\varepsilon > 0$ найдется $\delta > 0$ такое, что для каждого участка поверхности Φ , имеющего размеры меньше δ , угол γ между двумя любыми нормальными к точкам этого участка удовлетворяет условию

$$\cos \gamma = 1 - \alpha, \quad (5.7)$$

где $0 \leq \alpha < \varepsilon$.

Доказательство. Поверхность Φ двусторонняя, поэтому поле нормалей непрерывно, а следовательно, и равномерно непрерывно на всей поверхности Φ . Это означает, что для любого $\varepsilon > 0$ найдется $\delta > 0$ такое, что для любых двух точек M_1 и M_2 , для которых $\rho(M_1, M_2) < \delta$, справедливо неравенство

$$|\mathbf{n}(M_2) - \mathbf{n}(M_1)| < \sqrt{2\varepsilon} \quad (5.8)$$

($\mathbf{n}$ — вектор единичной нормали).

Так как

$$\cos \gamma = (\mathbf{n}(M_1), \mathbf{n}(M_2)),$$

а величина

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{1}{2} (\mathbf{n}(M_2) - \mathbf{n}(M_1))^2 = \\ &= \frac{1}{2} |\mathbf{n}(M_2)|^2 + \frac{1}{2} |\mathbf{n}(M_1)|^2 - (\mathbf{n}(M_1), \mathbf{n}(M_2)) = 1 - \cos \gamma, \end{aligned}$$

то

$$\cos \gamma = 1 - \alpha$$

и для α в силу (5.8) справедливы неравенства

$$0 \leq \alpha < \frac{1}{2} (\sqrt{2\varepsilon})^2 = \varepsilon.$$

Лемма доказана.

3. Площадь поверхности. Пусть Φ — поверхность, определяемая уравнениями (5.1) и удовлетворяющая указанным выше пяти требованиям (гладкая без особых точек ограниченная полная двусторонняя). С помощью гладких кривых разобьем Φ на конечное число гладких участков Φ_i , имеющих размер меньше δ , где δ достаточно мало (и определяется условиями леммы 2). Обозначим через Δ максимальный из размеров частей Φ_i (диаметр разбиения). На каждом участке Φ_i выберем произвольную точку M_i и спроектируем Φ_i на касательную плоскость, проходящую через точку M_i . Пусть σ_i — площадь проекции Φ_i на указанную ка-

сательную плоскость. Составим сумму площадей проекций всех участков

$$\sum_i \sigma_i. \quad (5.9)$$

Определение 1. Число σ называется *пределом сумм* (5.9) при $\Delta \rightarrow 0$, если для любого $\epsilon > 0$ найдется $\delta > 0$ такое, что для всех разбиений Φ гладкими кривыми на конечное число частей Φ_i , для которых $\Delta < \delta$, независимо от выбора точек M_i на частях Φ_i , выполняется неравенство

$$\left| \sum_i \sigma_i - \sigma \right| < \epsilon.$$

Определение 2. Если для поверхности Φ существует предел σ сумм (5.9) при $\Delta \rightarrow 0$, то поверхность Φ называется *квадрируемой*, а число σ называется ее *площадью*.

Замечание. Нельзя получить площадь поверхности, аппроксимируя поверхность вписанными многогранниками при измельчении размеров граней и беря в качестве площади точную верхнюю грань площадей вписанных многогранников (как мы это делали при нахождении длины кривой). Существует классический пример Шварца²⁾ (так называемый «сапог Шварца»), показывающий, что у площадей вписанных в цилиндрическую поверхность многогранников не существует конечной точной верхней грани.

Теорема 5.1. Гладкая ограниченная полная двусторонняя поверхность Φ без особых точек, определяемая уравнениями (5.1), квадрируема, и для ее площади σ справедливо равенство

$$\sigma = \iint_G \left| \left[\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}, \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right] \right| du dv. \quad (5.10)$$

Доказательство. При условиях теоремы подынтегральная функция в (5.10) непрерывна в G и интеграл (5.10) существует.

Фиксируем любое $\epsilon > 0$ и по нему $\delta > 0$ такое, что выполнены два условия:

1) любая часть Φ_i поверхности Φ , размеры которой меньше δ , однозначно проектируется на касательную плоскость, проходящую через любую точку Φ_i ;

2) косинус угла γ между двумя нормальными к каждому участку Φ_i размера меньше δ , представим в виде $\cos \gamma = 1 - \alpha_i$, где $\alpha_i < \epsilon/\sigma$ и $\alpha_i \leq 1$ (σ — величина интеграла (5.10)).

Такой выбор числа $\delta > 0$ возможен в силу лемм 2 и 3.

²⁾ Г. А. Шварц — немецкий математик (1843—1921). Более подробно о примере Шварца см. конец п. 1 § 2 гл. 5 книги В. А. Ильина и Э. Г. Позняка «Основы математического анализа. Ч. 2» (М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит-ры, 1982).

Разобьем с помощью гладких кривых поверхность Φ на частичные участки Φ_i размера меньше δ и, выбрав на каждом участке Φ_i произвольную точку M_i , спроектируем Φ_i на касательную плоскость в точке M_i . Обозначим через σ_i площадь проекции и составим сумму (5.9).

Для вычисления площади σ_i плоской области воспользуемся формулой замены переменных в двойном интеграле. Выберем декартову систему координат так, чтобы ее начало совпало с M_i , ось Oz была направлена по вектору нормали к поверхности в M_i , а оси Ox и Oy были бы расположены в касательной плоскости в точке M_i . В этой системе координат поверхность Φ определяется параметрическими уравнениями (5.1), а вектор нормали $\left[\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}, \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right]$ имеет координаты $\{A, B, C\}$, где

$$A = \begin{vmatrix} \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{vmatrix}, \quad B = \begin{vmatrix} \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial u} \\ \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial v} \end{vmatrix}, \quad C = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}.$$

Отметим, что косинус угла γ_M между нормалью в точке M участка Φ_i и осью Oz равен

$$\cos \gamma_M = \frac{C}{\left| \left[\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}, \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right] \right|} \Bigg|_M. \quad (5.11)$$

Для точек участка Φ_i , в силу выбора δ и ориентации оси Oz , $C > 0$. Ясно, что угол γ_M является углом между нормальями в точках M и M_i участка Φ_i , и поэтому для него справедливо представление (5.7).

Если части Φ_i отвечает часть G_i простой плоской области G , то, используя формулу для площади плоской области при переходе от координат (x, y) к координатам (u, v) с помощью соотношений $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$, получим

$$\sigma_i = \iint_{G_i} \frac{D(x, y)}{D(u, v)} du dv. \quad (5.12)$$

(Мы учли, что величина $C = \frac{D(x, y)}{D(u, v)} > 0$.)

Приняв во внимание выражение (5.11) для $\cos \gamma_M$, перепишем (5.12) в виде

$$\sigma_i = \iint_{G_i} \cos \gamma_M \left| \left[\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}, \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right] \right| du dv. \quad (5.13)$$

Применяя к интегралу (5.13) первую формулу среднего значения, получим

$$\sigma_i = \cos \gamma_{M_i^*} \iint_{G_i} \left| \left[\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}, \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right] \right| du dv, \quad (5.14)$$

где M_i^* — некоторая точка части Φ_i . Заменяв $\cos \gamma_{M_i^*}$ в (5.14) представлением (5.7), получим равенства

$$\sigma_i = (1 - \alpha_i) \iint_{G_i} \left| \left[\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}, \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right] \right| du dv. \quad (5.15)$$

Просуммируем эти равенства по всем i , учитывая, что

$$\sum_i \iint_{G_i} \left| \left[\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}, \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right] \right| du dv = \iint_G \left| \left[\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}, \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right] \right| du dv = \sigma.$$

Получим

$$\sum_i \sigma_i = \sigma - \sum_i \alpha_i \iint_{G_i} \left| \left[\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}, \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right] \right| du dv.$$

Отсюда, используя оценку для α_i , будем иметь

$$\begin{aligned} \left| \sum_i \sigma_i - \sigma \right| &\leq \sum_i |\alpha_i| \iint_{G_i} \left| \left[\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}, \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right] \right| du dv \leq \\ &\leq \frac{\varepsilon}{\sigma} \sum_i \iint_{G_i} \left| \left[\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}, \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right] \right| du dv = \frac{\varepsilon}{\sigma} \sigma = \varepsilon. \end{aligned}$$

Теорема доказана.

Замечание 1. Формула (5.10) инвариантна относительно выбора осей координат.

Замечание 2. Теорема 5.1 доказана в предположении, что поверхность Φ определяется уравнениями (5.1). В общем случае согласно лемме 2 поверхность Φ может быть разбита на конечное число частей, каждая из которых определяется своими уравнениями (5.1). После этого площадь поверхности можно определить как сумму площадей указанных частей. Площадь каждой такой части может быть вычислена по формуле (5.10). Таким образом, имеет место следующая

Теорема 5.1*. Гладкая ограниченная полная двусторонняя поверхность без особых точек квадратуема.

Замечание 3. Пусть поверхность Φ кусочно гладкая, т. е. составлена из конечного числа гладких ограниченных полных двусторонних поверхностей. Очевидно, поверхность Φ квадратуема, и

ее площадь может быть определена как сумма площадей составляющих ее поверхностей.

З а м е ч а н и е 4. Если ввести обозначения

$$\left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}\right)^2 = \left|\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}\right|^2 = E, \quad \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}\right)^2 = \left|\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}\right|^2 = D, \quad \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}, \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}\right) = F,$$

то, поскольку для любых векторов $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$ справедливо равенство $|\mathbf{a}, \mathbf{b}|^2 + (\mathbf{a}, \mathbf{b})^2 = |\mathbf{a}|^2 \cdot |\mathbf{b}|^2$, получим

$$\left| \left[\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}, \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right] \right|^2 = ED - F^2. \quad (5.16)$$

Поэтому выражение (5.10) для площади поверхности можно записать также в следующей форме:

$$\sigma = \iint_G \sqrt{ED - F^2} \, du \, dv. \quad (5.17)$$

З а м е ч а н и е 5. Площадь поверхности обладает свойством аддитивности: если поверхность Φ разбита кусочно гладкой кривой на части Φ_1 и Φ_2 , не имеющие общих внутренних точек, то площадь поверхности Φ равна сумме площадей частей Φ_1 и Φ_2 .

Это свойство вытекает из представления площади поверхности с помощью интеграла и аддитивного свойства интеграла.

§ 2. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ

Пусть Φ — гладкая, двусторонняя полная ограниченная поверхность без особых точек, определяемая параметрическими уравнениями (5.1) (или, что то же самое, (5.1')) в области G .

Пусть на Φ определены четыре функции: $f(x, y, z)$, $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$, $R(x, y, z)$, каждая из которых является непрерывной (а, следовательно, и равномерно непрерывной) на множестве точек поверхности Φ .

Разобьем поверхность Φ при помощи гладких или кусочно гладких кривых на конечное число частичных поверхностей Φ_i и обозначим через Δ максимальный размер частей Φ_i (диаметр разбиения поверхности). Выберем на каждой частичной поверхности Φ_i произвольную точку M_i .

Пусть $\mathbf{n}(M_i)$ — единичная нормаль в точке M_i , а $\cos X_i$, $\cos Y_i$, $\cos Z_i$ — компоненты этой единичной нормали (или, как их называют, направляющие косинусы). Обозначим через σ_i площадь частичной поверхности Φ_i . Как показано выше (см. (5.17)),

$$\sigma_i = \iint_{G_i} \sqrt{ED - F^2} \, du \, dv,$$

где G_i — подобласть G , образом которой является Φ_i .

Составим четыре суммы:

$$\Sigma_1 = \sum_i f(M_i) \sigma_i; \quad (5.18^1)$$

$$\Sigma_2 = \sum_i P(M_i) \sigma_i \cos X_i; \quad (5.18^2)$$

$$\Sigma_3 = \sum_i Q(M_i) \sigma_i \cos Y_i; \quad (5.18^3)$$

$$\Sigma_4 = \sum_i R(M_i) \sigma_i \cos Z_i. \quad (5.18^4)$$

Определение 1. Число I_k ($k=1, 2, 3, 4$) называется пределом сумм Σ_k при $\Delta \rightarrow 0$, если для любого $\varepsilon > 0$ найдется $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ такое, что при $\Delta < \delta$ (независимо от выбора точек $M_i \in \Phi_i$) выполняется неравенство

$$|\Sigma_k - I_k| < \varepsilon.$$

Определение 2. Если при $\Delta \rightarrow 0$ существует предел сумм Σ_1 , то этот предел называется поверхностным интегралом первого рода от функции $f(x, y, z)$ по поверхности Φ и обозначается символом

$$I_1 = \iint_{\Phi} f(M) d\sigma. \quad (5.19^1)$$

Определение 2*. Если при $\Delta \rightarrow 0$ существуют пределы сумм Σ_k , где $k=2, 3$ или 4 , то эти пределы называются поверхностными интегралами второго рода и обозначаются соответственно символами

$$I_2 = \iint_{\Phi} P(M) \cos X d\sigma; \quad (5.19^2)$$

$$I_3 = \iint_{\Phi} Q(M) \cos Y d\sigma; \quad (5.19^3)$$

$$I_4 = \iint_{\Phi} R(M) \cos Z d\sigma. \quad (5.19^4)$$

Сумма последних трех интегралов называется общим поверхностным интегралом второго рода. Этот интеграл может быть записан в виде

$$\iint_{\Phi} (\mathbf{A}, \mathbf{n}) d\sigma, \quad (5.19^5)$$

где $\mathbf{A} = \mathbf{A}(x, y, z)$ — вектор с компонентами $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$,

$R(x, y, z)$, а $\mathbf{n} = \{\cos X, \cos Y, \cos Z\}$ — вектор единичной нормали к поверхности Φ .

Из определений поверхностных интегралов следует, что:

1) поверхностный интеграл первого рода не зависит от выбора стороны поверхности и не меняется при изменении направления нормали на противоположное, а поверхностные интегралы второго рода меняют знак при изменении направления нормали на противоположное;

2) поверхностный интеграл первого рода (5.19¹) и общий поверхностный интеграл второго рода (5.19⁵) не зависят от выбора системы координат и инвариантны относительно перехода к новым координатам;

3) физически интеграл (5.19⁵) представляет собой поток вектора $\mathbf{A}$ через поверхность Φ , а интеграл (5.19¹) дает массу нагруженной поверхности Φ при условии, что поверхностная плотность распределения массы равна $f(x, y, z)$;

4) каждый из поверхностных интегралов второго рода (5.19²) — (5.19⁴) сводится к поверхностному интегралу первого рода (5.19¹): достаточно взять в поверхностном интеграле первого рода подынтегральную функцию $f(M)$ соответственно равной $P(M) \cos X$, $Q(M) \cos Y$ и $R(M) \cos Z$, причем если P , Q и R являются непрерывными на Φ , то и f окажется непрерывной вдоль Φ .

Отметим, что в случае замкнутой поверхности Φ вектор нормали всегда считают направленным во внешность области, ограниченной этой поверхностью.

Теорема 5.2. Если Φ гладкая двусторонняя полная ограниченная поверхность без особых точек, задаваемая уравнениями (5.1), а функция $f(x, y, z)$ [соответственно функции $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$, $R(x, y, z)$] непрерывна вдоль Φ , то поверхностный интеграл (5.19¹) [соответствующий из поверхностных интегралов (5.19²) — (5.19⁴)] существует и сводится к обычному двойному интегралу с помощью формулы

$$\iint_{\Phi} f(M) d\sigma = \iint_G f[x(u, v), y(u, v), z(u, v)] \sqrt{ED - F^2} du dv \quad (5.20^1)$$

[с помощью соответствующей из формул

$$\begin{aligned} \iint_{\Phi} P(M) \cos X d\sigma &= \iint_G P[x(u, v), y(u, v), z(u, v)] \times \\ &\times \cos X \sqrt{ED - F^2} du dv; \end{aligned} \quad (5.20^2)$$

$$\begin{aligned} \iint_{\Phi} Q(M) \cos Y d\sigma &= \iint_G Q[x(u, v), y(u, v), z(u, v)] \times \\ &\times \cos Y \sqrt{ED - F^2} du dv; \end{aligned} \quad (5.20^3)$$

$$\iint_{\Phi} R(M) \cos Z \, d\sigma = \iint_G R[x(u, v), y(u, v), z(u, v)] \times \\ \times \cos Z \sqrt{ED - F^2} \, du \, dv]. \quad (5.20^4)$$

Доказательство. Достаточно провести доказательство существования только интеграла (5.19¹) и справедливости формулы (5.20¹), так как все поверхностные интегралы второго рода сводятся к этому интегралу.

Заметим, что интеграл, стоящий в правой части (5.20¹) (обозначим его I_1), существует (поскольку подынтегральная функция непрерывна), поэтому достаточно доказать, что предел сумм (5.18¹) при диаметре разбиения $\Delta \rightarrow 0$ существует и равен I_1 . Фиксируем любое $\varepsilon > 0$ и оценим разность

$$\begin{aligned} \Sigma_1 - I_1 &= \sum_i f(M_i) \sigma_i - \sum_i \iint_{G_i} f(M) \sqrt{ED - F^2} \, du \, dv = \\ &= \sum_i f(M_i) \iint_{G_i} \sqrt{ED - F^2} \, du \, dv - \sum_i \iint_{G_i} f(M) \sqrt{ED - F^2} \, du \, dv = \\ &= \sum_i \iint_{G_i} [f(M_i) - f(M)] \sqrt{ED - F^2} \, du \, dv. \end{aligned} \quad (5.21)$$

Здесь мы использовали представление (5.17) для σ_i . Так как функция $f(M)$ равномерно непрерывна в G , то для фиксированного $\varepsilon > 0$ найдется $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ такое, что при $\rho(M, M_i) < \delta$ выполняется неравенство

$$|f(M) - f(M_i)| < \frac{\varepsilon}{\sigma}, \quad (5.22)$$

где σ — площадь поверхности Φ . Из (5.21), (5.22) получим

$$\begin{aligned} |\Sigma_1 - I_1| &\leq \frac{\varepsilon}{\sigma} \sum_i \iint_{G_i} \sqrt{ED - F^2} \, du \, dv = \\ &= \frac{\varepsilon}{\sigma} \iint_G \sqrt{ED - F^2} \, du \, dv = \frac{\varepsilon}{\sigma} \sigma = \varepsilon \end{aligned}$$

при $\Delta < \delta$. Это означает, что существует равный I_1 предел сумм Σ_1 при $\Delta \rightarrow 0$. Теорема доказана.

Следствие. Если поверхность Φ задана уравнением $z = z(x, y)$ (т. е. $x = u$, $y = v$, $z = z(u, v)$), где $z(x, y)$ — непрерывно дифференцируемая в области G плоскости Oxy функция, то, выбирая на поверхности Φ ту сторону, для которой вектор нормали

поверхности составляет с осью Oz острый угол, можем переписать формулу (5.20⁴) следующим образом:

$$\iint_{\Phi} R(x, y, z) \cos Z \, d\sigma = \iint_G R[x, y, z(x, y)] \, dx \, dy.$$

В самом деле, достаточно учесть, что

$$d\sigma = \sqrt{ED - F^2} \, dx \, dy, \quad ED - F^2 = 1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2,$$

$$\cos Z = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}}.$$

Это оправдывает следующее обозначение для поверхностного интеграла второго рода:

$$\iint_{\Phi} R(x, y, z) \cos Z \, d\sigma = \iint_{\Phi} R(x, y, z) \, dx \, dy. \quad (5.23)$$

Отметим, что обозначение (5.23) используется и в случае, когда Φ не является графиком функции $z = z(x, y)$.

Для общего поверхностного интеграла второго рода (5.19⁵) также применяется следующее обозначение:

$$\iint_{\Phi} (P \cos X + Q \cos Y + R \cos Z) \, d\sigma = \iint_{\Phi} P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy.$$

З а м е ч а н и е. Понятия поверхностных интегралов первого и второго рода естественно распространяются на случай, когда поверхность Φ является кусочно гладкой. Для таких поверхностей, очевидно, также справедлива доказанная в этом параграфе теорема существования.

Глава 6

ТЕОРИЯ ПОЛЯ. ОСНОВНЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ АНАЛИЗА

В этой главе будут рассмотрены скалярные и векторные поля, а также основные понятия и операции, связанные с ними. Важнейшей формулой анализа является уже известная нам формула Ньютона—Лейбница. Здесь будут получены формулы Грина, Остроградского—Гаусса и Стокса, которые, с одной стороны, являются обобщением формулы Ньютона—Лейбница на многомерный случай, а с другой стороны, составляют важную часть аппарата интегрального исчисления.

§ 1. ОБОЗНАЧЕНИЯ. БИОРТОГОНАЛЬНЫЕ БАЗИСЫ. ИНВАРИАНТЫ ЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРА

1. Обозначения. Ниже нам часто придется записывать суммы некоторого числа слагаемых. Поясним обозначения, которыми будем пользоваться. Мы будем иметь дело с системами величин, которые помечены несколькими индексами, например a_k^i . Обычно в таких случаях один индекс пишут внизу, другой — вверху. Если индексы меняются независимо, то они обозначаются разными буквами. Если индексов много, то они обозначаются одной буквой с подындексом.

Например, $\omega_{i_1} \dots i_p$ или $\xi_1^{i_1} \dots \xi_p^{i_p}$. В некоторых случаях для обозначения суммирования будет использована запись $\sum_{\sigma} A(\sigma)$, где суммирование производится по некоторому множеству величин σ . Если индексы суммирования $i_1, i_2, \dots, i_p$ меняются так, что при этом $i_1 < i_2 < \dots < i_p$, то будем писать

$$\sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_p} B_{i_1 i_2 \dots i_p}.$$

Наконец, заключим следующее соглашение о суммировании. Пусть имеется выражение, составленное из сомножителей. Если в этом выражении имеется два буквенных индекса, из которых один верхний, а другой нижний, то будем полагать, что по этим индексам происходит суммирование. При этом индексы последовательно принимают значение 1, 2, ..., а полученные слагаемые складываются.

Например, если $i, j = 1, 2, \dots, n$, то

$$\begin{aligned} a_i e^i &= a_1 e^1 + a_2 e^2 + \dots + a_n e^n, \\ a_i e^i e^j &= a_{1j} e^1 e^j + a_{2j} e^2 e^j + \dots + a_{nj} e^n e^j = \\ &= a_{11} e^1 e^1 + a_{12} e^1 e^2 + \dots + a_{1n} e^1 e^n + a_{21} e^2 e^1 + \\ &+ a_{22} e^2 e^2 + \dots + a_{2n} e^2 e^n + \dots + a_{n1} e^n e^1 + a_{n2} e^n e^2 + \dots + a_{nn} e^n e^n. \end{aligned}$$

При этих обозначениях разложение вектора $\mathbf{a}$ по базису $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ пространства E^n может быть записано так:

$$\mathbf{a} = a^i \mathbf{e}_i,$$

где a^i — коэффициенты разложения этого вектора. Эта запись означает, что

$$\mathbf{a} = \sum_{i=1}^n a^i \mathbf{e}_i.$$

Символом δ_i^j будем обозначать величину, принимающую всего два значения:

$$\delta_i^i = 1, \delta_i^j = 0, \text{ при } i \neq j,$$

δ_i^j — так называемый символ Кронекера ¹⁾.

Скалярное произведение двух векторов $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$ в пространстве E^n обозначается $(\mathbf{a}, \mathbf{b})$.

2. Биортогональные базисы в пространстве E^n . Пусть $\mathbf{e}_i, i = 1, 2, \dots, n$ — базис ²⁾ в n -мерном пространстве E^n . Очевидно, что $\mathbf{e}_i$ — линейно независимые векторы.

Определение. Базис $\mathbf{e}^j$ (индекс вверху), $j = 1, 2, \dots, n$, называется биортогональным к базису $\mathbf{e}_i$, если выполнены соотношения

$$(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}^j) = \delta_i^j = \begin{cases} 1, & i = j; \\ i, & j = 1, 2, \dots, n; \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Утверждение. Для всякого базиса $\mathbf{e}_i, i = 1, 2, \dots, n$, пространства E^n существует единственный биортогональный базис $\mathbf{e}^j, j = 1, 2, \dots, n$.

Доказательство. Обозначим линейную оболочку (т. е. множество всех линейных комбинаций) векторов $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_{i-1}$,

¹⁾ Л. Кронекер — немецкий математик (1823—1891).

²⁾ Векторы $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ образуют базис в E^n , если любой вектор $\mathbf{a}$ из E^n представим единственным образом в виде

$$\mathbf{a} = a^1 \mathbf{e}_1 + a^2 \mathbf{e}_2 + \dots + a^n \mathbf{e}_n = a^i \mathbf{e}_i.$$

$\mathbf{e}_{i+1}, \dots, \mathbf{e}_n$ через M_i . Взяв из ортогонального дополнения к M_i ³⁾ вектор $\mathbf{e}^i$, нормированный условием

$$(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}^i) = 1,$$

мы, очевидно, найдем, что

$$(\mathbf{e}^i, \mathbf{e}^j) = \delta_i^j, \quad i, j = 1, 2, \dots, n.$$

Векторы $\mathbf{e}^j$ также образуют базис пространства E^n . Действительно, если бы это было не так, то нашелся бы вектор из этого пространства, который неоднозначно разлагался бы по системе $\mathbf{e}^j$, т. е. нулевой вектор имел бы разложение по базису с коэффициентами, не равными одновременно нулю. Следовательно, какой-нибудь вектор $\mathbf{e}^k$ из системы $\mathbf{e}^j$ принадлежал бы линейной оболочке ⁴⁾ M^k векторов $\mathbf{e}^1, \mathbf{e}^2, \dots, \mathbf{e}^{k-1}, \mathbf{e}^{k+1}, \dots, \mathbf{e}^n$. Но этого быть не может, так как $\mathbf{e}^k$ в этом случае был бы ортогонален вектору $\mathbf{e}_k$ (поскольку $(\mathbf{e}_k, \mathbf{e}^p) = 0$ при $k \neq p$). Однако вектор $\mathbf{e}^k$ не может быть ортогональным $\mathbf{e}_k$, потому что по построению $(\mathbf{e}_k, \mathbf{e}^k) = 1$.

Таким образом, к произвольному базису $\mathbf{e}_i$ построен биортогональный базис $\mathbf{e}^j$, причем все векторы этого базиса определяются единственным образом. В самом деле, если бы наряду с $\mathbf{e}^j$ был бы еще один биортогональный базис $\tilde{\mathbf{e}}^j$, то мы имели бы, что $(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j - \tilde{\mathbf{e}}^j) = 0$ для всех $i, j = 1, 2, \dots, n$. Отсюда следует, что $\mathbf{e}^j = \tilde{\mathbf{e}}^j$, поскольку если некоторый вектор ортогонален всем векторам базиса, то он ортогонален и самому себе, поэтому является нулевым вектором. Утверждение доказано.

Заметим, что если базис $\mathbf{e}_i$ — ортонормированный, то биортогональный к нему совпадает с ним самим.

3. Преобразования базисов. Ковариантные и контрвариантные координаты вектора. Мы часто будем пользоваться переходом от биортогональных базисов $\mathbf{e}_i, \mathbf{e}^i$ к новым биортогональным базисам $\mathbf{e}_{i'}, \mathbf{e}^{i'}$.

Используя наши соглашения о суммировании, запишем разложения базисных векторов:

$$\mathbf{e}_{i'} = b_{i'}^i \mathbf{e}_i, \quad \mathbf{e}_i = b_i^{i'} \mathbf{e}_{i'}, \quad i, i' = 1, 2, \dots, n, \quad (6.1)$$

$$\mathbf{e}^{i'} = \tilde{b}_i^{i'} \mathbf{e}^i, \quad \mathbf{e}^i = \tilde{b}_i^{i'} \mathbf{e}^{i'}, \quad i, i' = 1, 2, \dots, n. \quad (6.2)$$

Здесь $(b_{i'}^i)$ — матрица перехода от старого базиса $\mathbf{e}_i$ к новому $\mathbf{e}_{i'}$, $(b_i^{i'})$ — матрица обратного перехода от базиса $\mathbf{e}_{i'}$ к $\mathbf{e}_i$. Аналогично $(\tilde{b}_i^{i'})$ и $(\tilde{b}_{i'}^i)$ — матрицы прямого и обратного перехода от базиса $\mathbf{e}^i$ к базису $\mathbf{e}^{i'}$.

³⁾ Т. е. из подпространства пространства E^n , все векторы которого ортогональны M_i .

⁴⁾ Т. е. вектор $\mathbf{e}^k$ был бы линейной комбинацией векторов $\mathbf{e}^p$ при $p \neq k$.

Формулы (6.1) — это формулы перехода от старого базиса $\mathbf{e}_i$ к новому $\mathbf{e}_{i'}$ и формулы обратного перехода. Формулы (6.2) — это формулы перехода от старого базиса $\mathbf{e}^i$ к новому $\mathbf{e}^{i'}$ и формулы обратного перехода.

Преобразования (6.1) взаимно обратны, поэтому и матрицы $(b_{i'}^i)$ и $(b_i^{i'})$ взаимно обратны. Действительно, умножив первое из равенств (6.1) скалярно на $\mathbf{e}^{j'}$, а второе из равенств (6.1) на $\mathbf{e}^j$, получим, учитывая биортогональность базисов:

$$\delta_{i'}^{j'} = b_{i'}^i(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}^{j'}), \quad \delta_i^j = b_i^{i'}(\mathbf{e}_{i'}, \mathbf{e}^j).$$

Однако, как следует из тех же формул (6.1),

$$(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}^{j'}) = b_i^{i'} \delta_{i'}^{j'} = b_i^{j'}, \quad (\mathbf{e}_{i'}, \mathbf{e}^j) = b_{i'}^i \delta_i^j = b_{i'}^j. \quad (6.3)$$

Таким образом,

$$\delta_{i'}^{j'} = b_{i'}^i b_i^{j'}, \quad \delta_i^j = b_i^{i'} b_{i'}^j,$$

т. е. матрицы $(b_{i'}^i)$ и $(b_i^{i'})$ взаимно обратны.

Аналогично устанавливается, что и матрицы $(\tilde{b}_{i'}^{j'})$ и $(\tilde{b}_i^{j'})$ взаимно обратны.

Справедливо следующее утверждение о связи между матрицами $(b_{i'}^i)$ и $(\tilde{b}_{i'}^{j'})$, $(b_i^{i'})$ и $(\tilde{b}_i^{j'})$.

Утверждение. Матрица $(b_{i'}^i)$ совпадает с матрицей $(\tilde{b}_{i'}^{ii})$ а матрица $(b_i^{i'})$ совпадает с матрицей $(\tilde{b}_i^{ii})$.

Доказательство. Очевидно, в силу взаимной обратности матриц $(b_{i'}^i)$ и $(b_i^{i'})$ и матриц $(\tilde{b}_{i'}^{j'})$ и $(\tilde{b}_i^{j'})$, достаточно доказать, что совпадают $(b_{i'}^i)$ и $(\tilde{b}_{i'}^{ii})$.

В силу (6.3) получим, что

$$b_{i'}^i = (\mathbf{e}_{i'}, \mathbf{e}^i). \quad (6.4)$$

Аналогично с помощью (6.2) получим, что

$$\tilde{b}_{i'}^i = (\mathbf{e}_{i'}, \mathbf{e}^i). \quad (6.4')$$

Правые части соотношений (6.4) и (6.4') равны, поэтому $b_{i'}^i = \tilde{b}_{i'}^i$, что и требовалось.

Следствие. Для перехода от базисов $\mathbf{e}_i, \mathbf{e}^i$ к базисам $\mathbf{e}_{i'}, \mathbf{e}^{i'}$ достаточно знать только матрицу $(b_{i'}^i)$ перехода от базиса $\mathbf{e}_i$ к базису $\mathbf{e}_{i'}$ (матрица $(b_i^{i'})$ является обратной к $(b_{i'}^i)$, и вычисляется по ней).

Таким образом, мы приходим к следующим формулам преобразования базисов:

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_{i'} &= b_{i'}^i \mathbf{e}_i, \quad \mathbf{e}_i = b_i^{i'} \mathbf{e}_{i'}, \\ \mathbf{e}^{i'} &= b_i^{i'} \mathbf{e}^i, \quad \mathbf{e}^i = b_{i'}^i \mathbf{e}^{i'}. \end{aligned} \quad (6.5)$$

Выведем теперь формулы преобразования координат вектора при переходе к новому базису. Сначала проведем следующие рассуждения.

Пусть $\mathbf{e}_i$ и $\mathbf{e}^j$ — биортогональные базисы, $\mathbf{a}$ — произвольный вектор. Тогда разложения вектора $\mathbf{a}$ имеют вид

$$\mathbf{a} = a^i \mathbf{e}_i, \quad \mathbf{a} = a_i \mathbf{e}^i. \quad (6.6)$$

Биортогональный базис дает очень удобный способ вычисления коэффициентов a^i и a_i в разложении (6.6). Действительно, умножая первое из соотношений (6.6) скалярно на $\mathbf{e}^j$, а второе — на $\mathbf{e}_j$, получаем

$$a^j = (\mathbf{a}, \mathbf{e}^j), \quad a_j = (\mathbf{a}, \mathbf{e}_j), \quad j = 1, 2, \dots, n. \quad (6.7)$$

Следовательно, формулы (6.6) с учетом соотношений (6.7) принимают вид

$$\mathbf{a} = (\mathbf{a}, \mathbf{e}^i) \mathbf{e}_i, \quad \mathbf{a} = (\mathbf{a}, \mathbf{e}_i) \mathbf{e}^i. \quad (6.8)$$

В частности, представляя в первое равенство (6.8) вместо вектора $\mathbf{a}$ вектор $\mathbf{e}^j$, а во второе равенство — вектор $\mathbf{e}_j$, получим

$$\mathbf{e}^j = (\mathbf{e}^j, \mathbf{e}^i) \mathbf{e}_i = g^{ji} \mathbf{e}_i, \quad (6.9)$$

$$\mathbf{e}_j = (\mathbf{e}_j, \mathbf{e}_i) \mathbf{e}^i = g_{ji} \mathbf{e}^i,$$

где

$$g^{ji} = (\mathbf{e}^j, \mathbf{e}^i), \quad g_{ji} = (\mathbf{e}_j, \mathbf{e}_i).$$

Если умножить первое из соотношений (6.9) скалярно на $\mathbf{e}_k$, а второе — на $\mathbf{e}^k$, то

$$g^{ji} g_{ik} = \delta_k^j, \quad g_{ji} g^{ik} = \delta_j^k, \quad j, k = 1, 2, \dots, n,$$

т. е. матрицы (g^{ji}) и (g_{ji}) взаимно обратны и по своему построению в силу симметрии скалярного произведения симметричны.

Выведем формулы преобразования координат вектора при переходе к новому базису. Если $\mathbf{e}_i$ — старый базис, а $\mathbf{e}_{i'}$ — новый, $\mathbf{e}^i$ и $\mathbf{e}^{i'}$ — биортогональные к ним базисы и если

$$\mathbf{a} = a_{i'} \mathbf{e}^{i'},$$

то, как мы знаем, из формул (6.7) следует, что

$$a_{i'} = (\mathbf{a}, \mathbf{e}_{i'}).$$

Подставляя в правую часть этого соотношения вместо $\mathbf{e}_{i'}$ его выражение из (6.5), получим

$$a_{i'} = (\mathbf{a}, b_{i'}^i \mathbf{e}_i) = b_{i'}^i (\mathbf{a}, \mathbf{e}_i) = b_{i'}^i a_i.$$

Итак, координаты $a_{i'}$ вектора $\mathbf{a}$, разложенного по базису $\mathbf{e}^{i'}$ (биортогональному к новому базису $\mathbf{e}_{i'}$), в новом базисе $\mathbf{e}^{i'}$ имеют вид

$$a_{i'} = b_{i'}^i a_i, \quad (6.10)$$

здесь $(b_{i'}^i)$ — матрица прямого перехода от старого базиса $\mathbf{e}_i$ к новому базису $\mathbf{e}_{i'}$, a_i — координаты вектора $\mathbf{a}$ в разложении по биортогональному базису $\mathbf{e}^i$:

$$\mathbf{a} = a_i \mathbf{e}^i.$$

Таким образом, координаты a_i при переходе от старого базиса $\mathbf{e}_i$ к новому $\mathbf{e}_{i'}$ преобразуются с помощью $(b_{i'}^i)$ — матрицы перехода от старого базиса к новому по формуле (6.10). Поэтому говорят, что координаты a_i преобразуются «согласованно», и эти координаты называются ковариантными (что означает «согласованно изменяющийся») координатами вектора $\mathbf{a}$.

Если теперь согласно формулам (6.7) записать

$$\mathbf{a}^{i'} = (\mathbf{a}, \mathbf{e}^{i'})$$

и подставить сюда вместо $\mathbf{e}^{i'}$ его выражение из (6.5), то

$$\mathbf{a}^{i'} = (\mathbf{a}, b_{i'}^i \mathbf{e}^i) = b_{i'}^i (\mathbf{a}, \mathbf{e}^i) = b_{i'}^i a^i. \quad (6.11)$$

Из формулы (6.11) видно, что при переходе к новому базису координаты a^i в разложении вектора $\mathbf{a}$ по старому базису $\mathbf{e}_i$ ($\mathbf{a} = a^i \mathbf{e}_i$) преобразуются с помощью матрицы $(b_{i'}^i)$ перехода от нового базиса к старому.

Поэтому говорят, что координаты a^i преобразуются «несогласованно», и эти координаты называются контравариантными (что означает «противоположно изменяющийся») координатами вектора $\mathbf{a}$.

4. Инварианты линейного оператора. Дивергенция и ротор. Всюду в дальнейшем мы будем предполагать, что у нас рассматривается трехмерное пространство E^3 . Рассмотрим произвольный линейный оператор A в этом пространстве. Напомним, что оператор A называется линейным, если для любых векторов $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$ и любых вещественных чисел λ и μ справедливо равенство

$$A(\lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b}) = \lambda A\mathbf{a} + \mu A\mathbf{b}.$$

Пусть $\mathbf{e}_i$ и $\mathbf{e}^i$ — биортогональные базисы в E^3 . Ниже нам понадобятся два равенства, справедливые для линейного оператора A :

$$1) (\mathbf{e}_i, A\mathbf{e}^i) = (\mathbf{e}^i, A\mathbf{e}_i) \quad ^5);$$

⁵⁾ Напомним, что если в выражении у сомножителей встречаются повторя-

$$2) \mathbf{e}_i \times A \mathbf{e}^i = \mathbf{e}^i \times A \mathbf{e}_i$$

($\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ означает векторное произведение векторов $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$).

Докажем эти соотношения. Согласно формулам (6.9) получим $\mathbf{e}^i = g^{ik} \mathbf{e}_k$, $\mathbf{e}_i = g_{ip} \mathbf{e}^p$. Поэтому

$$\begin{aligned} (\mathbf{e}_i, A \mathbf{e}^i) &= (g_{ip} \mathbf{e}^p, A g^{ik} \mathbf{e}_k) = g_{ip} g^{ik} (\mathbf{e}^p, A \mathbf{e}_k) = \\ &= \delta_p^k (\mathbf{e}^p, A \mathbf{e}_k) = (\mathbf{e}^k, A \mathbf{e}_k) = (\mathbf{e}^i, A \mathbf{e}_i). \end{aligned}$$

Выше мы воспользовались тем, что матрицы (g_{ip}) и (g^{ik}) взаимно обратны и симметричны. Соотношение 1) доказано. Перейдем к доказательству соотношения 2). Используя те же равенства для $\mathbf{e}^i$ и $\mathbf{e}_i$ и свойства матриц (g_{ip}) и (g^{ik}) , получим

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_j \times A \mathbf{e}^i &= g_{jp} \mathbf{e}^p \times A g^{ik} \mathbf{e}_k = g_{jp} g^{ik} \mathbf{e}^p \times A \mathbf{e}_k = \\ &= \delta_p^k \mathbf{e}^p \times A \mathbf{e}_k = \mathbf{e}^k \times A \mathbf{e}_k = \mathbf{e}^i \times A \mathbf{e}_i. \end{aligned}$$

Некоторое выражение называется инвариантом (или инвариантным), если оно не меняется при преобразовании базиса пространства. Например, инвариантом является скалярное произведение двух векторов, значение скалярной функции в данной точке пространства.

Рассмотрим некоторые величины, связанные с оператором A , являющиеся инвариантами. Пусть $\mathbf{e}_i$ — базис пространства E^3 , $\mathbf{e}^i$ — биортогональный базис.

Утверждение 1. Величина $(\mathbf{e}_i, A \mathbf{e}^i)$ (или ей равная $(\mathbf{e}^i, A \mathbf{e}_i)$) — инвариант.

Доказательство. Необходимо показать, что если перейти к другому базису $\mathbf{e}_i'$ ($\mathbf{e}^i'$ — биортогональный базис к $\mathbf{e}_i'$), то будет выполнено равенство

$$(\mathbf{e}_i, A \mathbf{e}^i) = (\mathbf{e}_i', A \mathbf{e}^i').$$

Запишем, используя формулы (6.5):

$$\mathbf{e}_i = b_i^{i'} \mathbf{e}_{i'}, \quad \mathbf{e}^i = b_p^i \mathbf{e}^{p'},$$

где $(b_i^{i'})$ — матрица перехода от базиса $\mathbf{e}_{i'}$ к базису $\mathbf{e}_i$, (b_p^i) — обратная ей матрица. Тогда

$$\begin{aligned} (\mathbf{e}_i, A \mathbf{e}^i) &= b_i^{i'} b_p^i (\mathbf{e}_{i'}, A \mathbf{e}^{p'}) = \\ &= \delta_{i'}^{p'} (\mathbf{e}_{i'}, A \mathbf{e}^{p'}) = (\mathbf{e}_{i'}, A \mathbf{e}^{i'}). \end{aligned}$$

Сравнивая первый и последний члены в этой цепочке равенств, получаем доказательство утверждения.

Ющиеся индексы, один из которых вверху, а другой — внизу, то суммирование проводится по этим индексам.

Определение 1. *Инвариант $(\mathbf{e}_i, A\mathbf{e}^i)$ (или $(\mathbf{e}^i, A\mathbf{e}_i)$) линейного оператора A называется дивергенцией этого оператора и обозначается $\operatorname{div} A$.*

Таким образом,

$$\operatorname{div} A = (\mathbf{e}_i, A\mathbf{e}^i) = (\mathbf{e}^i, A\mathbf{e}_i).$$

Замечание 1. Всякий линейный оператор в данном базисе $\mathbf{e}_i$ однозначно может быть задан с помощью матрицы, называемой матрицей линейного оператора. Для построения этой матрицы достаточно задать оператор на базисных векторах $\mathbf{e}_i$, т. е. задать векторы $A\mathbf{e}_i$. Разлагая эти векторы $A\mathbf{e}_i$ по базису $\mathbf{e}_j$, получаем

$$A\mathbf{e}_i = a_i^k \mathbf{e}_k \text{ и } (\mathbf{e}^j, A\mathbf{e}_i) = a_i^k (\mathbf{e}^j, \mathbf{e}_k) = a_i^j. \quad (6.12)$$

Матрица (a_i^k) и есть матрица линейного оператора A в базисе $\mathbf{e}_i$.

Теперь дивергенция оператора A может быть выражена через элементы матрицы (a_i^k) :

$$\operatorname{div} A = (\mathbf{e}_i, A\mathbf{e}^i) = (\mathbf{e}^i, A\mathbf{e}_i) = a_1^1 + a_2^2 + a_3^3.$$

Замечание 2. Величина $a_1^1 + a_2^2 + a_3^3$ в линейной алгебре называется матричным следом оператора A . Там же доказывается, что этот матричный след равен сумме собственных чисел оператора A с учетом их кратности (спектральному следу оператора), т. е.

$$a_1^1 + a_2^2 + a_3^3 = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3,$$

где $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ — занумерованные с учетом их кратности собственные числа оператора A .

Ясно, что сумма $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3$ не зависит от выбора базиса пространства. Следовательно, и $\operatorname{div} A$ не зависит от выбора базиса, т. е. является инвариантом. Это еще одно доказательство утверждения об инвариантности дивергенции.

Утверждение 2. *Величина $\mathbf{e}_i \times A\mathbf{e}^i$ (или ей равная $\mathbf{e}^i \times A\mathbf{e}_i$) — инвариант.*

Доказательство. Пусть $\mathbf{e}_i$ — новый базис ($\mathbf{e}^{i'}$ — биортогональный базис к $\mathbf{e}_i$). Запишем согласно формулам (6.5):

$$\mathbf{e}_i = b_i^{i'} \mathbf{e}_{i'}, \quad \mathbf{e}^i = b_p^{i'} \mathbf{e}^{p'}.$$

Подставив эти величины в выражение $\mathbf{e}_i \times A\mathbf{e}^i$, получим

$$\mathbf{e}_i \times A\mathbf{e}^i = b_i^{i'} b_p^{i'} \mathbf{e}_{i'} \times A\mathbf{e}^{p'} = \delta_p^{i'} \mathbf{e}_i \times A\mathbf{e}^{p'} = \mathbf{e}_i \times A\mathbf{e}^{i'}.$$

Таким образом, инвариантность величины $\mathbf{e}_i \times A\mathbf{e}^i$ доказана.

Определение 2. *Инвариант $\mathbf{e}_i \times A\mathbf{e}^i$ (или $\mathbf{e}^i \times A\mathbf{e}_i$) линейного оператора A называется ротором этого оператора и обозначается $\operatorname{rot} A$.*

Таким образом,

$$\begin{aligned}\operatorname{rot} A &= \mathbf{e}_i \times A\mathbf{e}^i = \mathbf{e}^i \times A\mathbf{e}_i = \mathbf{e}_1 \times A\mathbf{e}^1 + \mathbf{e}_2 \times A\mathbf{e}^2 + \\ &+ \mathbf{e}_3 \times A\mathbf{e}^3 = \mathbf{e}^1 \times A\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}^2 \times A\mathbf{e}_2 + \mathbf{e}^3 \times A\mathbf{e}_3.\end{aligned}$$

5. Выражения для дивергенции и ротора линейного оператора в ортонормированном базисе. Пусть в пространстве E^3 выбран ортонормированный базис $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$. В этом случае, как уже говорилось, биортогональный базис совпадает с самим собой (см. п. 2). Согласно формулам (6.12) получаем

$$\begin{aligned}a_1^1 &= (\mathbf{i}, A\mathbf{i}), \quad a_2^1 = (\mathbf{i}, A\mathbf{j}), \quad a_3^1 = (\mathbf{i}, A\mathbf{k}), \\ a_1^2 &= (\mathbf{j}, A\mathbf{i}), \quad a_2^2 = (\mathbf{j}, A\mathbf{j}), \quad a_3^2 = (\mathbf{j}, A\mathbf{k}), \\ a_1^3 &= (\mathbf{k}, A\mathbf{i}), \quad a_2^3 = (\mathbf{k}, A\mathbf{j}), \quad a_3^3 = (\mathbf{k}, A\mathbf{k}).\end{aligned}\tag{6.13}$$

Поэтому

$$\operatorname{div} A = a_1^1 + a_2^2 + a_3^3 = (\mathbf{i}, A\mathbf{i}) + (\mathbf{j}, A\mathbf{j}) + (\mathbf{k}, A\mathbf{k}).\tag{6.14}$$

Найдем выражение для $\operatorname{rot} A$. Имеем

$$\operatorname{rot} A = \mathbf{i} \times A\mathbf{i} + \mathbf{j} \times A\mathbf{j} + \mathbf{k} \times A\mathbf{k}.$$

Осталось вычислить векторные произведения слагаемых справа через элементы матрицы оператора A . Запишем по формуле (6.12):

$$A\mathbf{i} = a_1^1\mathbf{i} + a_1^2\mathbf{j} + a_1^3\mathbf{k}.$$

Поэтому

$$\begin{aligned}\mathbf{i} \times A\mathbf{i} &= a_1^1\mathbf{i} \times \mathbf{i} + a_1^2\mathbf{i} \times \mathbf{j} + a_1^3\mathbf{i} \times \mathbf{k} = \\ &= -a_1^3\mathbf{j} + a_1^2\mathbf{k}.\end{aligned}$$

Аналогично

$$\mathbf{j} \times A\mathbf{j} = a_2^3\mathbf{i} - a_2^1\mathbf{k}, \quad \mathbf{k} \times A\mathbf{k} = -a_3^2\mathbf{i} + a_3^1\mathbf{j}.$$

Поэтому

$$\operatorname{rot} A = (a_2^3 - a_3^2)\mathbf{i} + (a_3^1 - a_1^3)\mathbf{j} + (a_1^2 - a_2^1)\mathbf{k}.\tag{6.15}$$

§ 2. СКАЛЯРНЫЕ И ВЕКТОРНЫЕ ПОЛЯ. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ ВЕКТОРНОГО АНАЛИЗА

1. Скалярные и векторные поля. В теории поля рассматриваются функции, которые каждой точке M фиксированной области D сопоставляют некоторый специальный объект $a(M)$, называемый тензором. В этом случае говорят, что в области D задано тензорное поле. Мы будем изучать только два простейших частных случая тензорного поля, а именно скалярное и векторное поля.

Будем говорить, что в области D задано скалярное поле, если каждой точке M этой области сопоставлено по некоторому закону определенное число $u(M)$. Таким образом, понятия скалярного поля и скалярной функции, определенной в области D , совпадают.

Аналогично говорят, что в области D задано векторное поле, если каждой точке M этой области сопоставлен по некоторому закону вектор $\mathbf{a}(M)$. Таким образом, понятия векторного поля и векторной функции, определенной в области D , совпадают.

Пусть, например, $\mathbf{E}(M)$ — напряженность электрического поля, созданного единичным отрицательным зарядом, помещенным в начало координат трехмерного пространства E^3 . Тогда в точке $M(x, y, z)$ вектор $\mathbf{E}(M)$ имеет, как известно, длину $1/\rho$, где $\rho = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}$, и направлен от точки M к началу координат. Получаем следующую формулу для задания данного векторного поля $\mathbf{E}(M)$:

$$\mathbf{E}(M) = \left\{ -\frac{x}{\rho^3}, -\frac{y}{\rho^3}, -\frac{z}{\rho^3} \right\}.$$

Другими примерами скалярного и векторного полей могут быть скалярное поле температур внутри нагретого тела, векторное поле скоростей установившегося потока жидкости и т. д.

Приведем еще ряд примеров скалярных и векторных полей, играющих важную роль в анализе и физике. Для этого понадобится изучить понятие дифференцируемости скалярного и векторного полей.

Поскольку скалярное поле — это числовая функция, заданная в области D , то понятие дифференцируемости скалярного поля (этой числовой функции) мы уже знаем (см. определение п. 2 § 4 гл. 12 ч. 1).

Напомним это определение, заменяя слово «функция» на слова «скалярное поле». Пусть задано скалярное поле $u = f(x, y, z)$ в области D из E^3 .

Определение 1. Скалярное поле $u = f(x, y, z) = f(M)$ называется дифференцируемым в точке $M(x, y, z)$ области D , если его полное приращение $\Delta u(M)$ в этой точке может быть представлено в виде

$$\Delta u(M) = A_1 \Delta x + A_2 \Delta y + A_3 \Delta z + \alpha_1 \Delta x + \alpha_2 \Delta y + \alpha_3 \Delta z,$$

где A_1, A_2, A_3 — некоторые не зависящие от $\Delta x, \Delta y, \Delta z$ числа, а $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ — бесконечно малые при $\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0, \Delta z \rightarrow 0$ функции, равные нулю при $\Delta x = 0, \Delta y = 0, \Delta z = 0$.

Условие дифференцируемости скалярного поля $u = f(x, y, z)$ (как показано в п. 2 § 4 гл. 12 ч. 1) может быть записано в виде

$$\Delta u(M) = A_1 \Delta x + A_2 \Delta y + A_3 \Delta z + o(\rho),$$

где $\rho = (\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2)^{1/2}$, причем это представление единственно.

Эту формулу можно переписать в более компактном виде:

$$\Delta u(M) = (A, h) + o(\|h\|), \quad (6.16)$$

где (A, h) — скалярное произведение векторов

$$A = \{A_1, A_2, A_3\}, \quad h = \{\Delta x, \Delta y, \Delta z\}, \quad \|h\| = \rho.$$

Таким образом, можно дать следующее

Определение 1*. Скалярное поле $u(M)$ дифференцируемо в точке M , если в этой точке для полного приращения справедливо соотношение (6.16). Скалярное поле $u(M)$ дифференцируемо в области D , если оно дифференцируемо в каждой точке этой области.

Напомним (см. п. 8 § 4 гл. 12 ч. 1), что условие дифференцируемости (6.16) может быть переписано в виде

$$\Delta u(M) = (\text{grad } u, h) + o(\|h\|), \quad (6.17)$$

где вектор $\text{grad } u(M) = \left\{ \frac{\partial u(M)}{\partial x}, \frac{\partial u(M)}{\partial y}, \frac{\partial u(M)}{\partial z} \right\}$.

Формула (6.17) приводит нас еще к одному примеру векторного поля, а именно к полю градиента дифференцируемого в области D скалярного поля $u(M)$. Определение градиента не зависит от выбора системы координат, и поэтому он является инвариантом⁶⁾.

Согласно рассмотрениям п. 8 § 4 гл. 12 ч. 1 в случае дифференцируемости поля $u(M)$ можно ввести производную $u(M)$ по направлению вектора e :

⁶⁾ Своим появлением на свет понятие градиента обязано выдающемуся шотландскому физiku, создателю математической теории электромагнитного поля Джеймсу Клерку Максвеллу (1831—1879) и происходит от латинского слова *gradior*, означающего «расти». Как мы знаем из ч. 1, главное свойство градиента состоит в том, что он определяет направление наискорейшего спуска. Поэтому Максвелл собирался сначала назвать этот вектор словом *slope* — «склон». Ирландский математик и механик Вильям Роуэн Гамильтон (1805—1865) придумал для этого вектора специальное обозначение ∇ — перевернутую греческую букву Δ («дельта»). Таким образом, если i, j, k — фиксированный ортонормированный базис, то

$$\begin{aligned} \text{grad } u &= \nabla u = \frac{\partial u}{\partial x} i + \frac{\partial u}{\partial y} j + \frac{\partial u}{\partial z} k, \\ \nabla &= i \frac{\partial}{\partial x} + j \frac{\partial}{\partial y} + k \frac{\partial}{\partial z}. \end{aligned}$$

Сначала название значка ∇ было «атлед» — прочитанное наоборот слово дельта. Затем английские ученые (О. Хевисайд, Р. Смит) чаще стали называть этот значок словом «набла» (из-за сходства с остоявом древнееврейского музыкального инструмента набы). Набла — очень удобное в физике обозначение, многие формулы с его применением сильно упрощаются. Сам Максвелл посвятил набле специальную оду в восьми частях.

$$\frac{\partial u}{\partial \mathbf{e}} = (\mathbf{e}, \operatorname{grad} u). \quad (6.18)$$

Производная по направлению задает, очевидно, некоторое новое скалярное поле в области D .

Перейдем к изучению дифференцируемого векторного поля. Понятие дифференцируемости векторного поля дается в полной аналогии с понятием дифференцируемости скалярного поля, и это понятие было нами дано в дополнении 2 к гл. 12 ч. 1.

Пусть в области D пространства E^3 задано векторное поле $\mathbf{a}(M)$ (векторная функция $\mathbf{a}(M)$ точек M , принадлежащих D). Напомним, что $\mathbf{a}(M)$ каждой точке $M(x, y, z)$ ставит в соответствие вектор $\mathbf{a}(M)$.

Определение 2. Векторное поле $\mathbf{a}(M)$ называется дифференцируемым в точке M области D , если его полное приращение $\Delta \mathbf{a}(M)$ представляется в виде

$$\Delta \mathbf{a}(M) = A\mathbf{h} + \mathbf{o}(\|\mathbf{h}\|), \quad (6.19)$$

где A — некоторый линейный оператор в E^3 ,

$$\mathbf{h} = \{\Delta x, \Delta y, \Delta z\}, \quad \|\mathbf{h}\| = (\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2)^{1/2},$$

$\mathbf{o}(\|\mathbf{h}\|)$ — вектор, длина которого стремится к нулю при $\|\mathbf{h}\| \rightarrow 0$.

Утверждение. Если векторное поле дифференцируемо, то представление (6.19) единственно.

Действительно (см. также дополнение 2 к гл. 12 ч. 1), если бы было два представления вида (6.19), т. е.

$$\Delta \mathbf{a}(M) = A\mathbf{h} + \mathbf{o}_1(\|\mathbf{h}\|), \quad \Delta \mathbf{a}(M) = B\mathbf{h} + \mathbf{o}_2(\|\mathbf{h}\|),$$

то

$$(A - B)\mathbf{h} = \mathbf{o}(\|\mathbf{h}\|),$$

где $\mathbf{o}(\|\mathbf{h}\|) = \mathbf{o}_1(\|\mathbf{h}\|) - \mathbf{o}_2(\|\mathbf{h}\|)$.

Разделив на $\|\mathbf{h}\|$ обе части полученного равенства, получим

$$(A - B)\mathbf{e} = \frac{\mathbf{o}(\|\mathbf{h}\|)}{\|\mathbf{h}\|},$$

где $\mathbf{e} = \frac{\mathbf{h}}{\|\mathbf{h}\|}$ — вектор единичной длины. Справа стоит бесконечно малый вектор (его длина стремится к нулю при $\|\mathbf{h}\| \rightarrow 0$), следовательно, для любого единичного вектора $\mathbf{e}$ величина слева равна нулю:

$$(A - B)\mathbf{e} = 0.$$

Но если два линейных оператора A и B совпадают на единичной сфере, то они равны, очевидно, на любом векторе, т. е. совпадают всюду. Следовательно, $A = B$.

Так же, как и в случае скалярного поля, векторное поле дифференцируемо в области D , если оно дифференцируемо в каждой точке области D .

Как и в случае скалярного поля, возникает вопрос об определении производной по направлению для векторного поля $\mathbf{a}(M)$.

Пусть M — точка области D , $\mathbf{e}$ — единичный вектор с координатами $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$, определяющий некоторое направление. Пусть M' — любая точка из D , отличная от M и такая, что вектор $\overline{MM'}$ коллинеарен вектору $\mathbf{e}$. Обозначим расстояние между M и M' через ρ .

Определение 3. Производной векторного поля $\mathbf{a}(M)$ в точке M по направлению $\mathbf{e}$ называется предел отношения

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{a}(M)}{\rho} = \frac{d\mathbf{a}(M)}{d\mathbf{e}} = \frac{d\mathbf{a}}{d\mathbf{e}}$$

(в случае, если этот предел существует). Здесь $\Delta \mathbf{a}(M) = \mathbf{a}(M') - \mathbf{a}(M)$.

Утверждение. Пусть векторное поле $\mathbf{a}(M)$ дифференцируемо, A — линейный оператор, определяемый из соотношения дифференцируемости (т. е. из соотношения $\Delta \mathbf{a}(M) = A\mathbf{h} + o(\|\mathbf{h}\|)$). Тогда производная $\frac{d\mathbf{a}}{d\mathbf{e}}$ поля в этой точке M по любому направлению $\mathbf{e}$ существует и определяется равенством

$$\frac{d\mathbf{a}(M)}{d\mathbf{e}} = A\mathbf{e}. \quad (6.20)$$

Интересно сравнить эту формулу с формулой (6.18). В формуле (6.18) справа также стоит результат действия оператора $A = (A_1, A_2, A_3)$ на вектор $\mathbf{e}$. Результат этого действия и есть скалярное произведение градиента поля и вектора $\mathbf{e}$.

Доказательство. Пусть $\mathbf{e}$ — фиксированный вектор. Выберем точку M' так, чтобы $\mathbf{h} = \rho\mathbf{e}$. Тогда согласно (6.19) получим

$$\Delta \mathbf{a}(M) = \rho A\mathbf{e} + o(\|\mathbf{h}\|).$$

Поскольку $\|\mathbf{h}\| = \rho$, то

$$\frac{\Delta \mathbf{a}(M)}{\rho} = A\mathbf{e} + \frac{o(\rho)}{\rho}.$$

Переходя в этом соотношении к пределу при $\rho \rightarrow 0$, получаем формулу (6.20), т. е. то, что и требовалось доказать.

Вернемся снова к рассмотрению формулы (6.19):

$$\Delta \mathbf{a}(M) = A\mathbf{h} + o(\|\mathbf{h}\|).$$

Здесь A — линейный оператор, действующий на вектор $\mathbf{h}$ из E^3 . Как мы знаем, в фиксированном базисе всякий линейный опера-

тор определяется своей матрицей. Найдем матрицу линейного оператора A в ортонормированном базисе i, j, k , с которым связана декартова прямоугольная система координат $Oxyz$. Пусть в этом базисе вектор $a(M)$ имеет координаты P, Q, R . Согласно формулам (6.20)

$$\frac{\partial a}{\partial i} = \frac{\partial a}{\partial x} = Ai, \quad \frac{\partial a}{\partial j} = \frac{\partial a}{\partial y} = Aj, \quad \frac{\partial a}{\partial k} = \frac{\partial a}{\partial z} = Ak. \quad (6.21)$$

По формулам (6.13) вычисляем элементы матрицы A оператора A :

$$A = \begin{pmatrix} a_1^1 & a_2^1 & a_3^1 \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 \\ a_1^3 & a_2^3 & a_3^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial P}{\partial x} & \frac{\partial P}{\partial y} & \frac{\partial P}{\partial z} \\ \frac{\partial Q}{\partial x} & \frac{\partial Q}{\partial y} & \frac{\partial Q}{\partial z} \\ \frac{\partial R}{\partial x} & \frac{\partial R}{\partial y} & \frac{\partial R}{\partial z} \end{pmatrix}. \quad (6.22)$$

2. Дивергенция, ротор и производная по направлению векторного поля. Пусть $a(M)$ — дифференцируемое в области D векторное поле. Тогда согласно (6.19) $\Delta a(M) = Ah + o(\|h\|)$, где A — линейный оператор, зависящий от точки M , вектор h — приращение аргумента $a(M)$, $o(\|h\|)$ — вектор, стремящийся к нулю при $\|h\| \rightarrow 0$.

Определение 1. Дивергенцией векторного поля $a(M)$ в точке M называется дивергенция линейного оператора A из условия дифференцируемости (6.19):

$$\operatorname{div} a(M) = \operatorname{div} A.$$

Определение 2. Ротором векторного поля $a(M)$ в точке M называется ротор линейного оператора A из условия дифференцируемости (6.19):

$$\operatorname{rot} a(M) = \operatorname{rot} A.$$

Заметим, что поскольку векторное поле дифференцируемо во всей области D , то $\operatorname{div} a(M)$ и $\operatorname{rot} a(M)$ определены в каждой точке M области D . Эти величины по своему определению инвариантны, т. е. не зависят от выбора базиса. Поэтому $\operatorname{div} a(M)$ представляет собой скалярное поле, а $\operatorname{rot} a(M)$ — векторное поле.

Выберем ортонормированный базис i, j, k и свяжем с ним декартову прямоугольную систему координат $Oxyz$. Пусть координаты поля $a(M)$ в базисе i, j, k есть P, Q, R . Матрица оператора A в этом базисе нами уже найдена (см. формулу (6.22)). Поскольку $\operatorname{div} a(M) = \operatorname{div} A$, по формуле (6.14) сразу получаем

$$\begin{aligned} \operatorname{div} a(M) &= (i, Ai) + (j, Aj) + (k, Ak) = \\ &= a_1^1 + a_2^2 + a_3^3 = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = (\nabla, a(M)), \end{aligned} \quad (6.23)$$

где

$$\nabla = \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z}, \quad \mathbf{a}(M) = \mathbf{a} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}.$$

Далее, так как $\operatorname{rot} \mathbf{a}(M) = \operatorname{rot} A$, то по формулам (6.15) и (6.22) получим

$$\operatorname{rot} \mathbf{a}(M) = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \quad (6.24)$$

$$+ \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \mathbf{k} = \nabla \times \mathbf{a} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}.$$

Написанный определитель — символическая запись ротора, удобная для запоминания.

Вычислим производную векторного поля $\mathbf{a}(M)$ по направлению $\mathbf{e}$, воспользовавшись формулой (6.20). Поскольку единичный вектор $\mathbf{e}$ имеет координаты $\{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$, то

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathbf{a}(M)}{\partial \mathbf{e}} &= A\mathbf{e} = A(\mathbf{i} \cos \alpha + \mathbf{j} \cos \beta + \mathbf{k} \cos \gamma) = \\ &= \cos \alpha (A\mathbf{i}) + \cos \beta (A\mathbf{j}) + \cos \gamma (A\mathbf{k}). \end{aligned}$$

Далее, по формулам (6.21)

$$A\mathbf{i} = \frac{\partial \mathbf{a}}{\partial x}, \quad A\mathbf{j} = \frac{\partial \mathbf{a}}{\partial y}, \quad A\mathbf{k} = \frac{\partial \mathbf{a}}{\partial z}.$$

Поэтому

$$\frac{\partial \mathbf{a}(M)}{\partial \mathbf{e}} = \cos \alpha \frac{\partial \mathbf{a}}{\partial x} + \cos \beta \frac{\partial \mathbf{a}}{\partial y} + \cos \gamma \frac{\partial \mathbf{a}}{\partial z}.$$

Учитывая, что $\mathbf{a} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}$, запишем еще одно выражение для производной по направлению:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathbf{a}(M)}{\partial \mathbf{e}} &= \left(\frac{\partial P}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial P}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial P}{\partial z} \cos \gamma \right) \mathbf{i} + \\ &+ \left(\frac{\partial Q}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial Q}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial Q}{\partial z} \cos \gamma \right) \mathbf{j} + \\ &+ \left(\frac{\partial R}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial R}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial R}{\partial z} \cos \gamma \right) \mathbf{k}. \end{aligned}$$

3. Некоторые другие формулы векторного анализа. Допустим, что в области D заданы скалярное поле $u(M)$ и векторное поле $\mathbf{a}(M)$, причем все частные производные второго порядка функций

$u(M)$ и $a(M)$ непрерывны в области D . Тогда $\operatorname{div} a(M)$ — дифференцируемое скалярное поле, $\operatorname{grad} u$ и $\operatorname{rot} a(M)$ — дифференцируемые векторные поля. Следовательно, можно повторно применять дифференциальные операторы grad , div , rot , и имеют смысл следующие операции:

$$\operatorname{rot} \operatorname{grad} u, \operatorname{div} \operatorname{grad} u, \operatorname{grad} \operatorname{div} a, \operatorname{div} \operatorname{rot} a, \operatorname{rot} \operatorname{rot} a.$$

Пусть i, j, k — фиксированный ортонормированный базис, с которым связана декартова прямоугольная система координат $Oxyz$.

Утверждение. Имеют место следующие пять соотношений:

$$\operatorname{rot} \operatorname{grad} u = \nabla \times \nabla u = 0;$$

$$\operatorname{div} \operatorname{grad} u = (\nabla, \nabla u) = \nabla u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2};$$

$$\begin{aligned} \operatorname{grad} \operatorname{div} a = \nabla (\nabla, a) = & \left(\frac{\partial^2 P}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 Q}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 R}{\partial x \partial z} \right) i + \\ & + \left(\frac{\partial^2 P}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 Q}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 R}{\partial y \partial z} \right) j + \left(\frac{\partial^2 P}{\partial x \partial z} + \frac{\partial^2 Q}{\partial y \partial z} + \frac{\partial^2 R}{\partial z^2} \right) k; \end{aligned}$$

$$\operatorname{div} \operatorname{rot} a = (\nabla, \nabla \times a) = 0;$$

$$\operatorname{rot} \operatorname{rot} a = \nabla \times (\nabla \times a) = \operatorname{grad} \operatorname{div} a - \Delta a,$$

где

$$\nabla = i \frac{\partial}{\partial x} + j \frac{\partial}{\partial y} + k \frac{\partial}{\partial z}.$$

Доказательство. Все эти формулы доказываются по одной схеме: последовательно применяются дифференциальные операторы к скалярному или векторному полю. Докажем, например, первое равенство. Вектор $\operatorname{grad} u = \nabla u$ имеет координаты $\left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right)$, поэтому для $\operatorname{rot} \operatorname{grad} u = \nabla \times \operatorname{grad} u$ по формулам (6.24) получаем выражение

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} \operatorname{grad} u = \nabla \times \operatorname{grad} u = & \left(\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 u}{\partial z \partial y} \right) i + \\ & + \left(\frac{\partial^2 u}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial z} \right) j + \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} \right) k = 0. \end{aligned}$$

Докажем второе равенство (см. формулу (6.23)):

$$\operatorname{div} \operatorname{grad} u = (\nabla, \nabla u) = \left(i \frac{\partial}{\partial x} + j \frac{\partial}{\partial y} + k \frac{\partial}{\partial z}, \right.$$

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \mathbf{k} \right) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \Delta u.$$

Символ Δ («дельта») имеет специальное название — оператор Лапласа⁷⁾. Символически можно записать: $\Delta = \nabla^2$.

Докажем еще третье соотношение, предоставив доказательство двух остальных равенств читателю. Запишем соотношение

$$\text{grad div } \mathbf{a} = \nabla (\nabla, \mathbf{a}) = \nabla \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) = \nabla b,$$

где

$$b = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}.$$

Далее,

$$\nabla b = \frac{\partial b}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial b}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial b}{\partial z} \mathbf{k}.$$

Подставляя вместо b его выражение, получим правую часть третьего соотношения. Утверждение доказано.

З а м е ч а н и е. Как уже неоднократно подчеркивалось, величины $\text{grad } u$, $\text{div } u$, $\text{rot } \mathbf{a}$ инвариантны. Поэтому инвариантны и величины $\text{rot grad } u$, $\text{div grad } u$, $\text{grad div } \mathbf{a}$, $\text{div rot } \mathbf{a}$, $\text{rot rot } \mathbf{a}$. Следовательно, в любой системе координат имеем, например, что

$$\begin{aligned} \text{rot grad } u &= 0, \quad \text{div grad } u = \Delta u = \\ &= \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}, \quad \text{div rot } \mathbf{a} = 0. \end{aligned}$$

4. Заключительные замечания. Обсудим физический смысл рассмотренных понятий дивергенции и ротора. Дивергенцию векторной функции $\text{div } \mathbf{a} = (\nabla, \mathbf{a}) = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$ еще называют расходимостью. Она определяет скорость изменения каждой компоненты вектора в своем «собственном» направлении. Если векторное поле описывает поток жидкости, то положительность дивергенции ($\text{div } \mathbf{a} > 0$) в данной точке означает, что из этой точки вытекает больше жидкости, чем в нее притекает. Говорят, что такая точка служит источником. Если же $\text{div } \mathbf{a} < 0$, то наблюдается обратный баланс и точка служит стоком, т. е. в нее притекает больше, чем вытекает. Если $\text{div } \mathbf{a} = 0$, то существует баланс — жидкости притекает столько же, сколько и вытекает.

Величина ротор векторного поля

$$\text{rot } \mathbf{a} = \nabla \times \mathbf{a} = \left(\frac{\partial Q}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial y} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial R}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial z} \right) \mathbf{j} +$$

⁷⁾ Пьер Симон Лаплас — выдающийся французский астроном, математик и физик (1749—1827).

$$+ \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} \right) \mathbf{k} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

еще называется вихрем. Это название связано с тем, что он как бы «смешивает» производные и компоненты. Он как бы «следит», как меняются компоненты векторного поля $\mathbf{a}(M)$ в «чужих» направлениях. Таким образом, ротор — это мера «вращения» векторного поля. Кстати, если $\mathbf{V}$ — линейная скорость, то вектор $\boldsymbol{\omega}$ угловой скорости вращения есть $\boldsymbol{\omega} = (1/2) \operatorname{rot} \mathbf{V}$. Этот вектор направлен по оси вращения. Отсюда и возникло название ротора.

В заключение приведем систему уравнений Максвелла для электромагнитного поля в вакууме:

$$\begin{aligned} 1) \operatorname{div} \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\varepsilon_0}; & 2) \operatorname{div} \mathbf{B} &= 0; \\ 3) \operatorname{rot} \mathbf{E} &= - \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}; & 4) \operatorname{rot} \mathbf{B} &= \frac{\mathbf{j}}{e_0 c^2} + \frac{1}{e^2} \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \end{aligned}$$

Здесь $\rho(M, t)$ — плотность электрического заряда (количество заряда, отнесенное к единице объема), $\mathbf{j}(M, t)$ — вектор плотности электрического тока (скорость протекания заряда через единичную площадку), $\mathbf{E}(M, t)$ и $\mathbf{B}(M, t)$ — векторы напряженности электрического и магнитного полей соответственно, ε_0 и e — размерные постоянные, c — скорость света в вакууме.

§ 3. ОСНОВНЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ АНАЛИЗА

В этом параграфе будут доказаны основные интегральные формулы анализа — формула Грина⁸⁾, формула Остроградского — Гаусса⁹⁾ и формула Стокса¹⁰⁾. Эти формулы, с одной стороны, являются далеко идущими обобщениями формулы Ньютона — Лейбница — основной формулы интегрального исчисления, а с другой стороны, являются важнейшими формулами математического анализа и математической физики.

1. Формула Грина. Пусть π — плоскость в пространстве E^3 , $\mathbf{k}$ — единичный вектор нормали к π , D — односвязная область на π (напомним, что область D называется односвязной, если любая кусочно гладкая замкнутая без самопересечений кривая, расположенная в D , ограничивает область, все точки которой также принадлежат D). Пусть, далее, область D удовлетворяет следующим двум условиям:

⁸⁾ Дж. Грин — английский математик (1793—1841).

⁹⁾ М. В. Остроградский — русский математик (1801—1861), К. Ф. Гаусс — немецкий математик (1777—1855).

¹⁰⁾ Дж. Г. Стокс — английский физик и математик (1819—1903).

1) граница C области D является замкнутой кусочно гладкой кривой без особых точек;

2) на плоскости π можно выбрать такую декартову прямоугольную систему координат, что все прямые, параллельные координатным осям, пересекают C не более чем в двух точках.

Пусть, наконец, $\mathbf{t}$ — единичный вектор касательной к кривой C , согласованный с $\mathbf{k}$, т. е. положительное направление обхода кривой C совпадает в точке приложения вектора $\mathbf{t}$ с направлением этого вектора, и если смотреть с конца нормали $\mathbf{k}$, то контур C ориентирован положительно (его обход осуществляется против часовой стрелки). Говорят, что ориентация кривой C согласована с нормалью «по правилу штопора».

Теорема 6.1 (формула Грина). Пусть $\mathbf{a}$ — векторное поле, дифференцируемое в области D , удовлетворяющей условиям 1), 2), и такое, что его производная по любому направлению непрерывна в объединении $D \cup C = \bar{D}$. Тогда справедлива формула

$$\iint_D (\mathbf{k}, \operatorname{rot} \mathbf{a}) d\sigma = \oint_C (\mathbf{a}, \mathbf{t}) dl. \quad (6.25)$$

Выражение справа обычно называют циркуляцией векторного поля $\mathbf{a}$ по кривой C , а выражение слева — потоком векторного поля $\operatorname{rot} \mathbf{a}$ через область D .

Данная формула допускает такую физическую трактовку: поток векторного поля $\operatorname{rot} \mathbf{a}$ через область D (поток тепла, жидкости и т. п.) равен циркуляции векторного поля $\mathbf{a}$ по замкнутому контуру C (работе сил поля $\mathbf{a}$ по перемещению точки вдоль C).

Доказательство. Поскольку все входящие в формулу (6.25) функции непрерывны, то оба интеграла существуют.

Заметим также, что интегралы слева и справа в формуле (6.25) инвариантны относительно выбора прямоугольной системы координат, поскольку величины $(\mathbf{k}, \operatorname{rot} \mathbf{a})$ и $(\mathbf{a}, \mathbf{t})$ инвариантны, элементы площади $d\sigma$ и длины дуги dl не зависят от выбора декартовой системы координат. Поэтому достаточно доказать формулу (6.25) в какой-то одной специально выбранной системе.

Выберем декартову прямоугольную систему координат $Oxyz$ так, чтобы выполнялось условие 2), и ось Oz направим вдоль $\mathbf{k}$. Поскольку векторное поле $\mathbf{a} = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j} + R(x, y)\mathbf{k}$ плоское, то $R(x, y) \equiv 0$, $\mathbf{t} = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\} = \{\cos \alpha, \cos \beta, 0\} = \{\cos \alpha, \sin \alpha, 0\}$.

Следовательно, можно записать:

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} \mathbf{a} &= \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \\ &+ \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \mathbf{k} = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \mathbf{k}. \end{aligned}$$

Далее,

$$(\mathbf{k}, \operatorname{rot} \mathbf{a}) = \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}, \quad (a, t) = P \cos \alpha + Q \sin \alpha.$$

Так как для плоской области $d\sigma = dx dy$, то формула (6.25) принимает вид

$$\begin{aligned} \iint_{\bar{D}} (\mathbf{k}, \operatorname{rot} \mathbf{a}) d\sigma &= \iint_{\bar{D}} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \\ &= \oint_C (P \cos \alpha + Q \sin \alpha) dl = \oint_C P dx + Q dy. \end{aligned} \quad (6.25')$$

Здесь мы воспользовались тем, что $dx = \cos \alpha dl$, $dy = \sin \alpha dl$, где l — длина дуги C , выбранная в качестве параметра, возрастание которого согласовано с направлением обхода C .

Для доказательства формулы Грина достаточно доказать два равенства:

$$I = - \iint_{\bar{D}} \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = \oint_C P dx,$$

$$J = \iint_{\bar{D}} \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy = \oint_C Q dy.$$

Обратимся для наглядности к рис. 6.1. Пусть прямая, параллельная оси Oy , пересекает C в точках $(x, y_1(x))$ и $(x, y_2(x))$, $y_1(x) \leq y_2(x)$. Пусть x_1 и x_2 — наименьшая и наибольшая абсциссы точек области $\bar{D}$, кривая C_1 соединяет точку $(x_1, y_1(x_1))$ с точкой $(x_2, y_1(x_2))$, а кривая C_2 — точку $(x_2, y_2(x_2))$ с точкой $(x_1, y_2(x_1))$ и $C = C_1 \cup C_2$, C_1, C_2 ориентированы согласованно с C . Тогда по формуле сведения двойного интеграла к повторному получим




Рис. 6.1

$$\begin{aligned} I &= - \int_{x_1}^{x_2} \left[\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} \frac{\partial P(x, y)}{\partial y} dy \right] dx = \int_{x_1}^{x_2} P(x, y_1(x)) dx - \\ &- \int_{x_1}^{x_2} P(x, y_2(x)) dx = \int_{C_1} P dx - \left(- \int_{C_2} P dx \right) = \oint_C P dx. \end{aligned}$$

Аналогично вычисляется интеграл J . Теорема доказана.

З а м е ч а н и е 1. Теорема 6.1 справедлива и для более общих областей D (с границей C) таких, что с помощью конечного числа кусочно гладких кривых эта область может быть разбита на конечное число областей D_i с границами C_i , $i=1, 2, \dots, n$, удовлетворяющих условиям 1) и 2). Действительно, для каждой области D_i по доказанному формула верна. Сложив эти равенства,

в силу аддитивности двойного интеграла слева $\sum_{i=1}^n \iint_{D_i}$ можно

заменить на $\iint_D$, а справа $\sum_{i=1}^n \oint_{C_i} = \oint_C$, поскольку интегралы по «внутренним» кривым¹⁾ сократятся (так как интегрирование по ним производится в противоположных направлениях). Останется лишь интеграл по границе C области D .

З а м е ч а н и е 2. В формулировке теоремы 6.1 от условия 2) можно избавиться, т. е. считать, что граница области D есть любая замкнутая кусочно гладкая кривая C без особых точек. Однако доказательство теоремы несколько усложняется.

З а м е ч а н и е 3. Условие на гладкость векторного поля можно также несколько ослабить. Достаточно требовать, чтобы поле $\mathbf{a}$ было непрерывно в $D \cup C = \bar{D}$, а дифференцируемо только в D , и производная по любому направлению была непрерывна в D . Формула (6.25) при этом сохраняется, однако входящий в нее двойной интеграл является при этом, вообще говоря, несобственным.

З а м е ч а н и е 4. Теорема 6.1, т. е. формула Грина, верна и в общем случае областей D с границей C , являющейся только спрямленной кривой¹²⁾.

З а м е ч а н и е 5. Формула Грина (6.25) может быть записана, как это следует из доказательства, в виде (6.25'):

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_C P dx + Q dy.$$

Интегралы слева и справа имеют инвариантный характер, т. е. их значение и форма не меняются при переходе к новой декартовой системе координат. Действительно, значения подынтегральных выражений слева и справа в формуле (6.25') равны соответственно $(\mathbf{k}, \text{rot } \mathbf{a})$ и $(\mathbf{a}, \mathbf{t})$ — инвариантным величинам. Форма подынтегральных выражений в формуле (6.25') тоже, очевидно, не меняется при переходе к новой декартовой системе координат $Ox'y'$; если в новом базисе векторное поле $\mathbf{a}$ имеет координаты P' и Q' , то

¹¹⁾ Т. е. по вспомогательным кусочно гладким кривым, разбивающим область D .

¹²⁾ См. статью Э. Г. Позняка, Е. В. Шикина // (ДАН СССР, 1980, 253, № 1, с. 42—44).

$$\begin{aligned}
 (\mathbf{k}, \operatorname{rot} \mathbf{a}) &= \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) = \left(\mathbf{k}, \left(\frac{\partial Q'}{\partial x'} - \frac{\partial P'}{\partial y'} \right) \mathbf{k} \right) = \\
 &= \frac{\partial Q'}{\partial x'} - \frac{\partial P'}{\partial y'}, \quad (\mathbf{a}, \mathbf{t}) dl = P dx + Q dy = \\
 &= (P' \cos \alpha' + Q' \sin \alpha') dx = P' dx' + Q' dy'.
 \end{aligned}$$

Наконец, якобиан преобразования при переходе к новой системе координат по модулю равен единице, а параметризация с помощью длины дуги не связана с системой координат. Поэтому интегралы слева и справа в (6.25') не меняют своего значения и формы.

2. Формула Остроградского—Гаусса. Пусть D — односвязная область в E^3 (т. е. для любой кусочно гладкой замкнутой кривой C , расположенной в D , можно указать ориентируемую кусочно-гладкую поверхность G , расположенную в D , имеющую границей C), S — ее граница, удовлетворяющая двум условиям:

1) поверхность S — кусочно гладкая двусторонняя полная ограниченная замкнутая и без особых точек;

2) прямоугольную декартову систему координат в E^3 можно выбрать так, что для каждой из осей координат любая прямая, параллельная этой оси, будет пересекать поверхность S не более чем в двух точках.

Пусть $\mathbf{n}$ — единичный вектор внешней нормали к S . Справедлива следующая теорема.

Теорема 6.2 (формула Остроградского—Гаусса). Пусть $\mathbf{a}$ — векторное поле, дифференцируемое в области D , удовлетворяющей условиям 1), 2), и такое, что производная по любому направлению непрерывна в $D \cup S = \bar{D}$. Тогда справедлива формула

$$\iiint_D \operatorname{div} \mathbf{a} \, dv = \oint_S (\mathbf{a}, \mathbf{n}) \, ds. \quad (6.26)$$

Интеграл справа в формуле (6.26) называется потоком векторного поля $\mathbf{a}$ через поверхность S , а интеграл слева в этой формуле — это объемный интеграл от дивергенции вектора по области D . Поэтому теорема 6.2 допускает такую формулировку:

Объемный интеграл от дивергенции вектора по области D равен потоку векторного поля $\mathbf{a}$ через поверхность S — границу этой области.

Доказательство. Все входящие в формулу (6.26) функции непрерывны, поэтому интегралы слева и справа существуют.

Заметим, что формула (6.26) инвариантна относительно выбора прямоугольной системы координат, поскольку все входящие в нее величины — инварианты. Поэтому достаточно доказать формулу (6.26) при каком-то одном выборе декартовой системы. Вы-

берем декартову прямоугольную систему координат $Oxyz$ так, чтобы выполнялось условие 2); пусть $\mathbf{a}=\{P, Q, R\}$, $\mathbf{n}=\{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$. Тогда, учитывая, что

$$\cos \alpha \, ds = dy \, dz, \quad \cos \beta \, ds = dz \, dx, \quad \cos \gamma \, ds = dx \, dy,$$

получим

$$\begin{aligned} \iiint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx \, dy \, dz &= \oint_S (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) \, ds = \\ &= \oint_S (P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy). \end{aligned} \quad (6.26')$$

Докажем, что справедливы следующие три равенства:

$$I = \iiint_D \frac{\partial P}{\partial x} dx \, dy \, dz = \oint_S P \, dy \, dz;$$

$$J = \iiint_D \frac{\partial Q}{\partial y} dx \, dy \, dz = \oint_S Q \, dz \, dx;$$

$$L = \iiint_D \frac{\partial R}{\partial z} dx \, dy \, dz = \oint_S R \, dx \, dy.$$

Ограничимся доказательством равенства для интеграла L , так как равенства для I и J доказываются аналогично. Обозначим через D' проекцию области D на плоскость Oxy . Через граничные точки области D' проведем прямые, параллельные Oz . Каждая из этих прямых пересекается с S лишь в одной точке. Множество этих точек разделяет S на две части: S_1 и S_2 (см. рис. 6.2). Если мы проведем прямую из внутренней точки области D' , параллельную оси Oz , то она пересечет поверхность в двух точках: $(x, y, z_1(x, y)) \in S_1$ и $(x, y, z_2(x, y)) \in S_2$; $z_1(x, y) \geq z_2(x, y)$. Заметим, что $z_1(x, y)$ и $z_2(x, y)$ кусочно и непрерывно дифференцируемые функции в D' . По формуле сведения тройного интеграла к повторному интегралу получим




Рис. 6.2

$$\begin{aligned}
L = \iint_{\bar{D}'} \left[\int_{z_2(x,y)}^{z_1(x,y)} \frac{\partial R(x,y,z)}{\partial z} dz \right] dx dy &= \iint_{\bar{D}'} R(x,y,z_1(x,y)) dx dy - \\
&- \iint_{\bar{D}'} R(x,y,z_2(x,y)) dx dy = \iint_{S_1} R(x,y,z) dx dy + \\
&+ \iint_{S_2} R(x,y,z) dx dy = \oint\oint_S R(x,y,z) dx dy.
\end{aligned}$$

Здесь мы воспользовались тем, что $S = S_1 \cup S_2$, и соотношением

$$- \iint_{\bar{D}'} R(x,y,z_2(x,y)) dx dy = \iint_{S_1} R(x,y,z) dx dy = \iint_{S_2} R \cos \gamma ds,$$

справедливым в силу того, что внешняя нормаль $\mathbf{n}$ к поверхности S_2 образует тупой угол с осью Oz (потому что $\cos \gamma < 0$). Теорема доказана.

З а м е ч а н и е 1. Формула Остроградского—Гаусса (6.26) может быть доказана и в случае областей D более общего вида, чем указано, а именно для таких, у которых существует конечное разбиение на области D_i , $i=1, 2, \dots, n$, рассмотренного вида. Для этого достаточно формулу (6.26) написать для каждой области D_i и полученные результаты сложить. При этом получится искомого формула. Действительно, в силу аддитивности интеграла в левой части получится интеграл по D . В правой части поверхностные интегралы по соответствующим частям границ областей D_i в сумме дадут ноль, так как внешние нормали в точках границ областей D_i , принадлежащих границам двух таких областей, направлены в разные стороны. Таким образом, останутся только интегралы по частям границ D_i , составляющим в совокупности границу S области D .

З а м е ч а н и е 2. В формулировке теоремы 6.2 от условия 2) можно избавиться и считать, что S — кусочно гладкая двусторонняя полная ограниченная поверхность без особых точек. Однако в этом случае доказательство теоремы усложняется.

З а м е ч а н и е 3. Можно считать, что векторное поле $\mathbf{a}$ непрерывно дифференцируемо только в открытой области D и непрерывно в $D \cup S = \bar{D}$. Тогда тройной интеграл в формуле (6.26) следует понимать как несобственный.

З а м е ч а н и е 4. Формула Остроградского—Гаусса (6.26) может быть записана, как это следует из доказательства, в виде

$$\iiint_{\bar{D}} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz = \oint\oint_S (P dy dz + Q dz dx + R dx dy).$$

Заметим, что интегралы слева и справа имеют инвариантный ха-

ракт, т. е. их значение и форма не меняются при переходе к новой декартовой системе координат. Для этого достаточно провести рассуждения, аналогичные проведенным в замечании 5 после доказательства теоремы 6.1.

3. Формула Стокса. Пусть S — односвязная¹³⁾ поверхность в E^3 , удовлетворяющая двум условиям:

1) S — кусочно гладкая двусторонняя полная ограниченная поверхность без особых точек; ее границей является замкнутый кусочно гладкий контур C ;

2) декартову систему координат можно выбрать так, чтобы S однозначно проектировалась на любую из трех координатных плоскостей.

Пусть n — единичный вектор нормали к S , t — единичный вектор касательной к C , согласованный с n (см. п. 1). При этих условиях имеет место следующая теорема.

Теорема 6.3 (формула Стокса). Пусть a — векторное поле, непрерывно дифференцируемое в некоторой окрестности поверхности S (т. е. на некотором открытом множестве в E^3 , содержащем S). Тогда справедлива формула

$$\iint_S (n, \operatorname{rot} a) ds = \oint_C (a, t) dl. \quad (6.27)$$

Эта теорема допускает еще такую формулировку:

Поток вектора $\operatorname{rot} a$ через поверхность S равен циркуляции вектора a по замкнутому контуру C .

Доказательство. В силу условий теоремы интегралы в формуле (6.27) существуют. Формула (6.27), очевидно, инвариантна относительно выбора базиса. Поэтому достаточно доказать эту формулу при каком-то одном выборе базиса. Выберем прямоугольную декартову систему координат $Oxyz$ так, чтобы S однозначно проектировалась на все три координатные плоскости. Пусть

$$a = Pi + Qj + Rk, \quad n = \{\cos X, \cos Y, \cos Z\},$$

$$t = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}.$$

Согласуем выбор системы координат так, чтобы вектор нормали n образовывал острые углы с координатными осями.

Учитывая выражение для $\operatorname{rot} a$ в декартовой прямоугольной системе координат, получим

¹³⁾ Напомним, что поверхность S называется односвязной, если любая кусочно гладкая замкнутая кривая без точек самопересечения, расположенная на S , ограничивает множество, целиком состоящее из точек этой поверхности.

$$\begin{aligned}
 & \iint_S (\mathbf{n}, \operatorname{rot} \mathbf{a}) ds = \\
 &= \iint_S \left\{ \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \cos X + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \cos Y + \right. \\
 &+ \left. \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \cos Z \right\} ds = \oint_C (\mathbf{a}, \mathbf{t}) dl = \oint_C (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dl = \\
 &= \oint_C (P dx + Q dy + R dz). \quad (6.27')
 \end{aligned}$$

Достаточно, очевидно, доказать, что

$$I = \iint_S \left(\frac{\partial P}{\partial z} \cos Y - \frac{\partial P}{\partial y} \cos Z \right) ds = \oint_C P dx.$$

Для остальных слагаемых:

$$J = \iint_S \left(\frac{\partial Q}{\partial x} \cos Z - \frac{\partial Q}{\partial z} \cos X \right) ds = \oint_C Q dy,$$

$$L = \iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} \cos X - \frac{\partial R}{\partial x} \cos Y \right) ds = \oint_C R dz$$

доказательство аналогичное.

Заметим, что поверхность S — кусочно гладкая и однозначно проектируется на Oxy . Пусть D — ее проекция, Γ — проекция C на плоскость Oxy (см. рис. 6.3). Поэтому существует дифференцируемая функция $z = z(x, y)$, которая задает уравнение поверхности S . При этом

$$\begin{aligned}
 \cos Y &= \frac{- \begin{vmatrix} 1 & z'_x \\ 0 & z'_y \end{vmatrix}}{\sqrt{1 + z'^2_x + z'^2_y}} = \\
 &= - \frac{z'_y}{\sqrt{1 + z'^2_x + z'^2_y}}.
 \end{aligned}$$

$$\text{Аналогично } \cos Z = \frac{1}{\sqrt{1 + z'^2_x + z'^2_y}}.$$




Рис. 6.3

Поэтому, учитывая эти формулы, будем иметь

$$I = - \iint_S \left(\frac{\partial P}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial y} \right) \cos Z \, ds = - \iint_D \frac{\partial}{\partial y} [P(x, y, z(x, y))] \, dx dy,$$

поскольку на поверхности S функция $P(x, y, z)$ равна

$$P(x, y, z(x, y)), \quad \frac{\partial P}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial P(x, y, z(x, y))}{\partial y}$$

и поверхностный интеграл по S равен двойному интегралу по D .
Далее, используя формулу Грина, получим

$$- \iint_D \frac{\partial}{\partial y} [P(x, y, z(x, y))] \, dx dy = \oint_{\Gamma} P(x, y, z(x, y)) \, dx = \oint_C P(x, y, z) \, dx.$$

Здесь мы воспользовались тем, что если точка (x, y) находится на кривой Γ , то точка $(x, y, z(x, y))$, очевидно, принадлежит кривой C . Теорема доказана.

Формула Стокса верна и для более общих ограниченных полных, кусочно гладких двусторонних поверхностей с кусочно гладкой границей.

З а м е ч а н и е 1. Прежде всего покажем, что формула Стокса верна для поверхностей S , удовлетворяющих условию 1), но не удовлетворяющих, вообще говоря, условию 2) однозначного проектирования S на любую из координатных плоскостей.

Оказывается, что *существует такое число $\delta > 0$, что для любой части Φ поверхности S размера меньше δ ¹⁴⁾ можно так выбрать декартову координатную систему, что Φ однозначно проектируется на все координатные плоскости.* Действительно, пусть M_0 — фиксированная точка S . Проведем касательную плоскость через точку M_0 , пусть $\mathbf{p}_{M_0}$ — вектор единичной нормали поверхности в точке M_0 . Выберем прямоугольную систему координат так, чтобы вектор $\mathbf{p}_{M_0}$ составлял острые углы с осями координат. Поскольку поле $\mathbf{n}$ нормалей непрерывно, то существует окрестность точки M_0 такая, что все нормали в точках этой окрестности образуют острые углы с осями координат. Но тогда согласно утверждению п. 1 гл. 5 и замечанию 2 к нему можно утверждать, что существует некоторая окрестность радиуса $\delta/2$ точки M_0 , которая однозначно проектируется на все координатные плоскости.

Отметим, что указанное число δ зависит, вообще говоря, от точки M_0 : $\delta = \delta(M_0)$. Покажем, что можно выбрать универсальное, не зависящее от точки число $\delta > 0$. Допустим противное, что такого числа δ не существует. Тогда для каждого $\delta_n = 1/n$, $n = 1, 2, \dots$, можно указать часть Φ_n поверхности S , размеры ко-

¹⁴⁾ Такая часть поверхности может быть расположена в сфере радиуса $\delta/2$.

торой меньше δ_n и которая не проектируется однозначно на все три координатные плоскости любой декартовой системы координат.

Выберем в каждой части Φ_n точку M_n , а из полученной последовательности выберем последовательность, сходящуюся к некоторой точке M поверхности S ¹⁵⁾. Согласно проведенным выше рассуждениям у точки M существует однозначно проектируемая на координатные плоскости некоторой прямоугольной системы окрестность. Эта окрестность для некоторого номера n содержит часть Φ_n , которая также будет однозначно проектироваться на все три координатные плоскости. Получилось противоречие с выбором Φ_n , завершающее доказательство.

Теперь уже нетрудно сделать заключение о справедливости формулы Стокса для поверхностей, удовлетворяющих условию 1) и не удовлетворяющих, вообще говоря, условию 2). Для этого разобьем поверхность S на конечное число гладких частей Φ_n , размер каждой из которых меньше δ , указанного выше. Поскольку часть Φ_n однозначно проектируется на все координатные плоскости некоторой декартовой системы координат, то формула Стокса верна для каждой части Φ_n . Просуммируем левые и правые части этих формул. Интегралы по общим участкам границы Φ_n берутся в противоположных направлениях и поэтому сократятся.

Таким образом, слева мы получим интеграл по поверхности от величины $(n, \text{rot } a)$, а справа — интеграл по границе C поверхности S от величины (a, t) , т. е. формулу Стокса для общего случая.

З а м е ч а н и е 2. Формула Стокса верна и для поверхностей S , допускающих разбиение с помощью кусочно гладких кривых на конечное число односвязных, обладающих свойством 1) поверхностей. Доказательство этого факта очевидно: достаточно просуммировать интегралы слева и справа в формулах Стокса для односвязных поверхностей и учесть, что интегралы по кривым, входящим в разбиение, берутся в разных направлениях и поэтому сократятся.

З а м е ч а н и е 3. Формула Стокса (6.27) может быть записана, как это следует из доказательства, в виде (6.27'):

$$\oint_S \left\{ \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \cos X + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \cos Y + \right. \\ \left. + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \cos Z \right\} ds = \oint_C (Pdx + Qdy + Rdz).$$

¹⁵⁾ Это можно сделать в силу ограниченности и полноты, используя теорему Больцано—Вейерштрасса.

Интегралы слева и справа имеют инвариантный характер — их значение и форма не меняются при переходе к новой декартовой системе координат. Чтобы убедиться в этом, достаточно провести рассуждения, аналогичные проведенным в замечании 5 п. 1.

§ 4. УСЛОВИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ КРИВОЛИНЕЙНОГО ИНТЕГРАЛА НА ПЛОСКОСТИ ОТ ПУТИ ИНТЕГРИРОВАНИЯ

Пусть $\mathbf{a}(M)$ — векторное поле, заданное в связной плоской области D .

Определение 1. Функция $U(M)$ называется потенциалом поля $\mathbf{a}(M)$ в области D , если в этой области

$$\mathbf{a}(M) = \text{grad } U(M).$$

Поле $\mathbf{a}$, обладающее потенциалом, называется потенциальным полем.

Теорема 6.4. Пусть функции $P(x, y)$, $Q(x, y)$ непрерывны в D . Для любых двух точек $A \in D$, $B \in D$ значение интеграла

$$\int_{\overline{AB}} Pdx + Qdy$$

не зависит от кусочно гладкой кривой $\overline{AB} \subset D$, соединяющей точки A и B , тогда и только тогда, когда поле

$$\mathbf{a}(x, y) = \{P(x, y), Q(x, y)\}$$

потенциально. В этом случае

$$\int_{\overline{AB}} Pdx + Qdy = U(B) - U(A),$$

где $U(x, y)$ — потенциал поля $\mathbf{a}(x, y)$.

Доказательство. Достаточность. Пусть

$$\mathbf{a}(x, y) = \{P(x, y), Q(x, y)\} = \text{grad } U(x, y) = \left\{ \frac{\partial U}{\partial x}, \frac{\partial U}{\partial y} \right\}.$$

Произвольные точки A и B из области D соединим некоторой кусочно гладкой кривой $\overline{AB}$, и пусть $x = x(t)$, $y = y(t)$, $a \leq t \leq b$ — ее параметрическое представление. В силу непрерывности $\frac{\partial U}{\partial x}$ и $\frac{\partial U}{\partial y}$ заключаем, что функция $U(x, y)$ дифференцируема в D . Тогда по формуле Ньютона—Лейбница получаем

$$\begin{aligned}\int_{AB} Pdx + Qdy &= \int_a^b (P(x(t), y(t)) x'(t) + Q(x(t), y(t)) y'(t)) dt = \\ &= \int_a^b U' dt = U(x(b), y(b)) - U(x(a), y(a)) = U(B) - U(A).\end{aligned}$$

Необходимость. Фиксируем в D некоторую точку $M_0(x_0, y_0)$ и пусть $M(x, y)$ — произвольная точка области D . Положим

$$U(M) = \int_{M_0 M} Pdx + Qdy,$$

где интеграл берется по любой кусочно гладкой кривой, соединяющей точки M_0 и M (см. рис. 6.4).

Покажем, что так определенная функция $U(x, y)$ является искомым потенциалом поля $a(x, y) = \{P(x, y), Q(x, y)\}$. Докажем, например, существование $\frac{\partial U}{\partial x}$

и равенство $\frac{\partial U}{\partial x} = P(x, y)$. От точки $M(x, y)$ сместимся в точку $N(x + \Delta x, y)$ так, чтобы отрезок $\overline{MN}$ содержался в D . Это можно сделать для всех достаточно малых приращений Δx , так как D — открытое множество, состоящее из внутренних точек. При таком смещении функция $U(x, y)$ получит приращение




Рис. 6.4

$$\begin{aligned}U(x + \Delta x, y) - U(x, y) &= \int_{M_0 MN} Pdx + Qdy - \int_{M_0 M} Pdx + Qdy = \\ &= \int_{\overline{MN}} Pdx + Qdy.\end{aligned}$$

На отрезке $\overline{MN}$ координата y имеет постоянное значение, и, следовательно,

$$\int_{\overline{MN}} Qdy = 0.$$

Поэтому

$$U(x + \Delta x, y) - U(x, y) = \int_{\overline{MN}} Pdx = \int_x^{x+\Delta x} P(t, y) dt.$$

В силу непрерывности функции $P(x, y)$ из теоремы о среднем получим

$$U(x + \Delta x, y) - U(x, y) = P(x + \theta \Delta x, y) \Delta x,$$

где $0 < \theta < 1$, откуда

$$\frac{U(x + \Delta x, y) - U(x, y)}{\Delta x} = P(x + \theta \Delta x, y).$$

Переходя к пределу при $\Delta x \rightarrow 0$ в силу непрерывности функции $P(x, y)$, получаем, что предел существует и

$$\frac{\partial U}{\partial x} = P(x, y).$$

Совершенно аналогично доказывается равенство

$$\frac{\partial U(x, y)}{\partial y} = Q(x, y).$$

Теорема 6.4 доказана.

Если поле $a(x, y) = \{P(x, y), Q(x, y)\}$ потенциально и функции $P(x, y)$, $Q(x, y)$ вместе со своими частными производными непрерывны в области D , то должно выполняться равенство

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x},$$

которое означает равенство смешанных производных:

$$\frac{\partial^2 U}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 U}{\partial x \partial y}.$$

В силу теоремы 6.4 необходимым условием независимости криволинейного интеграла

$$\int_{\bar{AB}} Pdx + Qdy$$

от пути интегрирования при условии непрерывности функций $P(x, y)$, $Q(x, y)$ и их частных производных в области D является легко проверяемое равенство

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial Q}{\partial y}.$$

Если область D односвязна, то это условие будет и достаточным для независимости интеграла $\int_{\bar{AB}} Pdx + Qdy$ от выбора кривой, соединяющей данные точки A и B . Чтобы при изложении не использовать не доказанную в общем случае формулу Грина (см. замечание 2 к теореме 6.1), рассмотрим сначала случай, когда область D является кругом.

Теорема 6.5. Пусть функции $P(x, y)$, $Q(x, y)$ и их частные производные непрерывны в некотором круге K . В этом случае поле $a(x, y) = \{P(x, y), Q(x, y)\}$ потенциально в этом круге тогда и только тогда, когда в K

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

Доказательство. Очевидно, требуется доказать только достаточность условия. Через центр круга, точку M_0 , проведем прямые M_0x' и M_0y' , параллельные координатным осям Ox и Oy соответственно. Из произвольной точки $M(x, y) \in K$ опустим перпендикуляры MM_1 и MM_2 на M_0x' и M_0y' соответственно. Точку M_0 соединим с точками M_1 и M_2 отрезками M_0M_1 и M_0M_2 .

Применяя формулу Грина (6.25') к прямоугольнику $M_0M_1MM_2$, получаем

$$\int_{M_0M_1MM_2} Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} \right) dx dy = 0,$$

откуда следует, что

$$\int_{M_0M_1M} Pdx + Qdy = \int_{M_0M_2M} Pdx + Qdy,$$

т. е. интеграл $\int_{\gamma} Pdx + Qdy$ не зависит от двузвенной ломаной γ , соединяющей фиксированную точку M_0 с некоторой точкой M . Поэтому определим функцию

$$U(M) = \int_{M_0M} Pdx + Qdy,$$

где $\widetilde{M_0M}$ — двузвенная ломаная, звенья которой параллельны координатным осям. Проверка, что так определенная функция $U(x, y)$ является потенциалом данного поля $a(x, y)$, проводится аналогично той, которая проведена при доказательстве теоремы 6.4. Теорема 6.5 доказана.

Замечание. Теорема 6.5 справедлива в случае произвольной односвязной области D . Чтобы убедиться в этом, докажем, что для независимости криволинейного интеграла

$$\int_{AB} Pdx + Qdy$$

от выбора кривой $\widetilde{AB}$, соединяющей точки A и B , достаточно выполнение в области D условия $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$.

Пусть L — произвольная замкнутая кусочно гладкая кривая, расположенная в D . Обозначим через D^* область, которую

ограничивает кривая L . В силу односвязности области D каждая точка области D^* принадлежит D . Применяя к области D^* формулу Грина (6.25') (см. замечание 2 к теореме 6.1), получим

$$\oint_L Pdx + Qdy = \iint_{D^*} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy = 0.$$

Отсюда следует, что для любых фиксированных точек A и B области D и любых двух кусочно гладких кривых $\widetilde{ACB}$ и $\widetilde{AC'B}$, соединяющих эти точки, выполняются равенства:

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{\widetilde{ACB} \cup \widetilde{BC'A}} Pdx + Qdy = \int_{\widetilde{ACB}} Pdx + Qdy + \int_{\widetilde{BC'A}} Pdx + Qdy = \\ &= \int_{\widetilde{ACB}} Pdx + Qdy - \int_{\widetilde{AC'B}} Pdx + Qdy. \end{aligned}$$

Поэтому

$$\int_{\widetilde{ACB}} Pdx + Qdy = \int_{\widetilde{AC'B}} Pdx + Qdy.$$

Следовательно, значение интеграла

$$\int_{\widetilde{AB}} Pdx + Qdy$$

не зависит от кусочно гладкой кривой $\widetilde{AB}$, соединяющей точки A и B .

§ 5. НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ ПРИЛОЖЕНИЙ ТЕОРИИ ПОЛЯ

1. Выражение площади плоской области через криволинейный интеграл. Пусть D — односвязная область с границей C , удовлетворяющей условиям теоремы 6.1.

Полагая в формуле Грина (формула (6.25')) $P = -y$, $Q = x$, получим

$$\iint_D 2dxdy = \oint_C -ydx + xdy.$$

Для площади $\sigma(D)$ области D на плоскости имеем следующее выражение через криволинейный интеграл по ориентированной границе этой области:

$$\sigma(D) = \frac{1}{2} \oint_C -ydx + xdy.$$

С помощью полученной формулы найдем площадь области, ограниченной циклоидой $x=a(t-\sin t)$, $y=a(1-\cos t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$, $a>0$, и прямой $y=0$. Так как

$$\int_{\gamma} -ydx + xdy = 0,$$

где γ — отрезок $0 \leq x \leq 2\pi$, $y=0$, то в соответствии с положительной ориентацией контура получим

$$\begin{aligned} \sigma(D) &= \frac{1}{2} \int_{2\pi}^0 (-a^2(1-\cos t)^2 + a^2(t-\sin t)\sin t) dt = \\ &= \frac{a^2}{2} \int_0^{2\pi} (2-2\cos t - t\sin t) dt = 2\pi a^2 - \frac{a^2}{2} \int_0^{2\pi} t\sin t dt = \\ &= 2\pi a^2 + \frac{a^2}{2} (t\cos t) \Big|_0^{2\pi} = 3\pi a^2. \end{aligned}$$

2. Выражение объема через поверхностный интеграл. Пусть D — односвязная область в E^3 с границей S , удовлетворяющей условиям теоремы 6.2 (формула Остроградского—Гаусса). Положим, что в области D

$$P(x, y, z) = x, Q(x, y, z) = y, R(x, y, z) = z.$$

Эти функции удовлетворяют условиям, при которых справедлива формула Остроградского—Гаусса, поэтому

$$\iint_S x dydz + y dzdx + z dxdy = \iiint_D 3dxdydz = 3V(D),$$

где $V(D)$ — объем области D .

3. Рассмотрим векторное поле, которое создает электрический заряд величины q . Поместим этот заряд в начало координат. Сила, действующая на единичный заряд, помещенный в точку $M(x, y, z)$, по закону Кулона выражается формулой

$$E(M) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\mathbf{r}}{r^3},$$

где $\mathbf{r}$ — радиус-вектор точки M , $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, ϵ_0 — постоянная.

Электростатическое поле E потенциально в $E^3 \setminus \{0\}$. Напомним, что поле $\mathbf{a}(M)$ называется потенциальным в области D , если в этой области существует функция $U(M)$ такая, что

$$\mathbf{a}(M) = \text{grad } U(M).$$

Потенциалом поля $\mathbf{E}$ служит функция

$$\Phi(M) = - \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r}.$$

Поле $\mathbf{F}$, создаваемое точечной массой m , помещенной в начало координат, называется гравитационным, и оно также потенциально.

По закону Ньютона сила $\mathbf{F}(M)$, с которой поле действует на единичную массу, помещенную в точку $M(x, y, z)$, выражается формулой

$$\mathbf{F}(M) = -gm \frac{\mathbf{r}}{r^3}.$$

Потенциалом поля $\mathbf{F}$ во всем E^3 (за исключением начала координат) служит функция

$$U(M) = gm \frac{1}{r}.$$

Для потенциального поля

$$\mathbf{a}(M) = \{P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)\},$$

заданного в области $D \subset E^3$, независимость интеграла

$$\int_{\gamma} Pdx + Qdy + Rdz$$

от пути интегрирования (интеграл зависит только от начала и конца пути) доказывается так же, как и в теореме 6.4, в случае области D , принадлежащей E^2 .

Поэтому работа, совершаемая таким полем при перемещении единичной пробной частицы из точки A в точку B , не зависит от пути перемещения. Если расстояния от начала координат до точек A и B равны r_1 и r_2 соответственно, то эта работа поля $\mathbf{E}$ равна

$$\Phi(B) - \Phi(A) = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right),$$

а работа поля $\mathbf{F}$ равна

$$U(B) - U(A) = gm \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right).$$

ДОПОЛНЕНИЕ К ГЛАВЕ 6¹⁶⁾
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ФОРМЫ
В ЕВКЛИДОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

§ 1. ЗНАКОПЕРЕМЕННЫЕ ПОЛИЛИНЕЙНЫЕ ФОРМЫ

1. Линейные формы. Пусть V — произвольное n -мерное векторное пространство, элементы которого будем обозначать символами $\xi, \eta, \dots$. Предметом нашего изучения будут функции, сопоставляющие каждому элементу $\xi \in V$ некоторое вещественное число.

Определение 1. Функция $a(\xi)$ называется *линейной формой*, если для любых $\xi \in V, \eta \in V$ и любого вещественного числа λ выполняются равенства

$$\begin{aligned} 1) \quad a(\xi + \eta) &= a(\xi) + a(\eta); \\ 2) \quad a(\lambda \xi) &= \lambda a(\xi). \end{aligned}$$

Определение 2. Суммой двух линейных форм a и b назовем линейную форму c , которая каждому вектору $\xi \in V$ сопоставляет число

$$c(\xi) = a(\xi) + b(\xi).$$

Произведением линейной формы a на вещественное число λ назовем линейную форму b , которая каждому вектору $\xi \in V$ сопоставляет число

$$b(\xi) = \lambda a(\xi).$$

Таким образом, множество всех линейных форм образует векторное пространство, которое мы обозначим символом $L(V)$ ¹⁷⁾. Найдем представление линейной формы a в каком-либо базисе $\{e_i\}_{i=1}^n$. Пусть

$$\xi = \sum_{i=1}^n \xi^i e_i,$$

где числа ξ^i определяются однозначно. Если обозначить $a_i = a(e_i)$, то искомое представление будет иметь вид

$$a(\xi) = \sum_{i=1}^n \xi^i a_i.$$

Докажем, что размерность $\dim L(V)$ линейного пространства $L(V)$ равна n . Для этого достаточно указать какой-либо

¹⁶⁾ Текст данного дополнения взят из книги В. А. Ильина, Э. Г. Позняка «Основы математического анализа. Ч. 2» (М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1982).

¹⁷⁾ Пространство $L(V)$ обозначают также символом V^* и называют сопряженным (или дуальным) к V .

базис в $L(V)$, содержащий точно n элементов, т. е. n линейных форм. Фиксируем произвольный базис $\{e_k\}$ пространства V и рассмотрим линейные формы

$$e^k(\xi) = \xi^k \quad (k=1, 2, \dots, n),$$

где $\{\xi^k\}$ — коэффициенты разложения вектора ξ по элементам базиса $\{e_k\}$. Иначе говоря, линейная форма e^k действует на элементы базиса $\{e_i\}$ по правилу

$$e^k(e_i) = \delta_{ik} = \begin{cases} 1 & \text{при } i=k; \\ 0 & \text{при } i \neq k. \end{cases}$$

В таком случае в данном базисе $\{e_i\}$ линейная форма a имеет вид

$$a(\xi) = \sum_{i=1}^n a_i e^i(\xi), \quad a_i = a(e_i),$$

т. е. линейные формы $e^1(\xi), e^2(\xi), \dots, e^n(\xi)$ образуют базис в $L(V)$. Этот базис называют сопряженным (а также взаимным или дуальным) к базису $\{e_i\}$.

2. Билинейные формы. Обозначим через $V \times V$ множество всех упорядоченных пар (ξ_1, ξ_2) , где $\xi_1 \in V, \xi_2 \in V$, и рассмотрим функции $a(\xi_1, \xi_2)$, сопоставляющие каждому элементу из $V \times V$ (т. е. каждому двум элементам $\xi_1 \in V$ и $\xi_2 \in V$) некоторое вещественное число.

Определение. Функция $a(\xi_1, \xi_2)$ называется билинейной формой, если при каждом фиксированном значении одного аргумента она является линейной формой относительно другого аргумента.

Иначе говоря, для любых векторов $\xi_1, \xi_2, \eta_1, \eta_2$ и любых вещественных чисел $\lambda_1, \lambda_2, \mu_1, \mu_2$ выполняется равенство

$$\begin{aligned} a(\lambda_1 \xi_1 + \mu_1 \eta_1, \lambda_2 \xi_2 + \mu_2 \eta_2) = \\ = \lambda_1 \lambda_2 a(\xi_1, \xi_2) + \lambda_1 \mu_2 a(\xi_1, \eta_2) + \mu_1 \lambda_2 a(\eta_1, \xi_2) + \mu_1 \mu_2 a(\eta_1, \eta_2). \end{aligned}$$

Множество всех билинейных форм легко превратить в линейное пространство, вводя в нем естественным образом операции сложения и умножения на вещественное число. Полученное пространство билинейных форм обозначим символом $L_2(V)$.

Найдем представление билинейной формы $a(\xi_1, \xi_2)$ в каком-либо базисе $\{e_i\}_{i=1}^n$ пространства V . Пусть $\xi_k = \sum_{j=1}^n \xi_k^j e_j$,

$k=1, 2$. Положив $a(e_i, e_j) = a_{ij}$, получим искомое представление

$$a(\xi_1, \xi_2) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} \xi_i \xi_j.$$

Для того чтобы определить размерность пространства $L_2(V)$, образуем с помощью линейных форм $e^i(\xi)$, составляющих в $L(V)$ базис, сопряженный к базису $\{e_i\}$, билинейные формы

$$e^{ij}(\xi_1, \xi_2) = e^i(\xi_1) e^j(\xi_2).$$

Тогда произвольная билинейная форма будет однозначно представимой в виде

$$a(\xi_1, \xi_2) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} e^{ij}(\xi_1, \xi_2).$$

Это означает, что формы $e^{ij}(\xi_1, \xi_2)$ образуют базис в $L_2(V)$ и, следовательно, размерность $L_2(V)$ равна n^2 .

3. Полилинейные формы. Пусть p — натуральное число. Обозначим символом $V^p = V \times V \times \dots \times V$ множество всех упорядоченных наборов $(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_p)$ из p векторов, каждый из которых принадлежит V и рассмотрим функции, сопоставляющие каждому такому набору некоторое вещественное число.

Определение. Функция $a(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_p)$ называется полилинейной формой степени p (или p -формой), если она является линейной формой по каждому аргументу при фиксированных значениях остальных.

Вводя в множестве всех p -форм линейные операции, получим линейное пространство, которое обозначим символом $L_p(V)$.

Найдем представление произвольной полилинейной формы $a(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_p)$ в каком-либо базисе $\{e_i\}_{i=1}^n$ пространства V . Обозначим

$$a_{i_1 i_2 \dots i_p} = a(e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_p}).$$

Тогда если $\xi_k = \sum_{i=1}^n \xi_k^i e_i$, то

$$a(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_p) = \sum_{i_1=1}^n \dots \sum_{i_p=1}^n a_{i_1 i_2 \dots i_p} \xi_1^{i_1} \xi_2^{i_2} \dots \xi_p^{i_p}.$$

Если $e^k(\xi)$ — базис в $L(V)$, сопряженный к $\{e_i\}$, то, очевидно, p -формы

$$e^{i_1 i_2 \dots i_p}(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_p) = e^{i_1}(\xi_1) e^{i_2}(\xi_2) \dots e^{i_p}(\xi_p)$$

образуют базис в $L_p(V)$, следовательно, $L_p(V)$ имеет размерность n^p .

4. Знакопеременные полилинейные формы.

Определение. Полилинейная форма $a(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_p)$ называется *знакопеременной*, если при перестановке любых двух аргументов она меняет знак¹⁸⁾. Иначе говоря,

$$a(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_i, \dots, \xi_j, \dots, \xi_p) = -a(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_j, \dots, \xi_i, \dots, \xi_p).$$

Очевидно, множество всех полилинейных знакопеременных форм степени p образует подпространство линейного пространства $L_p(V)$, которое мы обозначим символом $A_p(V)$ ¹⁹⁾. Элементы пространства $A_p(V)$ будем обозначать символом

$$\omega = \omega(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_p).$$

Заметим, что если $\{e_i\}$ — произвольный базис в V и

$$\omega = \sum_{i_1=1}^n \dots \sum_{i_p=1}^n \omega_{i_1 \dots i_p} \xi_{i_1}^{i_1} \dots \xi_{i_p}^{i_p},$$

то числа $\omega_{i_1 \dots i_p}$ меняют знак при перестановке двух индексов. Это вытекает из того, что

$$\omega_{i_1 \dots i_p} = \omega(e_{i_1}, \dots, e_{i_p}).$$

Естественно считать, что $A_1(V) = L_1(V)$, а $A_0(V)$ состоит из всех постоянных, т. е. совпадает с числовой прямой.

5. Внешнее произведение знакопеременных форм. Рассмотрим две знакопеременные формы: $\omega^p \in A_p(V)$ и $\omega^q \in A_q(V)$. В этом пункте мы введем основную операцию в теории знакопеременных форм — операцию внешнего умножения. Пусть

$$\omega^p = \omega^p(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_p), \quad \eta_i \in V;$$

$$\omega^q = \omega^q(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_q), \quad \xi_j \in V.$$

Рассмотрим следующую полилинейную форму $a \in L_{p+q}(V)$:

$$a(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{p+q}) = \omega^p(\xi_1, \dots, \xi_p) \omega^q(\xi_{p+1}, \dots, \xi_{p+q}). \quad (6.1.1)$$

Эта форма, вообще говоря, не является знакопеременной: при перестановке аргументов ξ_i и ξ_j , где $1 \leq i \leq p$ и $p+1 \leq j \leq p+q$, форма (6.1.1) может не изменить знака. Этим обстоятельством и вызвана необходимость введения внешнего произведения.

¹⁸⁾ Знакопеременные полилинейные формы называют также антисимметрическими, кососимметрическими, косыми, внешними.

¹⁹⁾ Это пространство обозначают также символом $\wedge^p V^*$ и называют p -й внешней степенью пространства V^* .

Для того чтобы ввести внешнее произведение, нам понадобятся некоторые факты из теории перестановок. Напомним, что перестановкой чисел $\{1, 2, \dots, m\}$ называют функцию $\sigma = \sigma(k)$, определенную на этих числах и отображающую их взаимно однозначно на себя. Множество всех таких перестановок обозначается символом Σ_m . Очевидно, что Σ_m содержит всего $m!$ различных перестановок. Для двух перестановок $\sigma \in \Sigma_m$ и $\tau \in \Sigma_m$ естественным образом определяется суперпозиция $\sigma\tau \in \Sigma_m$. Перестановка σ^{-1} называется обратной к σ , если $\sigma^{-1}\sigma = \sigma\sigma^{-1} = \varepsilon$, где ε — тождественная перестановка (т. е. $\varepsilon(k) = k$, $k = 1, 2, \dots, m$).

Перестановка σ называется транспозицией, если она переставляет два числа, оставляя другие на своем месте. Иначе говоря, если существует пара чисел i и j ($1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq m$, $i \neq j$) такая, что $\sigma(i) = j$, $\sigma(j) = i$, $\sigma(k) = k$ для $k \neq i$ и $k \neq j$. Очевидно, если σ — транспозиция, то $\sigma^{-1} = \sigma$ и $\sigma \cdot \sigma = \varepsilon$.

Известно, что всякая перестановка σ разлагается в суперпозицию транспозиций, переставляющих числа с соседними номерами, причем четность числа транспозиций в таком разложении не зависит от его выбора и называется четностью перестановки σ .

Введем следующее обозначение:

$$\operatorname{sgn} \sigma = \begin{cases} 1, & \text{если перестановка } \sigma \text{ четна,} \\ -1, & \text{если перестановка } \sigma \text{ нечетна.} \end{cases}$$

Заметим, что форма $a \in L_p(V)$ принадлежит $A_p(V)$, если для любой перестановки $\sigma \in \Sigma_p$

$$a(\xi_{\sigma(1)}, \xi_{\sigma(2)}, \dots, \xi_{\sigma(p)}) = (\operatorname{sgn} \sigma) a(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_p).$$

Рассмотрим снова полилинейную форму (6.1.1). Для любой перестановки $\sigma \in \Sigma_{p+q}$ положим

$$\sigma a(\xi_1, \dots, \xi_{p+q}) = a(\xi_{\sigma(1)}, \dots, \xi_{\sigma(p+q)}). \quad (6.1.2)$$

Нетрудно убедиться в том, что если $\tau \in \Sigma_{p+q}$ и $\sigma \in \Sigma_{p+q}$, то $(\tau\sigma)a = \tau(\sigma a)$.

Определение. Внешним произведением формы $\omega^p \in A_p(V)$ и формы $\omega^q \in A_q(V)$ называется форма $\omega \in A_{p+q}(V)$, определяемая равенством

$$\omega(\xi_1, \dots, \xi_{p+q}) = \sum_{\sigma} (\operatorname{sgn} \sigma) \sigma a, \quad (6.1.3)$$

где сумма берется по всем перестановкам $\sigma \in \Sigma_{p+q}$, удовлетворяющим условию

$$\sigma(1) < \sigma(2) < \dots < \sigma(p), \quad \sigma(p+1) < \dots < \sigma(p+q), \quad (6.1.4)$$

а величина σ определяется равенствами (6.1.1) и (6.1.2).

Внешнее произведение форм ω^p и ω^q обозначается символом

$$\omega = \omega^p \wedge \omega^q.$$

Проиллюстрируем на примере, как действует перестановка σ , удовлетворяющая условию (6.1.4). Предположим, что по некоторой дороге параллельно движутся две колонны автомобилей, в первой из которых p , а во второй q машин. Через некоторое время дорога сужается и обе колонны на ходу перестраиваются в одну. При этом автомобили первой колонны занимают места где-то среди автомобилей второй, однако порядок следования автомобилей внутри каждой колонны сохраняется. В результате мы получаем перестановку, удовлетворяющую условию (6.1.4). Легко видеть, что и обратно всякая такая перестановка может быть реализована на нашей модели.

Для того чтобы убедиться, что данное нами определение является корректным, необходимо доказать, что $\omega = \omega^p \wedge \omega^q \in \in A_{p+q}(V)$. Очевидно, в доказательстве нуждается только знакопеременность формы ω .

Покажем, что при перестановке двух аргументов ξ_i и ξ_{i+1} форма ω меняет знак. Отсюда легко будет следовать, что $\omega \in \in A_{p+q}(V)$. Пусть $\tau \in \Sigma_{p+q}$ является такой перестановкой. Убедимся в том, что

$$\tau \omega = -\omega = (\operatorname{sgn} \tau) \omega. \quad (6.1.5)$$

Из равенства (6.1.3) получим

$$\tau \omega = \sum_{\sigma} (\operatorname{sgn} \sigma) (\tau \sigma) a.$$

Разобьем эту сумму на две:

$$\tau \omega = \sum'_{\sigma} (\operatorname{sgn} \sigma) (\tau \sigma) a + \sum''_{\sigma} (\operatorname{sgn} \sigma) (\tau \sigma) a. \quad (6.1.6)$$

К первой сумме отнесем те перестановки σ , для которых либо $\sigma^{-1}(i) \leq p$, $\sigma^{-1}(i+1) \leq p$, либо $\sigma^{-1}(i) \geq p+1$, $\sigma^{-1}(i+1) \geq p+1$. Для каждой такой перестановки $(\tau \sigma) a = -\sigma a$.

Для того чтобы сделать это утверждение более очевидным, обозначим $k = \sigma^{-1}(i)$, $l = \sigma^{-1}(i+1)$, т. е. $i = \sigma(k)$, $i+1 = \sigma(l)$. Форма σa представляет собой произведение форм ω^p и ω^q , причем аргументами ω^p являются векторы $\xi_{\sigma(1)}, \xi_{\sigma(2)}, \dots, \xi_{\sigma(p)}$, а аргументами ω^q — векторы $\xi_{\sigma(p+1)}, \dots, \xi_{\sigma(p+q)}$. Если $k \leq p$ и $l \leq p$, то $\xi_i = \xi_{\sigma(k)}$ и $\xi_{i+1} = \xi_{\sigma(l)}$ являются аргументами формы ω^p , которая по условию знакопеременна. Следовательно, при перестановке ξ_i и ξ_{i+1} форма ω^p , а значит, и σa меняют знак. Аналогично рассматривается случай, когда $k \geq p+1$ и $l \geq p+1$.

Итак, для первой суммы выполняется равенство

$$\sum_{\sigma} (\operatorname{sgn} \sigma) (\tau \sigma) a = - \sum_{\sigma} (\operatorname{sgn} \sigma) \sigma a. \quad (6.1.7)$$

Ко второй сумме отнесем те перестановки σ , для которых либо $\sigma^{-1}(i) \leq p$, $\sigma^{-1}(i+1) \geq p+1$, либо $\sigma^{-1}(i) \geq p+1$, $\sigma^{-1}(i+1) \leq p$. Покажем, что множество перестановок $\{\sigma\}$, удовлетворяющих этому условию (а также, разумеется, условию (6.1.4)), совпадает с множеством перестановок $\tau\sigma$, где $\sigma \in \{\sigma\}$. Обратимся к нашей модели с двумя колоннами автомобилей. Утверждение примет следующий очевидный вид.

Если при каком-либо перестроении автомобиль с номером k из первой колонны окажется непосредственно перед автомобилем с номером l из второй колонны, то легко можно указать другое перестроение, в результате которого эти автомобили меняются местами, в то время как порядок движения остальных сохранится.

Таким образом, так как $\operatorname{sgn} \tau\sigma = -\operatorname{sgn} \sigma$, то

$$\sum_{\sigma} (\operatorname{sgn} \sigma) (\tau \sigma) a = - \sum_{\sigma} (\operatorname{sgn} \tau \sigma) (\tau \sigma) a = - \sum_{\sigma} (\operatorname{sgn} \sigma) \sigma a. \quad (6.1.8)$$

Подставляя (6.1.7) и (6.1.8) в (6.1.6), получим (6.1.5).

Примеры. 1°. Рассмотрим две линейные формы $f(\xi) \in A_1(V)$ и $g(\xi) \in A_1(V)$. Внешним произведением этих форм является билинейная форма

$$f \wedge g = \sum_{\sigma} (\operatorname{sgn} \sigma) \sigma f(\xi_1) g(\xi_2) = f(\xi_1) g(\xi_2) - g(\xi_1) f(\xi_2).$$

2°. Пусть $f(\xi) \in A_1(V)$, $g(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_q) \in A_q(V)$. Внешним произведением $\omega = f \wedge g$ будет $(q+1)$ -форма, аргументы которой мы обозначим через $\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_q$:

$$\begin{aligned} \omega &= \sum_{\sigma} (\operatorname{sgn} \sigma) \sigma f(\xi_0) g(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_q) = \\ &= \sum_{i=0}^q (-1)^i f(\xi_i) g(\xi_0, \dots, \xi_{i-1}, \xi_{i+1}, \dots, \xi_q). \end{aligned}$$

6. Свойства внешнего произведения знакопеременных форм.

1°. Линейность:

а) если $\omega^p \in A_p(V)$, $\omega^q \in A_q(V)$, то для любого вещественного числа λ

$$(\lambda \omega^p) \wedge \omega^q = \omega^p \wedge (\lambda \omega^q) = \lambda (\omega^p \wedge \omega^q);$$

б) если $\omega_1^p \in A_p(V)$, $\omega_2^p \in A_p(V)$ и $\omega^q \in A_q(V)$, то

$$(\omega_1^p + \omega_2^p) \wedge \omega^q = \omega_1^p \wedge \omega^q + \omega_2^p \wedge \omega^q.$$

Доказательство очевидно.

2°. Антикоммутативность: если $\omega^p \in A_p(V)$ и $\omega^q \in A_q(V)$, то $\omega^p \wedge \omega^q = (-1)^{pq} \omega^q \wedge \omega^p$.

Доказательство. Пусть

$$\omega^p \wedge \omega^q = \omega(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{p+q}).$$

Легко видеть, что

$$\omega^q \wedge \omega^p = \omega(\xi_{p+1}, \xi_{p+2}, \dots, \xi_{p+q}, \xi_1, \dots, \xi_p).$$

Убедимся в том, что перестановку $(\xi_{p+1}, \dots, \xi_{p+q}, \xi_1, \dots, \xi_p)$ можно получить из векторов $(\xi_1, \dots, \xi_{p+q})$ с помощью pq последовательных транспозиций. Вектор ξ_{p+1} можно передвинуть на первое место, используя p транспозиций. Затем с помощью такого же числа транспозиций передвинем на второе место вектор ξ_{p+2} и т. д. Всего мы передвинем q векторов, используя каждый раз p транспозиций, т. е. число всех транспозиций равно pq . В таком случае антикоммутативность будет следовать из знакосохраненности внешнего произведения.

3°. Ассоциативность: если $\omega^p \in A_p(V)$, $\omega^q \in A_q(V)$, $\omega^r \in A_r(V)$, то $(\omega^p \wedge \omega^q) \wedge \omega^r = \omega^p \wedge (\omega^q \wedge \omega^r)$.

Доказательство. Пусть $\sigma \in \Sigma_{p+q+r}$. Рассмотрим величину

$$\begin{aligned} \omega = \sum_{\sigma} (\operatorname{sgn} \sigma) \sigma [\omega^p(\xi_1, \dots, \xi_p) \omega^q(\xi_{p+1}, \dots, \xi_{p+q}) \times \\ \times \omega^r(\xi_{p+q+1}, \dots, \xi_{p+q+r})]. \end{aligned} \quad (6.1.9)$$

Сумма (6.1.9) будет равна $(\omega^p \wedge \omega^q) \wedge \omega^r$, если вначале произвести суммирование по всем перестановкам, оставляющим без изменения числа $p+q+1$, $p+q+2$, ..., $p+q+r$ и удовлетворяющим условию (6.1.4), а затем просуммировать по всем перестановкам, сохраняющим получившийся порядок первых $p+q$ аргументов и порядок аргументов $\xi_{p+q+1}, \dots, \xi_{p+q+r}$.

Аналогично можно получить величину $\omega^p \wedge (\omega^q \wedge \omega^r)$.

Покажем, что в обоих случаях получается сумма по всем перестановкам, удовлетворяющим условиям

$$\left. \begin{aligned} \sigma(1) < \sigma(2) < \dots < \sigma(p); \\ \sigma(p+1) < \sigma(p+2) < \dots < \sigma(p+q); \\ \sigma(p+q+1) < \dots < \sigma(p+q+r). \end{aligned} \right\} \quad (6.1.10)$$

Для этого снова обратимся к нашей модели с колоннами автомобилей. Предположим, что по дороге движутся три ко-

лонны автомобилей, в первой из которых p , во второй q , а в третьей r машин. Один из способов перестроения этих трех колонн в одну заключается в том, что вначале сливаются первая и вторая колонны, а затем полученная соединяется с третьей. При другом способе вначале сливаются вторая и третья колонны, а к ним присоединяется первая. Очевидно, перестановка σ , получаемая в результате любого из этих перестроений, удовлетворяет условию (6.1.10), и, наоборот, любая перестановка, удовлетворяющая условию (6.1.10), может быть получена как с помощью первого, так и с помощью второго способа перестроения. Это и означает совпадение $(\omega^p \wedge \omega^q) \wedge \omega^r$ и $\omega^p \wedge (\omega^q \wedge \omega^r)$.

Ассоциативность внешнего умножения дает возможность рассматривать любое конечное произведение

$$\omega_1 \wedge \omega_2 \wedge \dots \wedge \omega_m, \text{ где } \omega_i \in A_{p_i}(V).$$

Пример. Пусть $a_1(\xi), a_2(\xi), \dots, a_m(\xi)$ — линейные формы. Тогда

$$a_1 \wedge a_2 \wedge \dots \wedge a_m = \sum_{\sigma} (\operatorname{sgn} \sigma) \sigma [a_1(\xi_1) a_2(\xi_2) \dots a_m(\xi_m)], \quad (6.1.11)$$

где суммирование производится по всем перестановкам $\sigma \in \Sigma_m$.

Это равенство легко проверяется с помощью индукции. Заметим, что если ввести матрицу $\{a_i(\xi_j)\}$, то равенство (6.1.11) можно переписать в виде

$$(a_1 \wedge a_2 \wedge \dots \wedge a_m)(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m) = \det \{a_i(\xi_j)\}. \quad (6.1.12)$$

7. Базис в пространстве знакопеременных форм. Выберем какой-либо базис $\{e_i\}_{i=1}^n$ в пространстве V и обозначим через $\{e^i\}_{i=1}^n$ сопряженный к нему базис в пространстве $L(V)$. Напомним, что $e^i(\xi)$ — линейная форма, которая на элементах базиса $\{e_j\}$ принимает значение $e^i(e_j) = \delta_{ij}$.

В п. 3 мы показали, что всевозможные произведения

$$e^{i_1}(\xi_1) e^{i_2}(\xi_2) \dots e^{i_p}(\xi_p)$$

образуют базис в $L_p(V)$. Поскольку $A_p(V) \subset L_p(V)$, то каждая знакопеременная p -форма может быть разложена единственным образом в линейную комбинацию указанных произведений. Однако эти произведения не образуют базиса в $A_p(V)$, поскольку они не являются знакопеременными p -формами, т. е. не принадлежат $A_p(V)$. Тем не менее с помощью внешнего умножения из них можно сконструировать базис в $A_p(V)$.

Теорема 6.6. Пусть $\{e_i\}_{i=1}^n$ — базис в пространстве V , $\{e^i\}_{i=1}^n$ — сопряженный базис в пространстве $L(V)$. Любая зна-

копеременная p -форма $\omega \in A_p(V)$ может быть представлена, и притом единственным образом, в виде

$$\omega = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_p \leq n} \omega_{i_1 i_2 \dots i_p} e^{i_1} \wedge e^{i_2} \wedge \dots \wedge e^{i_p}. \quad (6.1.13)$$

Каждое слагаемое суммы в правой части (6.1.13) представляет собой произведение постоянной $\omega_{i_1 i_2 \dots i_p}$ на знакопеременную p -форму $e^{i_1} \wedge e^{i_2} \wedge \dots \wedge e^{i_p}$.

Доказательство. В силу результатов п. 4 можно записать:

$$\omega = \sum_{i_1=1}^n \dots \sum_{i_p=1}^n \omega_{i_1 i_2 \dots i_p} e^{i_1} e^{i_2} \dots e^{i_p}, \quad (6.1.14)$$

где числа $\omega_{i_1 i_2 \dots i_p} = \omega(e^{i_1}, e^{i_2}, \dots, e^{i_p})$ определены однозначно.

Так как форма $\omega(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_p)$ знакопеременна, то для любой перестановки $\sigma \in \Sigma_p$

$$\omega(\xi_{\sigma(1)}, \xi_{\sigma(2)}, \dots, \xi_{\sigma(p)}) = (\operatorname{sgn} \sigma) \omega(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_p).$$

Следовательно,

$$\omega_{i_{\sigma(1)} i_{\sigma(2)} \dots i_{\sigma(p)}} = (\operatorname{sgn} \sigma) \omega_{i_1 i_2 \dots i_p}. \quad (6.1.15)$$

Сгруппируем слагаемые в сумме (6.1.14), отличающиеся перестановкой индексов $i_1, i_2, \dots, i_p$, и воспользуемся равенством (6.1.15). Получим

$$\begin{aligned} \omega &= \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_p} \sum_{\sigma} \omega_{i_{\sigma(1)} \dots i_{\sigma(p)}} e^{i_{\sigma(1)}} \dots e^{i_{\sigma(p)}} = \\ &= \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_p} \omega_{i_1 i_2 \dots i_p} \left[\sum_{\sigma} (\operatorname{sgn} \sigma) e^{i_{\sigma(1)}} \dots e^{i_{\sigma(p)}} \right]. \end{aligned} \quad (6.1.16)$$

В силу примера из п. 6 сумма, стоящая в квадратных скобках, есть $e^{i_1} \wedge e^{i_2} \wedge \dots \wedge e^{i_p}$. Теорема доказана.

Следствие 1. *Элементы $e^{i_1} \wedge e^{i_2} \wedge \dots \wedge e^{i_p}$ ($1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n$) образуют базис в пространстве $A_p(V)$. Этот базис пуст для $p > n$ и состоит из одного элемента, если $p = n$.*

Следствие 2. *Размерность пространства $A_p(V)$ равна C_n^p .*

В дальнейшем, как правило, мы будем считать, что выбранный базис $e_1, e_2, \dots, e_n$ нами зафиксирован, и линейные формы $e^i(\xi)$ будем обозначать символом $e^i(\xi) = \xi^i$. Тогда любая форма $\omega \in A_p(V)$ примет вид

$$\omega(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_p) = \sum_{i_1 < \dots < i_p} \omega_{i_1 \dots i_p} \xi^{i_1} \wedge \dots \wedge \xi^{i_p}. \quad (6.1.17)$$

Примеры. 1°.

$$\begin{aligned}\xi^1 \wedge \xi^2 &= (e^1 \wedge e^2)(\xi_1, \xi_2) = \sum_{\sigma} (\operatorname{sgn} \sigma) \sigma [e^1(\xi_1) e^2(\xi_2)] = \\ &= e^1(\xi_1) e^2(\xi_2) - e^1(\xi_2) e^2(\xi_1) = \xi_1^1 \xi_2^2 - \xi_2^1 \xi_1^2,\end{aligned}$$

где ξ_i^j — j -й коэффициент в разложении вектора ξ_i по базису $\{e_j\}$.

$$2^\circ. \xi^1 \wedge \xi^2 \wedge \dots \wedge \xi^n = \det \{\xi_i^j\},$$

$$\text{где } \xi_i = \sum_{j=1}^n \xi_i^j e_j.$$

§ 2. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ФОРМЫ

1. Основные обозначения. Рассмотрим произвольную открытую область G n -мерного евклидова пространства E^n . Точки области G будем обозначать символами $x = (x^1, x^2, \dots, x^n)$, $y = (y^1, y^2, \dots, y^n)$ и т. д.

Определение. Дифференциальной формой степени p , определенной в области G , будем называть функцию $\omega(x, \xi_1, \xi_2, \dots, \xi_p)$, которая при каждом фиксированном $x \in G$ представляет собой знакпеременную p -форму из $A_p(E^n)$.

Множество всех дифференциальных p -форм в области G обозначим через $\Omega_p(G) = \Omega_p(G, E^n)$.

Мы будем считать, что при фиксированных $\xi_1, \dots, \xi_p \in E^n$ p -форма ω представляет собой бесконечно дифференцируемую в G функцию. Используя результаты § 1, мы можем каждую p -форму ω записать в виде

$$\omega = \sum_{i_1 < \dots < i_p} \omega_{i_1 \dots i_p} \xi^{i_1} \wedge \dots \wedge \xi^{i_p}. \quad (6.1.18)$$

Всюду в дальнейшем вектор ξ будем обозначать символом $dx = (dx^1, dx^2, \dots, dx^n)$, а векторы ξ_k — символами $d_k x = (d_k x^1, d_k x^2, \dots, d_k x^n)$. В качестве базиса в E^n выберем векторы $e_k = \{0, 0, \dots, 1, 0, \dots, 0\}$, где единица стоит на k -м месте. Элементами сопряженного базиса будут функции $e^k(\xi) = e^k(dx)$, определяемые равенствами $e^k(dx) = dx^k$. Тогда дифференциальная форма (6.1.18) примет вид

$$\omega(x, d_1 x, \dots, d_p x) = \sum_{i_1 < \dots < i_p} \omega_{i_1 \dots i_p}(x) dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_p}.$$

Примеры. 1°. Дифференциальная 0-форма — это любая функция, определенная в области G (и, в силу наших предположений, бесконечно дифференцируемая в G).

2°. Дифференциальная 1-форма имеет вид

$$\omega(x, dx) = \sum_{k=1}^n \omega_k(x) dx^k.$$

В частности, когда $n=1$, $\omega(x, dx) = f(x) dx$. Дифференциальную форму степени 1 называют также линейной дифференциальной формой.

3°. Дифференциальная 2-форма имеет вид

$$\omega(x, d_1x, d_2x) = \sum_{i < k} \omega_{ik}(x) dx^i \wedge dx^k.$$

По определению

$$\begin{aligned} dx^i \wedge dx^k &= (e^i \wedge e^k)(d_1x, d_2x) = e^i(d_1x) e^k(d_2x) - e^i(d_2x) e^k(d_1x) = \\ &= d_1x^i d_2x^k - d_2x^i d_1x^k = \begin{vmatrix} d_1x^i & d_1x^k \\ d_2x^i & d_2x^k \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

В частности, при $n=2$ получим

$$\omega(x, d_1x, d_2x) = f(x) \begin{vmatrix} d_1x^1 & d_1x^2 \\ d_2x^1 & d_2x^2 \end{vmatrix}.$$

Определитель равен элементу площади, соответствующему векторам d_1x и d_2x .

В случае, когда $n=3$, обозначая $\omega_{12}=R$, $\omega_{23}=P$, $\omega_{13}=-Q$, получим

$$\omega = P dx^2 \wedge dx^3 - Q dx^1 \wedge dx^3 + R dx^1 \wedge dx^2 = \begin{vmatrix} P & Q & R \\ d_1x^1 & d_1x^2 & d_1x^3 \\ d_2x^1 & d_2x^2 & d_2x^3 \end{vmatrix}.$$

4°. Дифференциальная 3-форма в трехмерном пространстве имеет вид

$$\omega(x, d_1x, d_2x, d_3x) = f(x) dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3 = f(x) \begin{vmatrix} d_1x^1 & d_1x^2 & d_1x^3 \\ d_2x^1 & d_2x^2 & d_2x^3 \\ d_3x^1 & d_3x^2 & d_3x^3 \end{vmatrix}.$$

Определитель равен элементу объема, отвечающему векторам d_1x, d_2x, d_3x .

2. Внешний дифференциал.

Определение. Внешним дифференциалом r -линейной дифференциальной формы $\omega \in \Omega_r(G)$ будем называть форму $d\omega \in \Omega_{r+1}(G)$, определяемую соотношением

$$d\omega = \sum_{i_1 < \dots < i_p} d\omega_{i_1 \dots i_p} \wedge dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_p},$$

где

$$d\omega_{i_1 \dots i_p} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial \omega_{i_1 \dots i_p}}{\partial x^k} dx^k.$$

Таким образом, если

$$\omega = \sum_{i_1 < \dots < i_p} \omega_{i_1 \dots i_p} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_p},$$

то

$$d\omega = \sum_{k=1}^n \sum_{i_1 < \dots < i_p} \frac{\partial \omega_{i_1 \dots i_p}}{\partial x^k} dx^k \wedge dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_p}.$$

Примеры. 1°. Дифференциал формы степени нуль (т. е. функции $f(x)$) имеет вид

$$df(x) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x^k} dx^k.$$

2°. Вычислим дифференциал от линейной формы

$$\omega = \omega(x, dx) = \sum_{i=1}^n \omega_i(x) dx^i.$$

Получим

$$d\omega = d\omega(x, dx) = \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n \frac{\partial \omega_i(x)}{\partial x^k} dx^k \wedge dx^i.$$

Так как $dx^k \wedge dx^i = -dx^i \wedge dx^k$ и $dx^k \wedge dx^k = 0$, то

$$\begin{aligned} d\omega &= \sum_{k < i} \frac{\partial \omega_i}{\partial x^k} dx^k \wedge dx^i + \sum_{i < k} \frac{\partial \omega_i}{\partial x^k} dx^k \wedge dx^i = \\ &= \sum_{k < i} \frac{\partial \omega_i}{\partial x^k} dx^k \wedge dx^i - \sum_{k < i} \frac{\partial \omega_k}{\partial x^i} dx^k \wedge dx^i = \\ &= \sum_{k < i} \left(\frac{\partial \omega_i}{\partial x^k} - \frac{\partial \omega_k}{\partial x^i} \right) dx^k \wedge dx^i. \end{aligned}$$

В частности, когда $n=2$, для $\omega = Pdx^1 + Qdx^2$ получим

$$d\omega = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx^1 \wedge dx^2.$$

3. Свойства внешнего дифференциала. Непосредственно из определения вытекают следующие свойства:

- 1) если $\omega_1 \in \Omega_p(G)$, $\omega_2 \in \Omega_p(G)$, то $d(\omega_1 + \omega_2) = d\omega_1 + d\omega_2$;
 2) если $\omega \in \Omega_p(G)$ и λ — вещественное число, то $d(\lambda\omega) = \lambda d\omega$;
 3) если $\omega_1 \in \Omega_p(G)$, $\omega_2 \in \Omega_q(G)$, то

$$d(\omega_1 \wedge \omega_2) = d\omega_1 \wedge \omega_2 + (-1)^p \omega_1 \wedge d\omega_2.$$

Докажем свойство 3). Пусть

$$\omega = \sum_{i_1 < \dots < i_p} \omega_{i_1 \dots i_p} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_p}.$$

Введем следующее обозначение:

$$\frac{\partial \omega}{\partial x^k} = \sum_{i_1 < \dots < i_p} \frac{\partial \omega_{i_1 \dots i_p}}{\partial x^k} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_p}.$$

Тогда $d\omega$ можно записать в виде

$$d\omega = \sum_{k=1}^n dx^k \wedge \frac{\partial \omega}{\partial x^k}.$$

Вспомним, что

$$\omega = \omega_1 \wedge \omega_2 = (-1)^{pq} \omega_2 \wedge \omega_1.$$

Далее,

$$\frac{\partial \omega}{\partial x^k} = \frac{\partial \omega_1}{\partial x^k} \wedge \omega_2 + \omega_1 \wedge \frac{\partial \omega_2}{\partial x^k} = \frac{\partial \omega_1}{\partial x^k} \wedge \omega_2 + (-1)^{pq} \frac{\partial \omega_2}{\partial x^k} \wedge \omega_1.$$

Тогда

$$\begin{aligned} d\omega &= \sum_{k=1}^n dx^k \wedge \frac{\partial \omega}{\partial x^k} = \sum_{k=1}^n dx^k \wedge \left(\frac{\partial \omega_1}{\partial x^k} \wedge \omega_2 + \right. \\ &\quad \left. + (-1)^{pq} \frac{\partial \omega_2}{\partial x^k} \wedge \omega_1 \right) = d\omega_1 \wedge \omega_2 + (-1)^{pq} d\omega_2 \wedge \omega_1. \end{aligned}$$

Поскольку $d\omega_2$ есть $(q+1)$ -форма, то

$$d\omega_2 \wedge \omega_1 = (-1)^{p(q+1)} \omega_1 \wedge d\omega_2.$$

Отсюда $d\omega = d\omega_1 \wedge \omega_2 + (-1)^p \omega_1 \wedge d\omega_2$.

Основное свойство внешнего дифференциала:

$$d(d\omega) = 0.$$

Доказательство. Предположим вначале, что ω — форма степени 0, т. е. $\omega(x) = f(x)$. Тогда

$$d(df) = d \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x^i} dx^i = \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x^k \partial x^i} dx^k \wedge dx^i.$$

Так как $dx^k \wedge dx^i = -dx^i \wedge dx^k$, это равенство можно переписать в виде

$$d(df) = \sum_{i < k} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^k} - \frac{\partial^2 f}{\partial x^k \partial x^i} \right) dx^i \wedge dx^k,$$

откуда и следует, что $d(df) = 0$.

Пусть теперь

$$\omega = \sum_{i_1 < \dots < i_p} \omega_{i_1 \dots i_p} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_p}.$$

Тогда

$$d\omega = \sum_{k=1}^n \sum_{i_1 < \dots < i_p} d\omega_{i_1 \dots i_p} \wedge dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_p}.$$

Заметим, что каждый член суммы представляет собой внешнее произведение дифференциалов форм степени 0, а именно форм $\omega_{i_1 \dots i_p}(x)$, $e^{i_1}(dx)$, ..., $e^{i_p}(dx)$. Остается применить свойство 3) и воспользоваться тем, что для формы степени 0 основное свойство доказано.

§ 3. ДИФФЕРЕНЦИРУЕМЫЕ ОТОБРАЖЕНИЯ

1. Определение дифференцируемых отображений. Рассмотрим произвольную m -мерную область D евклидова пространства E^m и n -мерную область $G \subset E^n$. Точки области D будем обозначать символами $t = (t^1, t^2, \dots, t^m)$, а точки области G символами $x = (x^1, x^2, \dots, x^n)$.

Будем говорить, что φ отображает D в G , если

$$\varphi = \{\varphi^1, \varphi^2, \dots, \varphi^n\},$$

где $\varphi^k(t)$ определены в области D , а векторы x с координатами $x^k = \varphi^k(t)$ лежат в области G .

Определим отображение φ^* , которое переводит $\Omega_p(G)$ в $\Omega_p(D)$ для любого p , $0 \leq p \leq n$. При этом мы будем считать, что каждая компонента $\varphi^k(t)$ отображения φ является бесконечно дифференцируемой.

Определение. Пусть φ — отображение $D \subset E^m$ в $G \subset E^n$. Обозначим через φ^* отображение, которое для всех $0 \leq p \leq n$ действует из $\Omega_p(G)$ в $\Omega_p(D)$ по следующему правилу: если

$$\omega = \sum_{i_1 < \dots < i_p} \omega_{i_1 \dots i_p} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_p},$$

то

$$\varphi^*(\omega) = \sum_{i_1 < \dots < i_p} \omega_{i_1 \dots i_p}(\varphi(t)) \varphi^*(dx^{i_1}) \wedge \dots \wedge \varphi^*(dx^{i_p}),$$

где

$$\varphi^*(dx^i) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial \varphi^i}{\partial t^k} dt^k.$$

Примеры. 1°. Пусть ω — форма степени 0, т. е. $\omega = f(x)$. Тогда

$$\varphi^*(f) = f(\varphi(t)).$$

2°. Пусть φ отображает n -мерную область $D \subset E^n$ в n -мерную область $G \subset E^n$, и пусть ω — следующая n -форма:

$$\omega = dx^1 \wedge dx^2 \wedge \dots \wedge dx^n.$$

Тогда

$$\begin{aligned} \varphi^*(\omega) &= \left(\sum_{k_1=1}^n \frac{\partial \varphi^1}{\partial t^{k_1}} dt^{k_1} \right) \wedge \dots \wedge \left(\sum_{k_n=1}^n \frac{\partial \varphi^n}{\partial t^{k_n}} dt^{k_n} \right) = \\ &= \sum_{k_1=1}^n \dots \sum_{k_n=1}^n \frac{\partial \varphi^1}{\partial t^{k_1}} \dots \frac{\partial \varphi^n}{\partial t^{k_n}} dt^{k_1} \wedge \dots \wedge dt^{k_n} = \\ &= dt^1 \wedge \dots \wedge dt^n \sum_{\sigma} (\operatorname{sgn} \sigma) \frac{\partial \varphi^1}{\partial t^{\sigma(1)}} \dots \frac{\partial \varphi^n}{\partial t^{\sigma(n)}} = \\ &= dt^1 \wedge \dots \wedge dt^n \det \left\{ \frac{\partial \varphi^i}{\partial t^j} \right\}. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$\varphi^*(dx^1 \wedge dx^2 \wedge \dots \wedge dx^n) = \frac{D(\varphi^1, \varphi^2, \dots, \varphi^n)}{D(t^1, t^2, \dots, t^n)} dt^1 \wedge dt^2 \wedge \dots \wedge dt^n.$$

Замечание. Форму $\varphi^*(\omega)$ называют дифференциальной формой, получающейся из формы ω при помощи замены переменных φ .

2. Свойства отображения φ^* . Справедливы следующие свойства отображения φ^* .

1°. Если $\omega_1 \in \Omega_p(G)$, $\omega_2 \in \Omega_q(G)$, то

$$\varphi^*(\omega_1 \wedge \omega_2) = \varphi^*(\omega_1) \wedge \varphi^*(\omega_2).$$

Доказательство. Пусть

$$\omega_1 = \sum_{i_1 < \dots < i_p} a_{i_1 \dots i_p}(x) dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_p},$$

$$\omega_2 = \sum_{k_1 < \dots < k_q} b_{k_1 \dots k_q}(x) dx^{k_1} \wedge \dots \wedge dx^{k_q}.$$

Тогда

$$\begin{aligned} \omega_1 \wedge \omega_2 &= \sum_{i_1 < \dots < i_p} \sum_{k_1 < \dots < k_q} a_{i_1 \dots i_p}(x) b_{k_1 \dots k_q}(x) \times \\ &\times dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_p} \wedge dx^{k_1} \wedge \dots \wedge dx^{k_q} \end{aligned}$$

и, следовательно,

$$\begin{aligned} \varphi^*(\omega_1 \wedge \omega_2) &= \sum_i \sum_k a_i(\varphi(t)) b_k(\varphi(t)) \varphi^*(dx^{i_1}) \wedge \dots \wedge \varphi^*(dx^{k_q}) = \\ &= \sum_i a_i(\varphi) \varphi^*(dx^{i_1}) \wedge \dots \wedge \varphi^*(dx^{i_p}) \wedge \left[\sum_k b_k(\varphi) \varphi^*(dx^{k_1}) \wedge \right. \\ &\quad \left. \wedge \dots \wedge \varphi^*(dx^{k_q}) \right] = \varphi^*(\omega_1) \wedge \varphi^*(\omega_2). \end{aligned}$$

2°. Если $\omega \in \Omega_p(G)$, то $\varphi^*(d\omega) = d\varphi^*(\omega)$.

Доказательство. Докажем это равенство сначала для $p=0$, т. е. для $\omega = f(x)$. Получим

$$\begin{aligned} d\omega &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x^i} dx^i, \quad \varphi^*(\omega) = f(\varphi(t)), \\ d\varphi^*(\omega) &= \sum_{k=1}^m \frac{\partial}{\partial t^k} f(\varphi(t)) dt^k = \sum_{k=1}^m \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x^i} \frac{\partial \varphi^i}{\partial t^k} dt^k = \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x^i} \varphi^*[(dx^i)] = \varphi^*(d\omega). \end{aligned}$$

Для произвольного p проведем доказательство по индукции. Пусть

$$\omega = f_{i_1 \dots i_p}(x) dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_p}. \quad \text{Тогда } d\omega = df_{i_1 \dots i_p} \wedge [dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_p}].$$

Поэтому по свойству 1°

$$\varphi^*(d\omega) = \varphi^*(df) \wedge \varphi^*(dx^{i_1}) \wedge \dots \wedge \varphi^*(dx^{i_p}).$$

С другой стороны,

$$\begin{aligned} d\varphi^*(\omega) &= d\varphi^*[(f dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_{p-1}}) \wedge dx^{i_p}] = \\ &= d[\varphi^*(f dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_{p-1}}) \wedge \varphi^*(dx^{i_p})]. \end{aligned}$$

Далее, в силу свойства 3) внешнего дифференциала

$$d\varphi^*(\omega) = d\varphi^*(f dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_{p-1}}) \wedge \varphi^*(dx^{i_p}) + \\ + (-1)^{p-1} \varphi^*(f dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_{p-1}}) \wedge d\varphi^*(dx^{i_p}).$$

Заметим, что $\varphi^*(dx^{i_p}) = d\varphi^*(x^{i_p})$ в силу только что доказанного, а тогда по основному свойству внешнего дифференциала $d\varphi^*(dx^{i_p}) = 0$.

По предположению индукции, справедливому для $p-1$,

$$d\varphi^*(f dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_{p-1}}) = \varphi^*(df \wedge dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_{p-1}}).$$

В результате получим

$$d\varphi^*(\omega) = \varphi^*(df \wedge dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_{p-1}}) \wedge \varphi^*(dx^{i_p}),$$

и по свойству 1°

$$d\varphi^*(\omega) = \varphi^*(df \wedge dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_p}).$$

3°. Транзитивность. Рассмотрим открытые области $U \subset E^l$, $V \subset E^m$, $W \subset E^n$, точки которых соответственно $u = (u^1, u^2, \dots, u^l)$, $v = (v^1, v^2, \dots, v^m)$, $w = (w^1, w^2, \dots, w^n)$. Пусть φ отображает $U \rightarrow V$, а ψ отображает $V \rightarrow W$. Через $\psi \circ \varphi$ обозначим отображение, называемое композицией, которое действует по правилу

$$(\psi \circ \varphi)(u) = \psi[\varphi(u)].$$

Аналогично введем композицию $\varphi^* \circ \psi^*$, которая для любого p переводит $\Omega_p(W)$ в $\Omega_p(U)$, т. е.

$$(\varphi^* \circ \psi^*)(\omega) = \varphi^*[\psi^*(\omega)].$$

Справедливо следующее равенство:

$$(\psi \circ \varphi)^* = \varphi^* \circ \psi^*.$$

Доказательство. Обозначим $\beta = \psi \circ \varphi$. Это означает, что $\beta = (\beta^1, \beta^2, \dots, \beta^n)$, где $\beta^k = \psi^k(\varphi^1, \varphi^2, \dots, \varphi^m)$.

Проведем доказательство сначала для линейной формы $d\omega^k \in \Omega_1(W)$. Получим

$$\beta^*(d\omega^k) = d\beta^*(\omega^k) = d\beta^k(u) = \sum_{i=1}^l \frac{\partial \beta^k}{\partial u^i} du^i = \sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^m \frac{\partial \psi^k}{\partial v^j} \frac{\partial \varphi^j}{\partial u^i} du^i.$$

Далее

$$(\varphi^* \circ \psi^*)(d\omega^k) = \varphi^*[\psi^*(d\omega^k)] = \varphi^*[d\psi^*(\omega^k)] = \\ = \varphi^*(d\psi^k) = \varphi^*\left(\sum_{j=1}^m \frac{\partial \psi^k}{\partial v^j} dv^j\right) = \sum_{j=1}^m \frac{\partial \psi^k}{\partial v^j} \varphi^*(dv^j).$$

Но

$$\varphi^*(dv^j) = d\varphi^*(v^j) = d\varphi^j = \sum_{i=1}^l \frac{\partial \varphi^j}{\partial u^i} du^i,$$

поэтому

$$(\varphi^* \circ \psi^*)(dw^k) = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^l \frac{\partial \psi^k}{\partial v^j} \frac{\partial \varphi^j}{\partial u^i} du^i.$$

Равенство доказано. Отсюда следует справедливость свойства 3° для любой линейной формы. Далее доказательство проведем по индукции. Пусть

$$\omega = f(\omega) dw^{i_1} \wedge \dots \wedge dw^{i_p} \in \Omega_p(W).$$

$$\begin{aligned} \text{Тогда } \beta^*(\omega) &= \beta^*(f dw^{i_1} \wedge \dots \wedge dw^{i_{p-1}}) \wedge \beta^*(dw^{i_p}) = \\ &= (\varphi^* \circ \psi^*)(f dw^{i_1} \wedge \dots \wedge dw^{i_{p-1}}) \wedge (\varphi^* \circ \psi^*)(dw^{i_p}) = \\ &= (\varphi^* \circ \psi^*)(f dw^{i_1} \wedge \dots \wedge dw^{i_p}) = (\varphi^* \circ \psi^*)(\omega). \end{aligned}$$

§ 4. ИНТЕГРИРОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ФОРМ

1. Определения. Обозначим через I^m единичный куб в евклидовом пространстве E^m :

$$I^m = \{t \in E^m, 0 \leq t^i \leq 1, i=1, 2, \dots, m\}.$$

Под отображением φ куба I^m в n -мерную область $G \subset E^n$ будем понимать отображение в G некоторой области $D \subset E^m$, содержащей внутри себя I^m . Аналогично дифференциальной p -формой ω , определенной в I^m , будем называть p -форму, определенную в некоторой области $D \subset E^m$, содержащей I^m .

Определение 1. *Интегралом от p -формы*

$$\omega = f(t) dt^1 \wedge dt^2 \wedge \dots \wedge dt^p,$$

определенной в кубе I^p , по кубу I^p будем называть величину

$$\int_{I^p} \omega = \int_0^1 \dots \int_0^1 f(t) dt^1 dt^2 \dots dt^p.$$

Нашей ближайшей целью является определение интеграла от дифференциальной формы по любой поверхности. Естественно, что при этом степень формы будет совпадать с размерностью поверхности. Под поверхностью мы будем при этом понимать отображение единичного куба той же размерности (напомним, что понятие отображения включает в себя как область

значений, так и закон соответствия). Впрочем, иногда мы будем называть поверхностью только лишь образ куба.

Определение 2. Назовем m -мерным сингулярным кубом в пространстве E^n ($m \leq n$) дифференцируемое отображение куба I^m в E^n . Таким образом, обозначая сингулярный куб через C , можно записать:

$$C = \varphi: I^m \rightarrow E^n.$$

Будем говорить, что сингулярный куб C содержится в $G \subset E^n$, если $\varphi(I^m) \subset G$.

Теперь можно определить интеграл от любой p -формы $\omega \in \Omega_p(G)$ по любому p -мерному сингулярному кубу $C \subset G$.

Определение 3. Интегралом от формы $\omega \in \Omega_p(G)$ по сингулярному кубу $C = \varphi: I^p \rightarrow E^n$, содержащемуся в G , назовем величину

$$\int_C \omega = \int_{I^p} \varphi^*(\omega).$$

Убедимся в том, что интеграл от p -формы ω по p -мерному сингулярному кубу C зависит лишь от образа $\varphi(I^p)$, а не от закона соответствия φ .

Прежде всего рассмотрим подробнее определение интеграла от ω по сингулярному кубу C .

Пусть $\omega \in \Omega_p(G)$ имеет вид $\omega = f(x) dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_p}$, тогда $\varphi^* \times \times (\omega) = f[\varphi(t)] \varphi^*(dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_p})$.

В силу примера 2° п. 1 § 3 получаем

$$\varphi^*(\omega) = f[\varphi(t)] \frac{D(\varphi^{i_1}, \varphi^{i_2}, \dots, \varphi^{i_p})}{D(t^1, t^2, \dots, t^p)} dt^1 \wedge dt^2 \wedge \dots \wedge dt^p.$$

Следовательно,

$$\int_C \omega = \int_{I^p} f[\varphi(t)] \frac{D(\varphi^{i_1}, \dots, \varphi^{i_p})}{D(t^1, \dots, t^p)} dt^1 \wedge \dots \wedge dt^p.$$

Определение 4. Пусть $C_1 = \varphi_1: I^p \rightarrow E^n$ и $C_2 = \varphi_2: I^p \rightarrow E^n$ — два сингулярных куба. Будем говорить, что $C_1 = C_2$, если существует взаимно однозначное отображение τ куба I^p на себя такое, что:

- 1) $\varphi_1(t) = \varphi_2[\tau(t)]$;
- 2) $\frac{D(\tau^1, \tau^2, \dots, \tau^p)}{D(t^1, t^2, \dots, t^p)} > 0$.

Ясно, что если $C_1 = C_2$, то и $C_2 = C_1$, так как обратное отображение τ^{-1} будет удовлетворять необходимым требованиям.

Будем говорить, что $C_1 = -C_2$, если в условии 2) функциональный определитель всюду меньше нуля (очевидно, при этом $C_2 = -C_1$). Иногда в этом случае говорят, что C_1 и C_2 отличаются ориентацией.

Справедливо следующее

Утверждение. Если $C_1 = C_2$, то

$$\int_{C_1} \omega = \int_{C_2} \omega.$$

Доказательство. Проведем доказательство для случая, когда

$$\omega = f(x) dx^1 \wedge dx^2 \wedge \dots \wedge dx^p.$$

По определению

$$\int_{C_2} \omega = \int_{I^p} f[\varphi_2(t)] \frac{D(\varphi_2^1, \varphi_2^2, \dots, \varphi_2^p)}{D(t^1, t^2, \dots, t^p)} dt^1 \wedge \dots \wedge dt^p.$$

По условию существует отображение τ куба I^p на себя, удовлетворяющее условиям 1) и 2). Сделаем в интеграле замену переменной $t = \tau(s)$, $s \in I^p$. Получим $\varphi_2(t) = \varphi_2[\tau(s)] = \varphi_1(s)$ и

$$\begin{aligned} \int_{C_2} \omega &= \int_{I^p} f[\varphi_1(s)] \frac{D(\varphi_2^1, \varphi_2^2, \dots, \varphi_2^p)}{D(t^1, t^2, \dots, t^p)} \cdot \frac{D(\tau^1, \tau^2, \dots, \tau^p)}{D(s^1, s^2, \dots, s^p)} ds^1 \wedge \\ &\wedge ds^2 \wedge \dots \wedge ds^p = \int_{I^p} f[\varphi_1(s)] \frac{D(\varphi_2^1, \dots, \varphi_2^p)}{D(s^1, \dots, s^p)} ds^1 \wedge \dots \wedge ds^p = \int_{C_1} \omega. \end{aligned}$$

Аналогично можно показать, что если $C_1 = -C_2$, то

$$\int_{C_1} \omega = - \int_{C_2} \omega.$$

2. Дифференцируемые цепи. Нам понадобятся поверхности, которые распадаются на несколько кусков, каждый из которых является образом некоторого m -мерного куба. Примером такой поверхности может служить состоящая из двух окружностей граница кольца, лежащего на двумерной плоскости. При этом мы будем различать ориентации этих окружностей. В связи с этим весьма полезным оказывается введение линейных комбинаций сингулярных кубов с вещественными коэффициентами.

Определение 1. Будем называть p -мерной цепью C произвольный набор

$$\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k, C_1, C_2, \dots, C_k\},$$

где λ_i — вещественные числа, а C_i — p -мерные сингулярные кубы. При этом будем использовать обозначение

$$C = \lambda_1 C_1 + \dots + \lambda_k C_k.$$

Будем говорить, что C принадлежит G , если все C_i принадлежат G .

Множество p -мерных цепей образует линейное пространство, если ввести естественным образом операции сложения и умножения на вещественные числа.

Определение 2. Интегралом формы ω по p -мерной цепи C , содержащейся в G , назовем величину

$$\int_C \omega = \lambda_1 \int_{C_1} \omega + \lambda_2 \int_{C_2} \omega + \dots + \lambda_k \int_{C_k} \omega.$$

Теперь можно определить границу произвольного сингулярного куба. Для этого определим сначала границу единичного куба.

Определение 3. Границей куба I^p назовем $(p-1)$ -мерную цепь

$$\partial I^p = \sum_{i=1}^p (-1)^i [I_0^p(i) - I_1^p(i)],$$

где $I_\alpha^p(i)$ — пересечение куба I^p с гиперплоскостью $x^i = \alpha$ ($\alpha = 0, 1$).

Для того чтобы это определение было корректным, необходимо разъяснить, какой смысл вкладывается в утверждение о том, что $I_\alpha^p(i)$ является $(p-1)$ -мерным сингулярным кубом.

Построим каноническое отображение $\tilde{\varphi} = \tilde{\varphi}_i^{\alpha, p}$ куба I^{p-1} на куб $I_\alpha^p(i)$. Пусть $s = (s^1, s^2, \dots, s^{p-1}) \in I^{p-1}$. Положим

$$\tilde{\varphi}^k(s) = \begin{cases} s^k, & \text{если } 1 \leq k < i; \\ \alpha, & \text{если } k = i; \\ s^{k-1}, & \text{если } i < k \leq p. \end{cases}$$

Очевидно, $\tilde{\varphi} = (\tilde{\varphi}^1, \tilde{\varphi}^2, \dots, \tilde{\varphi}^p)$ отображает I^{p-1} на $I_\alpha^p(i)$ взаимно однозначно. В частности, при $\alpha = 0$ и $i = p$ отображение $\tilde{\varphi}$ является сужением на $I_0^p(p-1)$ тождественного отображения пространства E^p на себя.

Определение 4. Границей p -мерного сингулярного куба $C = \varphi: I^p \rightarrow E^n$ назовем $(p-1)$ -мерную цепь

$$\partial C = \sum_{i=1}^p (-1)^i [\varphi(I_0^p(i)) - \varphi(I_1^p(i))].$$

Таким образом, граница образа куба I^p является образом границы I^p с естественной ориентацией.

Примеры. 1°. Рассмотрим на плоскости квадрат I^2 . Очевидно, этот квадрат можно рассматривать как сингулярный куб, взяв в качестве φ тождественное отображение. На рис. 6.5 указана граница этого квадрата, причем если сторона квадрата входит в цепь ∂I^2 со знаком $+$, то направление стрелок совпадает с направлением возрастания параметра t^k , по которому производится интегрирование; если же сторона берется со знаком $-$, то направление стрелок является противоположным на-




Рис. 6.5




Рис. 6.6

правлению возрастания параметра t^k . Таким образом, наше соглашение о знаках приводит к обычному обходу границы против часовой стрелки.

2°. Рассмотрим сингулярный куб $C = \varphi: I^2 \rightarrow R^2$, где φ имеет вид

$$\varphi^1 = (a + Rt^1) \cos 2\pi t^2; \quad \varphi^2 = (a + Rt^1) \sin 2\pi t^2.$$

Легко видеть, что $\varphi(I^2)$ — кольцо, граница которого образована окружностями радиусов a и $a+R$. Выясним, что является границей сингулярного куба C . Очевидно, $\varphi(I_0^2(1))$ — окружность

$$\varphi_1 = a \cos 2\pi t^2; \quad \varphi_2 = a \sin 2\pi t^2.$$

Далее, $\varphi(I_1^2(1))$ — окружность радиуса $a+R$. Наконец, $\varphi(I_0^2(2))$ и $\varphi(I_1^2(2))$ — это отрезок $x^2=0$, $a \leq x^1 \leq a+R$.

На рис. 6.6 стрелками указано направление обхода границы ∂C , если обход границы ∂I^2 совершается против часовой стрелки.

Поскольку $\varphi(I_0^2(2)) - \varphi(I_1^2(2)) = 0$, то можно считать, что

$$\partial C = \varphi(I_1^2(1)) - \varphi(I_0^2(1)),$$

а это совпадает с обычным пониманием границы кольца.

Выясним, каким образом связаны интегралы от формы ω по границе куба C и формы $\varphi^*(\omega)$ по границе I^p .

Утверждение. Пусть $C = \varphi: I^p \rightarrow E^n$ — произвольный сингулярный куб, содержащийся в G , и пусть $\omega \in \Omega_{p-1}(G)$. Справедливо равенство

$$\int_{\partial C} \omega = \int_{\partial I^p} \varphi^*(\omega).$$

Доказательство. Очевидно, в силу определения интеграла по цепи достаточно доказать равенство

$$\int_{\varphi(I_{\alpha}^p(i))} \omega = \int_{I_{\alpha}^p(i)} \varphi^*(\omega).$$

Рассмотрим каноническое отображение $\tilde{\varphi} = \tilde{\varphi}_i^{\alpha, p}: I^{p-1} \rightarrow I_{\alpha}^p(i)$. По определению

$$\int_{I_{\alpha}^p(i)} \varphi^*(\omega) = \int_{I^{p-1}} \tilde{\varphi}^*[\varphi^*(\omega)].$$

В силу свойства 3° дифференцируемых отображений (см. п. 2 § 3) имеем

$$\tilde{\varphi}^* \circ \varphi^* = (\varphi \circ \tilde{\varphi})^*.$$

Таким образом,

$$\int_{I_{\alpha}^p(i)} \varphi^*(\omega) = \int_{I^{p-1}} (\varphi \circ \tilde{\varphi})^*(\omega) = \int_{(\varphi \circ \tilde{\varphi})(I^{p-1})} \omega = \int_{\varphi(I_{\alpha}^p(i))} \omega,$$

поскольку $(\varphi \circ \tilde{\varphi})(I^{p-1}) = \varphi(I_{\alpha}^p(i))$.

3. Формула Стокса.

Основная теорема. Пусть $C = \varphi: I^p \rightarrow E^n$ — произвольный сингулярный куб, содержащийся в G , и пусть $\omega \in \Omega_{p-1}(G)$. Справедлива формула Стокса

$$\int_C d\omega = \int_{\partial C} \omega.$$

Докажем эту формулу сначала в следующем частном случае:

Пусть ω — дифференциальная форма степени $p-1$, определенная в I^p . Тогда справедливо равенство

$$\int_{I^p} d\omega = \int_{\partial I^p} \omega. \quad (6.1.19)$$

Доказательство. Пусть $\omega = f(t) dt^2 \wedge \dots \wedge dt^p$. По определению

$$\int_{\partial I^p} \omega = \sum_{i=1}^p (-1)^i \left(\int_{I_{0(i)}^p} \omega - \int_{I_1^p(i)} \omega \right).$$

Вычислим следующий интеграл:

$$\int_{I_{\alpha}^p(i)} \omega, \text{ где } i = 1, 2, \dots, p, \alpha = 0, 1.$$

Рассмотрим каноническое отображение $\tilde{\varphi}: I^{p-1} \rightarrow I_{\alpha}^p(i)$. В силу результатов п. 1 имеем

$$\int_{I_{\alpha}^p(i)} \omega = \int_{I^{p-1}} f[\tilde{\varphi}(s)] \frac{D(\tilde{\varphi}^2, \dots, \tilde{\varphi}^p)}{D(s^1, \dots, s^{p-1})} ds^1 \wedge \dots \wedge ds^{p-1}.$$

По определению канонического отображения $\tilde{\varphi}_i^{\alpha, p}$ якобиан имеет вид

$$J = \begin{cases} \frac{D(s^2, \dots, s^{i-1}, \alpha, s^i, \dots, s^{p-1})}{D(s^1, s^2, \dots, s^{p-1})} = 0, & \text{если } i \neq 1 \\ \frac{D(s^1, s^2, \dots, s^{p-1})}{D(s^1, s^2, \dots, s^{p-1})} = 1, & \text{если } i = 1. \end{cases}$$

Таким образом, отличными от нуля могут быть только интегралы по $I_{\alpha}^p(1)$, и мы получаем

$$\begin{aligned} \int_{\partial I^p} \omega &= (-1) \left(\int_{I_{0(1)}^p} \omega - \int_{I_1^p(1)} \omega \right) = \int_{I^{p-1}} f(1, s^1, s^2, \dots, s^{p-1}) ds^1 \wedge \dots \\ &\quad \dots \wedge ds^{p-1} - \int_{I^{p-1}} f(0, s^1, \dots, s^{p-1}) ds^1 \wedge \dots \wedge ds^{p-1}. \end{aligned}$$

По определению интеграла по кубу I^{p-1}

$$\begin{aligned} \int_{\partial I^p} \omega &= \int_0^1 \dots \int_0^1 [f(1, s^1, \dots, s^{p-1}) - f(0, s^1, \dots, s^{p-1})] ds^1 ds^2 \dots ds^{p-1} = \\ &= \int_0^1 \int_0^1 \dots \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial s^0} ds^0 ds^1 \dots ds^{p-1} = \int_{I^p} \frac{\partial f}{\partial s^0} ds^0 \wedge \dots \wedge ds^{p-1}. \end{aligned}$$

С другой стороны,

$$d\omega = \frac{\partial f}{\partial t_1} dt^1 \wedge dt^2 \wedge \dots \wedge dt^p.$$

Следовательно,

$$\int_{I^p} d\omega = \int_{I^p} \frac{\partial f}{\partial t_1} dt^1 \wedge \dots \wedge dt^p.$$

Равенство (6.1.19) доказано.

Доказательство теоремы Стокса. По определению интеграла по сингулярному кубу

$$\int_C d\omega = \int_{I^p} \Phi^*(d\omega).$$

В силу свойства 2° дифференцируемых отображений (см. п. 2 § 3)

$$\int_{I^p} \Phi^*(d\omega) = \int_{I^p} d\Phi^*(\omega).$$

Далее воспользуемся уже доказанной формулой Стокса для куба I^p :

$$\int_{I^p} d\Phi^*(\omega) = \int_{\partial I^p} \Phi^*(\omega).$$

Остается заметить, что по свойству интегралов по границе сингулярного куба (см. утверждение п. 2)

$$\int_{\partial I^p} \Phi^*(\omega) = \int_{\partial C} \omega.$$

Теорема полностью доказана.

4. Примеры. 1°. Рассмотрим случай $p=1$. Одномерный сингулярный куб C в E^n — это некоторая кривая, концы которой обозначим через a и b . Формула Стокса приобретает вид

$$\int_C df = \int_C f = f(b) - f(a).$$

В частности, когда $n=1$, получаем формулу Ньютона — Лейбница

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a).$$

2°. Пусть теперь $p=2$. Двумерный сингулярный куб C — это двумерная поверхность, форма $\omega \in \Omega_1$ имеет вид

$$\omega = \sum_{k=1}^n \omega_k dx^k.$$

Используя пример 2 п. 2 § 2, получим

$$\int_C \sum_{k < l} \left(\frac{\partial \omega^l}{\partial x^k} - \frac{\partial \omega^k}{\partial x^l} \right) dx^k \wedge dx^l = \int_C \sum_{k=1}^n \omega_k dx^k.$$

Если $n=2$, то, обозначая $\omega = Pdx^1 + Qdx^2$, получим формулу Грина

$$\int_C \left(\frac{\partial Q}{\partial x^1} - \frac{\partial P}{\partial x^2} \right) dx^1 \wedge dx^2 = \int_{\partial C} Pdx^1 + Qdx^2.$$

Если $n=3$, то получим обычную формулу Стокса.

3°. Пусть $p=n$. Тогда $\omega \in \Omega_{n-1}$ имеет вид

$$\omega = \sum_{k=1}^n \omega_k dx^1 \wedge \dots \wedge dx^{k-1} \wedge dx^{k+1} \wedge \dots \wedge dx^n.$$

Далее,

$$\begin{aligned} d\omega &= \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n \frac{\partial \omega_k}{\partial x^i} dx^i \wedge dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n = \\ &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{\partial \omega_k}{\partial x^k} dx^1 \wedge dx^2 \wedge \dots \wedge dx^n. \end{aligned}$$

В частности, при $n=3$

$$\omega = Pdx^2 \wedge dx^3 - Qdx^1 \wedge dx^3 + Rdx^1 \wedge dx^2;$$

$$d\omega = \left(\frac{\partial P}{\partial x^1} + \frac{\partial Q}{\partial x^2} + \frac{\partial R}{\partial x^3} \right) dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3,$$

и мы получаем формулу Остроградского.

Эта глава посвящена изучению специального класса функций, представимых в виде собственного или несобственного интеграла по одной переменной x от функции, которая кроме указанной переменной x зависит еще от одной переменной y , называемой параметром. Функции, представимые такими интегралами, принято называть интегралами, зависящими от параметра.

Естественно возникают вопросы о непрерывности, интегрируемости, дифференцируемости таких функций по параметру.

§ 1. РАВНОМЕРНОЕ ПО ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ СТРЕМЛЕНИЕ ФУНКЦИИ ДВУХ ПЕРЕМЕННЫХ К ПРЕДЕЛУ ПО ДРУГОЙ ПЕРЕМЕННОЙ

1. Связь равномерного по одной переменной стремления функции двух переменных к пределу по другой переменной с равномерной сходимостью функциональной последовательности. Пусть на множестве Z , принадлежащем пространству E^2 и состоящем из пар (x, y) , где x принадлежит некоторому множеству числовой оси $\{x\}=X$, а y принадлежит некоторому множеству числовой оси $\{y\}=Y$, задана функция двух переменных $f(x, y)$. В простейшем случае под Z можно подразумевать прямоугольник $\Pi = \{a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$, где $\{x\}=X=[a, b]$, $\{y\}=Y=[c, d]$, а $f(x, y)$ — функция, заданная на прямоугольнике Π . Пусть далее y_0 — предельная точка множества $\{y\}$.

Если при каждом x , принадлежащем множеству $\{x\}$, существует конечный предел

$$\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = g(x),$$

то будем говорить, что функция $f(x, y)$ поточечно стремится к функции $g(x)$ на множестве $\{x\}$ при y , стремящемся к y_0 , и будем писать:

$$f(x, y) \rightarrow g(x) \text{ при } y \rightarrow y_0.$$

Понятие поточечного стремления $f(x, y)$ к $g(x)$ обобщает понятие сходимости в точке функциональной последовательности (см. § 1 гл. 2).

Действительно, в частном случае, когда множество $\{y\}=Y$ является последовательностью $\{y_n\}$ и $y_n \rightarrow y_0$, функцию $f(x, y)$ можно рассматривать как функциональную последовательность $f_n(x) = f(x, y_n)$, определенную на множестве $\{x\}=X$.

Определим теперь понятие равномерного по переменной x стремления функции $f(x, y)$ двух переменных к предельной функции $g(x)$ при $y \rightarrow y_0$.

Определение. Функция $f(x, y)$ стремится равномерно относительно x на $\{x\}$ к функции $g(x)$ при y , стремящемся к y_0 , если для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ такое, что для всех $y \neq y_0$ из множества $\{y\}$, для которых $|y - y_0| < \delta$, и сразу для всех x из множества $\{x\}$ выполняется неравенство

$$|f(x, y) - g(x)| < \varepsilon.$$

Докажем утверждение, устанавливающее связь между равномерным на множестве $\{x\}$ стремлением функции $f(x, y)$ к $g(x)$ при $y \rightarrow y_0$ и равномерной на множестве $\{x\}$ сходимостью функциональной последовательности $f_n(x) = f(x, y_n)$ при $y_n \rightarrow y_0$, где $y_n \neq y_0$ для всех n , y_0 — предельная точка множества $\{y\}$.

Утверждение 1. Функция $f(x, y)$ стремится к функции $g(x)$ равномерно относительно x на множестве $\{x\}$ при $y \rightarrow y_0$ тогда и только тогда, когда функциональная последовательность $f_n(x) = f(x, y_n)$ сходится равномерно на множестве $\{x\}$ к предельной функции $g(x)$ для каждой последовательности $\{y_n\}$, $y_n \rightarrow y_0$, где y_n принадлежат $\{y\}$, $y_n \neq y_0$.

Доказательство. *Необходимость.* Пусть $f(x, y)$ стремится к $g(x)$ равномерно на множестве $\{x\}$ при $y \rightarrow y_0$. Возьмем произвольную последовательность $\{y_n\}$, где y_n принадлежат $\{y\}$, $y_n \neq y_0$ и $y_n \rightarrow y_0$. Покажем, что последовательность $\{f_n(x)\}$, где $f_n(x) = f(x, y_n)$ равномерно на множестве $\{x\}$ сходится к $g(x)$.

Фиксируем произвольное число $\varepsilon > 0$ и по нему число $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ такое, что для любых y из множества $\{y\}$ таких, что $0 < |y - y_0| < \delta$, и для всех x из $\{x\}$ выполняется неравенство $|f(x, y) - g(x)| < \varepsilon$. Поскольку $y_n \rightarrow y_0$, то найдется такой номер $N = N(\delta)$, что при любых $n \geq N$ выполняется неравенство

$$|y_n - y_0| < \delta,$$

из которого следует, что

$$|f(x, y_n) - g(x)| < \varepsilon$$

при всех x , принадлежащих $\{x\}$, и при любом $n \geq N$. Это означает, что $f_n(x)$ стремится равномерно на множестве $\{x\}$ к $g(x)$.

Достаточность. Пусть для любой сходящейся к y_0 последовательности $\{y_n\}$, где y_n принадлежат $\{y\}$, $y_n \neq y_0$, соответствующая последовательность $f_n(x) = f(x, y_n)$ равномерно на множестве $\{x\}$ сходится к функции $g(x)$. Докажем, что функция $f(x, y)$ равно-

мерно на множестве $\{x\}$ стремится к $g(x)$ при $y \rightarrow y_0$. Допустим противное, т. е. допустим, что существует такое число $\varepsilon_0 > 0$, что для любого $\delta > 0$ найдутся $y_\delta \neq y_0$, $|y_\delta - y_0| < \delta$, и точка x_δ из $\{x\}$ такие, что

$$|f(x_\delta, y_\delta) - g(x_\delta)| \geq \varepsilon_0.$$

Пусть $\{\delta_n\}$ — последовательность положительных чисел, сходящаяся к нулю. Тогда для соответствующих последовательностей $\{y_n\}$, $\{x_n\}$, где $y_n = y_{\delta_n}$, $x_n = x_{\delta_n}$, будем иметь $y_n \rightarrow y_0$, $|y_n - y_0| < \delta$, тогда как $|f(x_n, y_n) - g(x_n)| \geq \varepsilon_0$. Следовательно, последовательность функций $f(x, y_n) = f_n(x)$ не сходится к $g(x)$ равномерно на множестве $\{x\}$. Таким образом, мы пришли к противоречию. Утверждение 1 полностью доказано.

2. Критерий Коши равномерного стремления функции к предельной.

Теорема 7.1. *Для того чтобы функция $f(x, y)$ стремилась равномерно на множестве $\{x\}$ к некоторой функции $g(x)$ при $y \rightarrow y_0$, необходимо и достаточно, чтобы для любого числа $\varepsilon > 0$ существовало бы число $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ такое, что для любых y' , y'' из множества $\{y\}$, для которых $0 < |y' - y_0| < \delta$, $0 < |y'' - y_0| < \delta$, и для всех x из множества $\{x\}$ выполнялось бы неравенство*

$$|f(x, y') - f(x, y'')| < \varepsilon.$$

Доказательство. Согласно утверждению 1 достаточно рассмотреть последовательность $\{f(x, y_n)\}$, соответствующую последовательности $\{y_n\}$, где $y_n \rightarrow y_0$, y_n из $\{y\}$, $y_n \neq y_0$, и воспользоваться критерием Коши равномерной сходимости функциональной последовательности (см. § 1 гл. 2).

3. Применения понятия равномерного стремления к предельной функции. Пусть множество $\{x\} = X$ совпадает с сегментом $[a, b]$, y_0 — предельная точка множества $\{y\} = Y$. Рассмотрим функцию $f(x, y)$, где x из $[a, b]$, а y из множества Y . Сформулируем ряд утверждений, вытекающих из соответствующих утверждений для равномерно сходящихся функциональных последовательностей (см. гл. 2). Эти утверждения доказываются путем перехода к произвольной последовательности $\{y_n\}$, y_n из Y , $y_n \neq y_0$, $y_n \rightarrow y_0$ при $n \rightarrow \infty$.

Утверждение 2. *Пусть функция $f(x, y)$ интегрируема на $[a, b]$ при каждом фиксированном y из Y и $f(x, y)$ равномерно на $[a, b]$ стремится к $g(x)$ при $y \rightarrow y_0$. Тогда $g(x)$ интегрируема на $[a, b]$ и справедливы равенства*

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b g(x) dx = \int_a^b [\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)] dx.$$

Для доказательства этого утверждения достаточно применить теорему 2.8.

Утверждение 3. Если функция $f(x, y)$ непрерывна по x на $[a, b]$ при каждом фиксированном y из множества Y и $f(x, y)$ равномерно на $[a, b]$ стремится к $g(x)$ при $y \rightarrow y_0$, то $g(x)$ — непрерывная на $[a, b]$ функция.

Для доказательства следует воспользоваться следствием 1 из теоремы 2.7.

Утверждение 4. Пусть функция $f(x, y)$ непрерывна по x на $[a, b]$ при каждом фиксированном y и при стремлении y к y_0 в каждой фиксированной точке x сегмента $[a, b]$ эта функция, не возрастающая (не убывающая), сходится к непрерывной предельной функции $g(x)$. Тогда $f(x, y)$ стремится к $g(x)$ равномерно на $[a, b]$.

Это утверждение является аналогом теоремы 2.4 гл. 2 (признак Дини).

При переходе к последовательности $\{y_n\}$ необходимо выбирать ее возрастающую и так, чтобы $y_n \rightarrow y_0$.

Утверждение 5. Если при каждом фиксированном y из множества Y функции от x $f(x, y)$ и $f'_x(x, y)$ непрерывны на $[a, b]$ и при $y \rightarrow y_0$ функция $f(x, y)$ стремится к $g(x)$, а функция $f'_x(x, y)$ стремится к $h(x)$ равномерно на $[a, b]$, то функция $g(x)$ дифференцируема на $[a, b]$, причем

$$g'(x) = h(x),$$

или

$$\{\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)\}'_x = \lim_{y \rightarrow y_0} f'_x(x, y).$$

Для доказательства этого утверждения необходимо воспользоваться теоремой 2.9.

Утверждение 6. Пусть функция $f(x, y)$ задана на прямоугольнике $\Pi = \{a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$ и непрерывна на нем. Тогда при любом y_0 из сегмента $[c, d]$ при $y \rightarrow y_0$ функция $f(x, y)$ стремится равномерно по x на $[a, b]$ к функции $f(x, y_0)$.

Доказательство. Поскольку непрерывная на прямоугольнике Π функция является и равномерно непрерывной на нем, то для любого числа $\varepsilon > 0$ существует такое число $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$, что для любых точек (x', y') , (x'', y'') , для которых $|x' - x''| < \delta$, $|y' - y''| < \delta$, справедливо неравенство

$$|f(x', y') - f(x'', y'')| < \varepsilon.$$

Пусть $x' = x'' = x$, $y' = y$, $y'' = y_0$. Тогда для любых y из $[c, d]$ таких, что $|y - y_0| < \delta$, и для любых x из $[a, b]$ выполняется неравенство

$$|f(x, y) - f(x, y_0)| < \varepsilon.$$

Но это и означает равномерное на $[a, b]$ стремление $f(x, y)$ к $f(x, y_0)$ при $y \rightarrow y_0$. Утверждение доказано.

§ 2. СОБСТВЕННЫЕ ИНТЕГРАЛЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ПАРАМЕТРА

1. Свойства интеграла, зависящего от параметра. Пусть функция двух переменных $f(x, y)$ определена для x , принадлежащих сегменту $[a, b]$, и для y , принадлежащих некоторому множеству $\{y\} = Y$. Допустим, что при каждом фиксированном y из Y функция $f(x, y)$ интегрируема по $[a, b]$. Тогда на множестве Y определена функция

$$I(y) = \int_a^b f(x, y) dx, \quad (7.1)$$

называемая интегралом, зависящим от параметра y .

Изучим свойства интеграла, зависящего от параметра. Заметим сначала, что согласно утверждению 2 из § 1, если функция $f(x, y)$ стремится равномерно на $[a, b]$ к функции $g(x)$ при $y \rightarrow y_0$, то в интеграле (7.1) можно сделать предельный переход под знаком интеграла.

Теорема 7.2 (о непрерывности интеграла по параметру). Пусть функция $f(x, y)$ непрерывна на прямоугольнике $\Pi = \{a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$. Тогда интеграл $I(y) = \int_a^b f(x, y) dx$ является непрерывной функцией параметра y на $[c, d]$.

Доказательство. В силу утверждения 6 § 1 функция $f(x, y)$ стремится равномерно на $[a, b]$ к функции $f(x, y_0)$ при $y \rightarrow y_0$. Следовательно, как было отмечено выше, можно сделать предельный переход под знаком интеграла:

$$\lim_{y \rightarrow y_0} I(y) = \lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) dx = \int_a^b f(x, y_0) dx = I(y_0),$$

что и требовалось.

Теорема 7.3 (об интегрировании интеграла по параметру). Если функция $f(x, y)$ непрерывна в прямоугольнике $\Pi = \{a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$, то функция $I(y) = \int_a^b f(x, y) dx$ интегрируема на сегменте $[c, d]$. Кроме того, справедлива формула

$$\int_c^d I(y) dy = \int_c^d \left[\int_a^b f(x, y) dx \right] dy = \int_a^b \left[\int_c^d f(x, y) dy \right] dx.$$

Иными словами, в условиях теоремы интеграл, зависящий от параметра, можно интегрировать по параметру под знаком интеграла.

Доказательство. Согласно предыдущей теореме 7.2 функция непрерывна на $[c, d]$. Поэтому она интегрируема на этом сегменте. Справедливость формулы следует из равенства повторных интегралов, поскольку оба они равны двойному интегралу $\iint_{\Pi} f(x, y) dx dy$ (см. гл. 3). Теорема доказана.

Теорема 7.4 (о дифференцируемости интеграла по параметру). Пусть функция $f(x, y)$ непрерывна на прямоугольнике Π и имеет на нем непрерывную производную $f'_y(x, y)$. Тогда определяемая равенством (7.1) функция $I(y)$ дифференцируема на $[c, d]$ и

$$I'(y) = \int_a^b f'_y(x, y) dx. \quad (7.2)$$

Иными словами, в условиях теоремы можно дифференцировать под знаком интеграла.

Доказательство. Рассмотрим получаемое из формулы Лагранжа соотношение

$$\frac{f(x, y+h) - f(x, y)}{h} = f'_y(x, y + \theta h),$$

где $0 < \theta < 1$. Заметим, что $f'_y(x, y + \theta h)$ стремится равномерно на $[a, b]$ к $f'_y(x, y)$ при $h \rightarrow 0$.

Следовательно, при $h \rightarrow 0$ допустим предельный переход под знаком интеграла в соотношении

$$\frac{I(y+h) - I(y)}{h} = \int_a^b f'_y(x, y + \theta h) dx.$$

Отсюда и получаем формулу (7.2). Теорема доказана.

2. Случай, когда пределы интегрирования зависят от параметра. Пусть функция $f(x, y)$ определена на прямоугольнике $\Pi = \{a \leq x \leq \beta, c \leq y \leq d\}$, а заданные на $[c, d]$ функции $a(y)$ и $b(y)$ отображают $[c, d]$ в сегмент $[a, \beta]$.

Если при любом фиксированном y из $[c, d]$ функция $f(x, y)$ интегрируема по x на сегменте $[a(y), b(y)]$, то, очевидно, на $[c, d]$ определена функция

$$I(y) = \int_{a(y)}^{b(y)} f(x, y) dx, \quad (7.1')$$

представляющая собой интеграл, зависящий от параметра y , у которого пределы интегрирования также зависят от этого параметра.

Теорема 7.5 (о непрерывности интеграла по параметру). Пусть функция $f(x, y)$ непрерывна на прямоугольнике Π , а функ-

ции $a(y)$ и $b(y)$ непрерывны на сегменте $[c, d]$. Тогда функция

$$I(y) = \int_{a(y)}^{b(y)} f(x, y) dx \text{ непрерывна на } [c, d].$$

Доказательство. Зафиксируем произвольное y_0 из сегмента $[c, d]$. Тогда в силу свойства аддитивности интеграла

$$I(y) = \int_{a(y_0)}^{b(y_0)} f(x, y) dx + \int_{b(y_0)}^{b(y)} f(x, y) dx - \int_{a(y_0)}^{a(y)} f(x, y) dx.$$

Первый интеграл в правой части представляет собой интеграл, зависящий от параметра y , с постоянными пределами интегрирования. Следовательно, он является непрерывной функцией от y и поэтому при $y \rightarrow y_0$ стремится к $I(y_0)$. Для двух других интегралов получаем оценки

$$\left| \int_{b(y_0)}^{b(y)} f(x, y) dx \right| \leq M |b(y) - b(y_0)|,$$

$$\left| \int_{a(y_0)}^{a(y)} f(x, y) dx \right| \leq M |a(y) - a(y_0)|,$$

где $M = \sup_{\Pi} |f(x, y)|$. Из непрерывности функций $a(y)$ и $b(y)$

следует, что при $y \rightarrow y_0$ оба эти интеграла стремятся к нулю. Таким образом, $I(y) \rightarrow I(y_0)$ при $y \rightarrow y_0$. Теорема доказана.

Докажем теперь теорему о дифференцируемости интеграла $I(y)$, определяемого равенством (7.1').

Теорема 7.6 (о дифференцируемости интеграла по параметру). Пусть функция $f(x, y)$ непрерывна вместе с производной $f'_y(x, y)$ на прямоугольнике Π , а функции $a(y)$, $b(y)$ дифференцируемы на $[c, d]$. Тогда интеграл $I(y)$, определяемый равенством (7.1*), дифференцируем по y на $[c, d]$ и справедливо равенство

$$I'(y) = \int_{a(y)}^{b(y)} f'_y(x, y) dx + f[b(y), y] b'(y) - f[a(y), y] a'(y). \quad (7.3)$$

Доказательство. Зафиксируем произвольное y_0 и запишем соотношение

$$\frac{I(y_0 + h) - I(y_0)}{h} = \frac{1}{h} \left[\int_{a(y_0 + h)}^{b(y_0 + h)} f(x, y_0 + h) dx - \int_{a(y_0)}^{b(y_0)} f(x, y_0) dx \right] \quad (7.4)$$

(h выбрано так, что $y_0 + h \in [c, d]$). Так как

$$\int_{a(y_0 + h)}^{b(y_0 + h)} f(x, y_0 + h) dx = \int_{a(y_0 + h)}^{a(y_0)} f(x, y_0 + h) dx + \int_{a(y_0)}^{b(y_0 + h)} f(x, y_0 + h) dx +$$

$$+ \int_{a(y_0)}^{b(y_0)} f(x, y_0 + h) dx + \int_{b(y_0)}^{b(y_0+h)} f(x, y_0 + h) dx,$$

то

$$\begin{aligned} \frac{I(y_0 + h) - I(y_0)}{h} &= \int_{a(y_0)}^{b(y_0)} \frac{f(x, y_0 + h) - f(x, y_0)}{h} dx + \\ &+ \frac{1}{h} \int_{a(y_0+h)}^{a(y_0)} f(x, y_0 + h) dx + \frac{1}{h} \int_{b(y_0)}^{b(y_0+h)} f(x, y_0 + h) dx. \end{aligned}$$

В первом слагаемом правой части этого равенства согласно теореме 7.4 можно перейти к пределу под знаком интеграла при $h \rightarrow 0$.

Воспользуемся первой формулой среднего значения для интегралов и представим второе и третье слагаемые в виде

$$\frac{1}{h} \int_{a(y_0+h)}^{a(y_0)} f(x, y_0 + h) dx = f(\xi, y_0 + h) \frac{a(y_0) - a(y_0 + h)}{h},$$

где ξ заключено между числами $a(y_0)$ и $a(y_0 + h)$;

$$\frac{1}{h} \int_{b(y_0)}^{b(y_0+h)} f(x, y_0 + h) dx = f(\xi', y_0 + h) \frac{b(y_0 + h) - b(y_0)}{h},$$

где ξ' заключено между числами $b(y_0)$ и $b(y_0 + h)$.

Из этих равенств и из непрерывности функций $a(y)$ и $b(y)$ получаем, что при $h \rightarrow 0$

$$\begin{aligned} \frac{1}{h} \int_{a(y_0+h)}^{a(y_0)} f(x, y_0 + h) dx &\rightarrow -f[a(y_0), y_0] a'(y_0); \\ \frac{1}{h} \int_{b(y_0)}^{b(y_0+h)} f(x, y_0 + h) dx &\rightarrow f[b(y_0), y_0] b'(y_0). \end{aligned}$$

Таким образом, в равенстве (7.4) допустим предельный переход при $h \rightarrow 0$ и справедлива формула (7.3). Теорема доказана.

§ 3. НЕСОБСТВЕННЫЕ ИНТЕГРАЛЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ПАРАМЕТРА

В этом параграфе мы будем изучать случай равномерного относительно $y \in \{y\}$ стремления функции двух переменных $F(x, y)$ к предельной функции $G(y)$ при $x \rightarrow +\infty$.

Пусть функция $F(x, y)$ определена на множестве Z , состоящем из пар (x, y) , где x принадлежит множеству $\{x\}=X$, а y принадлежит множеству $\{y\}=Y$, X и Y — множества числовой оси. Предположим, что $+\infty$ является предельной точкой множества X (т. е. для любого числа a множества $(a, +\infty)$ содержит по крайней мере одну точку из X).

Определение 1. *Функция $F(x, y)$ стремится равномерно относительно y на множестве X к функции $G(y)$ при x , стремящемся к $+\infty$, если для любого $\varepsilon > 0$ найдется такое число x_0 , что для любых x , принадлежащих X и удовлетворяющих условию $x > x_0$, и для любых y из Y выполняется неравенство*

$$|F(x, y) - G(y)| < \varepsilon.$$

1. Несобственные интегралы первого рода, зависящие от параметра. Перейдем теперь к изучению несобственных интегралов. Пусть функция $f(x, y)$ определена при всех $x \geq a$, при всех y из некоторого множества $\{y\}=Y$ и при каждом фиксированном y из Y интегрируема на $[a, +\infty)$, т. е. для каждого y из Y сходится интеграл

$$I(y) = \int_a^{\infty} f(x, y) dx. \quad (7.5)$$

Определение 2. *Несобственный интеграл (7.5) называется сходящимся равномерно по параметру y на множестве Y , если функция*

$$F(t, y) = \int_a^t f(x, y) dx \quad (7.6)$$

равномерно на множестве Y стремится к предельной функции $I(y)$ при $t \rightarrow +\infty$.

Справедлив следующий критерий равномерной сходимости несобственного интеграла, зависящего от параметра.

Теорема 7.7 (критерий Коши). *Для того чтобы несобственный интеграл (7.5) сходилась равномерно на множестве Y , необходимо и достаточно, чтобы для любого $\varepsilon > 0$ существовало такое число $t_0 \geq a$, что при всех t', t'' , превосходящих t_0 , и при всех y из Y было справедливо неравенство*

$$\left| \int_{t'}^{t''} f(x, y) dx \right| < \varepsilon.$$

Справедливость этого критерия вытекает из теоремы 7.1, примененной к функции

$$F(t, y) = \int_a^t f(x, y) dx.$$

Из критерия Коши, в частности, вытекает следующий признак сравнения.

Теорема 7.8 (признак Вейерштрасса). Пусть при всех y из Y и всех x , принадлежащих полуоси $[a_1, \infty)$, где $a_1 > a$, для функции $f(x, y)$ выполнено неравенство

$$|f(x, y)| \leq \varphi(x),$$

где $\varphi(x)$ — интегрируемая (в несобственном смысле) на $[a, \infty)$ функция. Тогда интеграл (7.5) сходится равномерно.

Доказательство. Поскольку интеграл $\int_a^\infty \varphi(x) dx$ сходится, то для любого числа $\varepsilon > 0$ найдется такое число $t_0 \geq a_1$, что при любых t', t'' таких, что $t_0 \leq t' \leq t''$, выполняется неравенство

$$\int_{t'}^{t''} \varphi(x) dx < \varepsilon.$$

Тогда

$$\left| \int_{t'}^{t''} f(x, y) dx \right| \leq \int_{t'}^{t''} |f(x, y)| dx \leq \int_{t'}^{t''} \varphi(x) dx < \varepsilon,$$

что и требовалось доказать.

Замечание 1. Из критерия Коши равномерной сходимости несобственного интеграла вытекает, что интеграл (7.5) и его «остаток» (т. е. интеграл вида $\int_{a'}^\infty f(x, y) dx$, где $a' > a$) равномерно сходятся одновременно.

Замечание 2. Аналогично тому, как был доказан признак Дирихле—Абея для несобственных интегралов (см. дополнение 1 к гл. 9 ч. 1), доказывается следующее утверждение (признак Дирихле—Абея):

Если интеграл $F(t, y) = \int_a^t f(x, y) dx$ равномерно ограничен, т. е. при всех $t > a$ и y из Y выполнено условие $|F(t, y)| \leq M$, а $g(x)$ ограничена и монотонно стремится к нулю при $x \rightarrow +\infty$, то интеграл $\int_a^\infty f(x, y) g(x) dx$ сходится равномерно.

Перейдем теперь к изучению свойств зависящих от параметра несобственных интегралов.

Теорема 7.9. Пусть для любого b , превосходящего a , функция $f(x, y)$ равномерно на сегменте $a \leq x \leq b$ стремится к функции $g(x)$ при $y \rightarrow y_0$, где y_0 — предельная точка множества Y , и интег-

рал $I(y) = \int_a^\infty f(x, y) dx$ сходится равномерно на множестве Y .
Тогда

$$\lim_{y \rightarrow y_0} I(y) = \lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^\infty f(x, y) dx = \int_a^\infty g(x) dx.$$

Доказательство. Докажем интегрируемость на $[a, \infty)$ функции $g(x)$. Для произвольного $\varepsilon > 0$ найдем число $t_0 = t_0(\varepsilon) > 0$ такое, что для любых t', t'' , превосходящих t_0 , и для всех y из Y выполнено неравенство

$$\left| \int_{t'}^{t''} f(x, y) dx \right| < \varepsilon.$$

Зафиксировав произвольные t' и t'' , превосходящие t_0 , перейдем в этом неравенстве к пределу при $y \rightarrow y_0$, получим

$$\left| \int_{t'}^{t''} g(x) dx \right| \leq \varepsilon.$$

Это и доказывает сходимость интеграла $\int_a^\infty g(x) dx$.

Пусть $\{t_n\}$ — произвольная последовательность такая, что $t_n \rightarrow +\infty$. Введем в рассмотрение функциональную последовательность

$$I_n(y) = \int_a^{t_n} f(x, y) dx,$$

которая равномерно на множестве Y сходится к функции $I(y)$, определяемой равенством (7.5). В силу утверждения 2 § 1 для каждой из функций $I_n(y)$ существует конечный предел при $y \rightarrow y_0$. Более того,

$$\lim_{y \rightarrow y_0} I_n(y) = \lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^{t_n} f(x, y) dx = \int_a^{t_n} [\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)] dx = \int_a^{t_n} g(x) dx.$$

Но тогда существует и предел

$$\lim_{y \rightarrow y_0} I(y) = \lim_{t_n \rightarrow \infty} \int_a^{t_n} g(x) dx = \int_a^\infty g(x) dx,$$

поскольку согласно теореме 2.7 гл. 2 символ $\lim_{t_n \rightarrow \infty}$ предела равномерно сходящейся последовательности $\{I_n(y)\}$ и символ $\lim_{y \rightarrow y_0}$ пре-

дела функции $I_n(y)$ можно переставлять местами. Теорема доказана.

Допустим, в частности, что точка y_0 принадлежит множеству Y и функция $f(x, y)$ непрерывна в точке y_0 , т. е. $f(x, y)$ при любом $b > a$ стремится равномерно на сегменте $a \leq x \leq b$ к $f(x, y_0)$ при $y \rightarrow y_0$. Тогда $\lim_{y \rightarrow y_0} I(y) = I(y_0)$, т. е. $I(y)$ непрерывна в точке y_0 .

Таким образом, мы приходим к следующей теореме.

Теорема 7.9* (о непрерывности несобственного интеграла по параметру). Пусть $f(x, y)$ как функция двух переменных непрерывна при $x \geq a$ и y из $[c, d]$, а интеграл $I(y) = \int_a^\infty f(x, y) dx$ равномерно на $[c, d]$ сходится. Тогда функция $I(y)$ непрерывна на $[c, d]$.

Доказательство. Можно утверждать, что для каждого прямоугольника $\Pi = \{a \leq x \leq t, c \leq y \leq d\}$ функция $f(x, y)$ равномерно на сегменте $a \leq x \leq t$ стремится к $f(x, y_0) = g(x)$ при $y \rightarrow y_0$ (см. утверждение 6 § 1). Поэтому при $t = t_n$ для интегралов $I_n(y)$, введенных при доказательстве теоремы 7.9, выполнены условия предельного перехода под знаком интеграла. Отсюда и из равномерной на $[c, d]$ сходимости $I_n(y)$ к $I(y)$ получаем, что $\lim_{y \rightarrow y_0} I(y) = I(y_0)$, т. е. функция $I(y)$ непрерывна. Теорема доказана.

Теорема 7.10. Пусть $f(x, y)$ как функция двух переменных непрерывна и неотрицательна при x , принадлежащем полупрямой $[a, \infty)$, и y , принадлежащем сегменту $[c, d]$. Пусть далее интеграл $I(y) = \int_a^\infty f(x, y) dx$ непрерывен по y на $[c, d]$. Тогда этот интеграл сходится равномерно по y на $[c, d]$.

Доказательство. Рассмотрим последовательность $I_n(y) = \int_a^{t_n} f(x, y) dx$ непрерывных на $[c, d]$ функций, и пусть $t_n \rightarrow +\infty$ не убывая. Последовательность $\{I_n(y)\}$, монотонно не убывая, сходится к непрерывной функции $I(y)$. Следовательно, можно применить признак Дини (теорема 2.4 гл. 2). Теорема доказана.

Теорема 7.11. Пусть $f(x, y)$ как функция двух переменных непрерывна и неотрицательна при x , принадлежащем полупрямой $[a, \infty)$, и y , принадлежащем сегменту $[c, d]$. Пусть при $y \rightarrow y_0$ функция $f(x, y)$, монотонно не убывая в каждой точке x по y , сходится к непрерывной функции $g(x)$. Тогда из сходимости интеграла $\int_a^\infty g(x) dx$ следует возможность предельного перехода при $y \rightarrow y_0$ под знаком интеграла (7.5).

Доказательство. Действительно, интеграл (7.5) сходится равномерно на $[c, d]$ по признаку Вейерштрасса (теорема 7.8), поскольку $f(x, y) \leq g(x)$ и $g(x)$ — интегрируема на $[a, \infty)$. Поэтому в силу теоремы 7.9* можно переходить к пределу под знаком интеграла, что и требовалось доказать.

Перейдем теперь к рассмотрению вопроса об интегрировании несобственного интеграла по параметру.

Теорема 7.12 (об интегрировании несобственного интеграла по параметру). Пусть функция $f(x, y)$ как функция двух переменных непрерывна при x , принадлежащем полупрямой $[a, \infty)$, и при y , принадлежащем сегменту $[c, d]$, и пусть интеграл

$$I(y) = \int_a^{\infty} f(x, y) dx \quad \text{равномерно сходится. Тогда функция } I(y)$$

интегрируема на $[c, d]$ и имеет место формула

$$\int_c^d I(y) dy = \int_c^d dy \int_a^{\infty} f(x, y) dx = \int_a^{\infty} dx \int_c^d f(x, y) dy. \quad (*)$$

Доказательство. Согласно теореме 7.9* функция $I(y)$ непрерывна на $[c, d]$, а следовательно, и интегрируема на $[c, d]$. Докажем формулу (*). Рассмотрим последовательность функций

$I_n(y) = \int_a^{t_n} f(x, y) dx$, где $t_n \rightarrow +\infty$. В силу теоремы 7.3 для каждой функции $I_n(y)$ получаем

$$\int_c^d I_n(y) dy = \int_a^{t_n} dx \int_c^d f(x, y) dy. \quad (7.7)$$

Поскольку на $[c, d]$ последовательность $I_n(y)$ равномерно сходится к $I(y)$, то под знаком интеграла, стоящего слева в формуле (7.7), можно сделать предельный переход при $n \rightarrow \infty$. Следовательно, при $n \rightarrow \infty$ существует предел последовательности интегралов, стоящих в правой части (7.7).

Таким образом,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_c^d I_n(y) dy = \int_c^d I(y) dy = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^{t_n} dx \int_c^d f(x, y) dy = \int_a^{\infty} dx \int_c^d f(x, y) dy,$$

что и требовалось доказать.

Теперь докажем теорему об интегрировании несобственного интеграла (7.5) по бесконечному промежутку изменения параметра y .

Теорема 7.13. Пусть $f(x, y)$ как функция двух переменных непрерывна и неотрицательна в области $a \leq x < \infty$, $c \leq y < \infty$, ин-

теграл $I(y) = \int_a^\infty f(x, y) dx$ непрерывен на полупрямой $[c, \infty)$,

а интеграл $K(x) = \int_c^\infty f(x, y) dy$ непрерывен на полупрямой $[a, \infty)$.

Тогда из сходимости одного из двух интегралов $\int_c^\infty I(y) dy$ и

$\int_a^\infty K(x) dx$ следует сходимость другого из этих интегралов и справедливость равенства

$$\int_c^\infty I(y) dy = \int_a^\infty K(x) dx,$$

или

$$\int_c^\infty dy \int_a^\infty f(x, y) dx = \int_a^\infty dx \int_c^\infty f(x, y) dy.$$

Таким образом, в условиях этой теоремы несобственный интеграл, зависящий от параметра, можно интегрировать по параметру под знаком несобственного интеграла и в случае бесконечного промежутка изменения параметра.

Доказательство. В силу условий доказываемой теоремы и в силу теоремы 7.10 интегралы $I(y)$ и $K(x)$ сходятся равномерно: первый на сегменте $[c, d]$ при любом $d > c$, а второй на сегменте $[a, b]$ при любом $b > a$. Пусть, например, сходится повторный интеграл $\int_c^\infty I(y) dy$. Рассмотрим неубывающую последовательность

$$\{t_n\}, t_n \rightarrow +\infty. \text{ Тогда } \int_a^{t_n} K(x) dx = \int_a^{t_n} \int_c^\infty f(x, y) dy = \int_c^\infty dy \int_a^{t_n} f(x, y) dx.$$

Последовательность

$$I(y, t_n) = \int_a^{t_n} f(x, y) dx$$

при любом d , превосходящем c , равномерно на сегменте $[c, d]$ сходится к $I(y)$. При этом последовательность $\{I(y, t_n)\}$ не убывает на $[c, d]$. Отсюда и из теоремы 7.11 вытекает, что интеграл $\int_c^\infty I(y, t) dy$ сходится равномерно. Но тогда под знаком этого интеграла согласно теореме 7.9 можно сделать предельный переход, т. е. имеет место формула

$$\int_a^{\infty} K(x) dx = \lim_{t_n \rightarrow +\infty} \int_a^{t_n} K(x) dx = \lim_{t_n \rightarrow +\infty} \int_c^{\infty} I(y, t_n) dy = \int_c^{\infty} I(y) dy,$$

что и требовалось доказать.

Рассмотрим теперь вопрос о дифференцировании по параметру несобственного интеграла.

Теорема 7.14 (о дифференцируемости несобственного интеграла по параметру). Пусть функция $f(x, y)$ и ее производная $f'_y(x, y)$ непрерывны в области $a \leq x < \infty$, $c \leq y \leq d$. Пусть, далее,

интеграл $I(y) = \int_a^{\infty} f(x, y) dx$ сходится в каждой точке y сегмента

$[c, d]$, а интеграл $\int_a^{\infty} f'_y(x, y) dx$ сходится равномерно на сегменте

$[c, d]$. Тогда при любом y из $[c, d]$ функция $I(y)$ имеет производную¹⁾, причем

$$I'(y) = \int_a^{\infty} f'_y(x, y) dx.$$

Доказательство. Пусть $t_n \rightarrow +\infty$, а $I_n(y) = \int_a^{t_n} f(x, y) dx$.

Последовательность непрерывных функций $I_n(y)$ сходится в каждой точке $[c, d]$ к функции $I(y)$, а последовательность производных $I'_n(y)$ сходится равномерно на сегменте $[c, d]$. Тогда согласно утверждению 5 § 1 для любой точки y сегмента $[c, d]$ существует

$$I'(y) = \lim_{n \rightarrow \infty} I'_n(y).$$

Но $I'_n(y) = \int_a^{t_n} f'_y(x, y) dx$. Следовательно,

$$I'(y) = \int_a^{\infty} f'_y(x, y) dx.$$

2. Несобственные интегралы второго рода, зависящие от параметра. Пусть функция $f(x, y)$ определена при x , принадлежащем $[a, b]$, и y , принадлежащем Y . Пусть при каждом фиксированном y из Y функция $f(x, y)$ является неограниченной при $x \rightarrow a$, но такой, что сходится несобственный интеграл

$$I(y) = \int_a^b f(x, y) dx. \quad (7.8)$$

¹⁾ При $y=c$ $I(y)$ имеет правую производную $I'(c+0)$, а при $y=d$ — левую производную $I'(d-0)$.

Определение 3. Несобственный интеграл второго рода (7.8) называется равномерно сходящимся по параметру y на множестве Y , если для t , удовлетворяющего неравенствам $a < t < b$, функция

$$F(t, y) = \int_t^b f(x, y) dx$$

при $t \rightarrow a+0$ стремится к функции $I(y)$ равномерно относительно $y \in Y$.

Отметим, что с помощью преобразования переменной x , указанного в дополнении 1 к гл. 9 ч. 1, несобственные интегралы второго рода сводятся к несобственным интегралам первого рода. Поэтому на интегралы (7.8) могут быть распространены основные теоремы о предельном переходе под знаком несобственного интеграла, об условиях его непрерывности по параметру, об интегрировании и дифференцировании по параметру под знаком интеграла.

В заключение параграфа заметим, что интеграл вида

$$\int_a^{\infty} f(x, y) dx = \int_a^b f(x, y) dx + \int_b^{\infty} f(x, y) dx,$$

где первое слагаемое — интеграл от неограниченной функции, а второе — интеграл по неограниченному промежутку, называется равномерно сходящимся, если равномерно сходятся оба интеграла, стоящие в правой части.

§ 4. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ИНТЕГРАЛОВ, ЗАВИСЯЩИХ ОТ ПАРАМЕТРА, К ВЫЧИСЛЕНИЮ НЕКОТОРЫХ НЕСОБСТВЕННЫХ ИНТЕГРАЛОВ

Развитые в предыдущих параграфах методы позволяют вычислять различные несобственные интегралы.

1°. Вычислим интеграл

$$Q = \int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx.$$

Сходимость этого интеграла была установлена ранее (см. дополнение 1 к гл. 9 ч. 1).

Рассмотрим вспомогательную функцию

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-yx} \frac{\sin x}{x} & \text{при } x \neq 0; \\ 1 & \text{при } x = 0. \end{cases}$$

Функция $f(x, y)$ и ее производная $f_y'(x, y) = -e^{-yx} \sin x$ непрерывны в области $x \geq 0, y \geq 0$ и $f(x, 0) = \frac{\sin x}{x}$. Пусть

$$I(y) = \int_0^{\infty} e^{-yx} \frac{\sin x}{x} dx = \int_0^{\infty} f(x, y) dx.$$

Установим равномерную сходимость этого интеграла при $y \geq 0$. Для этого, очевидно, достаточно установить равномерную сходимость интеграла $\int_1^{\infty} (e^{-yx} \sin x) \frac{1}{x} dx$. К этому интегралу применим

приведенный в § 3 признак Дирихле—Абеля. Действительно, интеграл

$$\int_1^t e^{-yx} \sin x dx = - \left. \frac{e^{-yx} (y \sin x + \cos x)}{1 + y^2} \right|_1^t$$

является ограниченным, так как

$$\begin{aligned} \left| \int_1^t e^{-yx} \sin x dx \right| &\leq \left| \frac{e^{-yt} (y \sin t + \cos t)}{1 + y^2} \right| + \left| \frac{e^{-y} (y \sin 1 + \cos 1)}{1 + y^2} \right| \leq \\ &\leq \frac{2(1+y)}{1+y^2} \leq 3. \end{aligned}$$

Функция $\frac{1}{x}$ при $x \rightarrow +\infty$ монотонно стремится к нулю.

Из равномерной сходимости интеграла и непрерывности подынтегральной функции согласно теореме 7.9 § 3 вытекает непрерывность функции $I(y)$ на $[0, \infty)$, т. е. справедливость равенства

$$\lim_{y \rightarrow 0+0} I(y) = I(0) = I.$$

Найдем значение $I(y)$. Рассмотрим вспомогательный интеграл $\int_0^{\infty} e^{-yx} \sin x dx$. Согласно признаку Дирихле—Абеля, который, очевидно, применим к этому интегралу, заключаем, что этот интеграл равномерно сходится в области $y \geq y_0$, где $y_0 > 0$. Отсюда согласно теореме 7.14 § 3 следует возможность дифференцирования интеграла $I(y)$ по параметру y в любой точке $y > 0$. Таким образом, для любого $y > 0$

$$I'(y) = - \int_0^{\infty} e^{-yx} \sin x dx = - \left. \frac{e^{-yx} (y \sin x + \cos x)}{1 + y^2} \right|_0^{\infty} = - \frac{1}{1 + y^2}.$$

Интегрируя это соотношение по $[y, +\infty)$, получим

$$I(\infty) - I(y) = -\operatorname{arctg} t \Big|_y^\infty = -\frac{\pi}{2} + \operatorname{arctg} y.$$

Поскольку $\left| \frac{\sin x}{x} \right| \leq 1$, то для $y \geq y_0$ имеем при $y_0 \rightarrow \infty$

$$|I(y)| \leq \int_0^\infty e^{-y_0 x} dx = -\frac{1}{y_0} e^{-y_0 x} \Big|_0^\infty = \frac{1}{y_0} \rightarrow 0.$$

Отсюда получаем, что $I(\infty) = 0$ и, следовательно, для любого $y > 0$

$$I(y) = \frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} y.$$

Переходя в этом равенстве к пределу при $y \rightarrow 0+0$, получим

$$I(0) = I = \int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

2°. Рассмотрим интеграл

$$I(y) = \int_0^\infty \frac{\sin yx}{x} dx.$$

Найдем его значения при $y > 0$, $y < 0$ и $y = 0$. При $y > 0$ в интеграле $I(y)$ произведем замену переменной, полагая $yx = t$. Тогда

$$I(y) = \int_0^\infty \frac{\sin yx}{x} dx = \int_0^\infty \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}.$$

При $y < 0$ произведем замену переменной, полагая $yx = -t$ ($t > 0$). Тогда

$$I(y) = - \int_0^\infty \frac{\sin t}{t} dt = -\frac{\pi}{2}.$$

При $y = 0$ интеграл $I(y)$, очевидно, равен нулю. Следовательно,

$$I(y) = \int_0^\infty \frac{\sin yx}{x} dx = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & \text{при } y > 0, \\ 0 & \text{при } y = 0, \\ -\frac{\pi}{2} & \text{при } y < 0. \end{cases}$$

Этот интеграл иногда называют разрывным множителем Дирихле. В частности, с помощью разрывного множителя Дирихле получаем представление для функции

$$\operatorname{sgn} y = \begin{cases} 1 & \text{при } y > 0, \\ 0 & \text{при } y = 0, \\ -1 & \text{при } y < 0 \end{cases}$$

в виде

$$\operatorname{sgn} y = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\sin yx}{x} dx.$$

3°. Вычислим интеграл Пуассона²⁾ $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx$. Рассмотрим интеграл

$$I = \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx.$$

Положим $x = yt$, где $y > 0$; тогда

$$I(y) = \int_0^{\infty} e^{-y^2 t^2} y dt.$$

Умножим обе части этого соотношения на e^{-y^2} и проинтегрируем по $[0, \infty)$:

$$I \int_0^{\infty} e^{-y^2} dy = I^2 = \int_0^{\infty} e^{-y^2} y \left\{ \int_0^{\infty} e^{-y^2 t^2} dt \right\} dy.$$

Рассмотрим функцию $f(y, t) = ye^{-(1+t^2)y^2}$. В области $y \geq 0$, $t \geq 0$ эта функция ограничена, непрерывна и неотрицательна. Интегралы

$$\int_0^{\infty} f(y, t) dt = ye^{-y^2} \int_0^{\infty} e^{-y^2 t^2} dt = e^{-y^2} I;$$

$$\int_0^{\infty} f(y, t) dy = \int_0^{\infty} ye^{-(1+t^2)y^2} dy = -\frac{1}{2(1+t^2)} e^{-(1+t^2)y^2} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{2(1+t^2)}$$

являются непрерывными функциями в областях изменения пара-

²⁾ См. также § 6 гл. 3.

метра, т. е. соответственно в области $y \geq 0$ и в области $t \geq 0$. Кроме того,

$$\int_0^{\infty} dt \int_0^{\infty} f(y, t) dy = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \frac{dt}{1+t^2} = \frac{\pi}{4}.$$

Таким образом, выполнены все условия теоремы 7.13 из § 3. Поэтому

$$I^2 = \int_0^{\infty} e^{-y^2} y \left\{ \int_0^{\infty} e^{-y^2 t^2} dt \right\} dy = \int_0^{\infty} dt \int_0^{\infty} f(y, t) dy = \frac{\pi}{4},$$

т. е.

$$I = \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \text{ и } \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}.$$

§ 5. ИНТЕГРАЛЫ ЭЙЛЕРА

В этом параграфе мы изучим некоторые свойства важных неэлементарных функций, называемых интегралами Эйлера³⁾.

Эйлеровым интегралом первого рода или «бета-функцией» (В-функцией) называют интеграл

$$B(\alpha, \beta) = \int_0^1 x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} dx.$$

В этом интеграле α и β являются параметрами. Если эти параметры удовлетворяют условиям $\alpha < 1$, $\beta < 1$, то интеграл $B(\alpha, \beta)$ будет несобственным, зависящим от этих параметров, причем особенности у подынтегральной функции будут в точках $x=0$ и $x=1$.

Эйлеровым интегралом второго рода или «гамма-функцией» (Г-функцией) называют интеграл

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx.$$

Заметим, что в интеграле $\Gamma(\alpha)$ интегрирование происходит по полупрямой $0 \leq x < \infty$ и при $\alpha < 1$ точка $x=0$ является особой точкой подынтегральной функции.

³⁾ Более подробно с интегралами Эйлера можно познакомиться в книге Э. Г. Уиттекера и Дж. Н. Ватсона «Курс современного анализа. Т. 2» (М.: Физматгиз, 1963).

1. Г-функция. Интеграл

$$\int_0^1 x^{\alpha-1} e^{-x} dx$$

сходится при каждом $\alpha > 0$, поскольку $0 \leq x^{\alpha-1} e^{-x} < x^{\alpha-1}$, и интеграл $\int_0^1 x^{\alpha-1} dx$ при $\alpha > 0$ сходится.

В области $\alpha \geq \alpha_0$, где α_0 — произвольное положительное число, этот интеграл сходится равномерно, так как $0 \leq x^{\alpha-1} e^{-x} \leq x^{\alpha_0-1}$ и можно применить признак Вейерштрасса (теорема 7.8 § 3). Сходящимся при всех значениях $\alpha > 0$ является и весь интеграл

$\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx = \int_0^1 x^{\alpha-1} e^{-x} dx + \int_1^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$, так как второе слагаемое правой части является интегралом, заведомо сходящимся при любом $\alpha > 0$. Легко видеть, что этот интеграл сходится равномерно по α в области $0 < \alpha_0 \leq \alpha \leq A_0 < \infty$, где число A_0 произвольно. Действительно, для всех указанных значений α и для всех $x > 0$ $x^{\alpha-1} e^{-x} \leq e^{-x} [x^{\alpha_0-1} + x^{A_0-1}]$, и так как $\int_0^{\infty} e^{-x} [x^{\alpha_0-1} + x^{A_0-1}] dx$

сходится, то выполнены условия применимости признака Вейерштрасса. Таким образом, в области $0 < \alpha_0 \leq \alpha \leq A_0 < \infty$ интеграл

$\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$ сходится равномерно.

Отсюда вытекает непрерывность функции $\Gamma(\alpha)$ в области $\alpha > 0$. Докажем теперь дифференцируемость этой функции при $\alpha > 0$. Заметим, что функция $f_{\alpha}(x, \alpha) = \ln x \cdot x^{\alpha-1} e^{-x}$ непрерывна при $\alpha > 0$ и $x > 0$, и покажем, что интеграл

$$\int_0^{\infty} f_{\alpha}(x, \alpha) dx = \int_0^{\infty} \ln x \cdot x^{\alpha-1} e^{-x} dx$$

сходится равномерно по α на каждом сегменте $[\alpha_0, A_0]$, $0 < \alpha_0 < A_0 < \infty$. Выберем число ε_0 так, чтобы $0 < \varepsilon_0 < \alpha_0$; тогда $x^{\varepsilon_0} \ln x \rightarrow 0$ при $x \rightarrow 0$. Поэтому существует число δ такое, что $0 < \delta < 1$ и $|x^{\varepsilon_0} \ln x| \leq 1$ на $(0, \delta]$. Но тогда на $(0, \delta]$ справедливо неравенство

$$|\ln x \cdot x^{\alpha-1} e^{-x}| \leq x^{\alpha_0-\varepsilon_0-1},$$

и так как интеграл $\int_0^{\delta} \frac{dx}{x^{1-(\alpha_0-\varepsilon_0)}}$ сходится, то интеграл

$\int_0^{\delta} \ln x \cdot x^{\alpha-1} e^{-x} dx$ сходится равномерно относительно α на $[\alpha_0, \infty)$.

Аналогично для $\alpha \leq A_0$ существует такое число $\delta_1 > 1$, что для всех $x \geq \delta_1$ выполняется неравенство $\left| \frac{\ln x}{x} \cdot \frac{x^{\delta_1+2}}{e^x} \right| \leq 1$. При таких x и всех $\alpha \leq A_0$ получим $|\ln x \cdot x^{\alpha-1} e^{-x}| \leq 1/x^2$, откуда в силу признака сравнения следует, что интеграл $\int_{\delta_1}^{\infty} \ln x \cdot x^{\alpha-1} e^{-x} dx$ сходится равномерно относительно α на $[\alpha_0, A_0]$. Наконец, интеграл

$$\int_{\delta}^{\delta_1} \ln x \cdot x^{\alpha-1} e^{-x} dx,$$

в котором подынтегральная функция непрерывна в области $\delta \leq x \leq \delta_1$, $\alpha_0 \leq \alpha \leq A_0$, очевидно, сходится равномерно относительно α на $[\alpha_0, A_0]$. Таким образом, на $[\alpha_0, A_0]$ интеграл

$$\int_0^{\infty} \ln x \cdot x^{\alpha-1} e^{-x} dx$$

сходится равномерно (по α), а следовательно, функция $\Gamma(\alpha)$ дифференцируема при любом $\alpha > 0$ и справедливо равенство

$$\Gamma'(\alpha) = \int_0^{\infty} \ln x \cdot x^{\alpha-1} e^{-x} dx.$$

Относительно интеграла $\Gamma'(\alpha)$ можно повторить те же рассуждения и заключить, что

$$\Gamma''(\alpha) = \int_0^{\infty} \ln^2 x \cdot x^{\alpha-1} e^{-x} dx.$$

По индукции показывается, что Γ -функция бесконечно дифференцируема при $\alpha > 0$ и для ее n -й производной справедливо равенство

$$\Gamma^{(n)}(\alpha) = \int_0^{\infty} \ln^n x \cdot x^{\alpha-1} e^{-x} dx.$$

Установим теперь некоторое соотношение для Γ -функции, называемое формулой приведения. Для этого выражение для $\Gamma(\alpha+1)$ проинтегрируем по частям:

$$\Gamma(\alpha+1) = \int_0^{\infty} x^{\alpha} e^{-x} dx = -x^{\alpha} e^{-x} \Big|_0^{\infty} + \alpha \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx.$$

Следовательно,

$$\Gamma(\alpha+1) = \alpha\Gamma(\alpha).$$

Это соотношение и называется формулой приведения для Γ -функции. Если $\alpha > 1$, то, применив формулу приведения к $\Gamma(\alpha)$, получим

$$\Gamma(\alpha+1) = \alpha\Gamma(\alpha) = \alpha(\alpha-1)\Gamma(\alpha-1).$$

Если $n-1 < \alpha < n$, то в результате последовательного применения формулы приведения получим

$$\Gamma(\alpha+1) = \alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-n+1)\Gamma(\alpha-n+1).$$

Это равенство показывает, что достаточно знать $\Gamma(\alpha)$ на $(0, 1]$, чтобы вычислить ее значение при любом $\alpha > 0$. Например, при $\alpha = n$ получаем

$$\Gamma(n-1) = n(n-1) \dots 2 \cdot 1 \cdot \Gamma(1).$$

Поскольку $\Gamma(1) = \int_0^{\infty} e^{-x} dx = 1$, то

$$\Gamma(n+1) = n!$$

Из этой формулы, например, получаем

$$\Gamma(1) = 1 = 0!,$$

что соответствует соглашению $0! = 1$.

Изучим теперь поведение Γ -функции и построим эскиз ее графика.

Из выражения для второй производной Γ -функции видно, что $\Gamma''(\alpha) > 0$ для всех $\alpha > 0$. Следовательно, $\Gamma'(\alpha)$ возрастает. Поскольку $\Gamma(2) = 1 \cdot \Gamma(1) = \Gamma(1)$, то по теореме Ролля на сегменте $[1, 2]$ производная $\Gamma'(\alpha)$ имеет единственный нуль в некоторой точке α^1 . Следовательно, $\Gamma'(\alpha) < 0$ при $\alpha < \alpha^1$ и $\Gamma'(\alpha) > 0$ при $\alpha > \alpha^1$, т. е. $\Gamma(\alpha)$ монотонно убывает на $(0, \alpha^1)$ и монотонно возрастает на (α^1, ∞) . Далее, поскольку $\Gamma(\alpha) = \Gamma(\alpha+1)/\alpha$, то $\Gamma(\alpha) \rightarrow +\infty$ при $\alpha \rightarrow 0+0$. При $\alpha > 2$ из формулы $\Gamma(\alpha) = (\alpha-1)\Gamma(\alpha-1) > (\alpha-1)\Gamma(1) = \alpha-1$ следует, что $\Gamma(\alpha) \rightarrow +\infty$ при $\alpha \rightarrow +\infty$.

Равенство $\Gamma(\alpha) = \Gamma(\alpha+1)/\alpha$, справедливое при $\alpha > 0$, можно использовать при распространении Γ -функции на отрицательные значения α .

Положим для $-1 < \alpha < 0$, что $\Gamma(\alpha) = \Gamma(\alpha+1)/\alpha$. Правая часть этого равенства определена для α из $(-1, 0)$. Получаем, что так продолженная функция $\Gamma(\alpha)$ принимает на $(-1, 0)$ отрицательные значения и при $\alpha \rightarrow -1+0$, а также при $\alpha \rightarrow 0-0$ функция $\Gamma(\alpha) \rightarrow -\infty$.

Определив таким образом $\Gamma(\alpha)$ на $(-1, 0)$, мы можем по той же формуле продолжить ее на интервал $(-2, -1)$. На этом

интервале продолжением $\Gamma(\alpha)$ окажется функция, принимающая положительные значения и такая, что $\Gamma(\alpha) \rightarrow +\infty$ при $\alpha \rightarrow -1-0$ и $\alpha \rightarrow -2+0$. Продолжая этот процесс, определим функцию $\Gamma(\alpha)$, имеющую разрывы второго рода в целочисленных точках $\alpha = -k$, $k=0, 1, 2, \dots$ (см. рис. 7.1).

Отметим еще раз, что интеграл

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$$

определяет Γ -функцию только при положительных значениях α , продолжение на отрицательные значения α осуществлено нами формально с помощью формулы приведения $\Gamma(\alpha+1) = \alpha\Gamma(\alpha)$.

2. В-функция. Рассмотрим интеграл, определяющий В-функцию:

$$B(\alpha, \beta) = \int_0^1 x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} dx.$$

Интеграл $\int_0^{1/2} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} dx$ сходится при $\alpha > 0$ и любом β , так как при $0 < x \leq 1/2$ справедливо неравенство $0 < x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} \leq cx^{\alpha-1}$ при некотором $c > 0$ и интеграл $\int_0^{1/2} x^{\alpha-1} dx$ при $\alpha > 0$ сходится.

Этот интеграл сходится равномерно относительно α и β в области $\alpha \geq \alpha_0 > 0$, $\beta \geq 0$, поскольку

$$0 \leq x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} \leq cx^{\alpha_0-1}$$

при всех $\alpha \geq \alpha_0$ и $\beta \geq 0$ и для всех $x \in (0, 1/2]$.

Аналогично проверяется сходимость интеграла

$$\int_{1/2}^1 x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} dx$$

при любых $\alpha \geq 0$ и $\beta > 0$, а также его равномерная сходимость в области $\alpha \geq 0$, $\beta \geq \beta_0 > 0$, где $\beta_0 > 0$ — произвольное число.




Рис. 7.1

Таким образом, интеграл

$$B(\alpha, \beta) = \int_0^1 x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} dx$$

сходится при всех $\alpha > 0$ и $\beta > 0$ и сходится равномерно по α и β на множестве $\alpha \geq \alpha_0 > 0$, $\beta \geq \beta_0 > 0$, где α_0 и β_0 — произвольные положительные числа.

Точно так же, как и для Γ -функции, можно показать, что B -функция является бесконечно дифференцируемой при $0 < \alpha < \infty$, $0 < \beta < \infty$. Однако это мы установим ниже, используя выражение B -функции через Γ -функцию. Поэтому показывать непосредственно дифференцируемость B -функции мы не будем.

Установим некоторые свойства B -функции.

1°. Симметричность B -функции: при всех $\alpha > 0$, $\beta > 0$ имеет место равенство

$$B(\alpha, \beta) = B(\beta, \alpha),$$

т. е. B -функция симметрична относительно своих аргументов.

В интеграле, определяющем B -функцию, сделаем замену переменной, положив $t = 1 - x$. Получим

$$\begin{aligned} B(\alpha, \beta) &= \int_0^1 x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} dx = - \int_1^0 (1-t)^{\alpha-1} t^{\beta-1} dt = \\ &= \int_0^1 t^{\beta-1} (1-t)^{\alpha-1} dt = B(\beta, \alpha). \end{aligned}$$

2°. Формула приведения для B -функции: для любых $\alpha > 0$ и $\beta > 0$ имеет место следующая формула приведения:

$$B(\alpha + 1, \beta) = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} B(\alpha, \beta).$$

Действительно,

$$\begin{aligned} B(\alpha + 1, \beta) &= \int_0^1 x^{\alpha} (1-x)^{\beta-1} dx = - \frac{1}{\beta} x^{\alpha} (1-x)^{\beta} \Big|_0^1 + \\ &+ \frac{\alpha}{\beta} \int_0^1 x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta} dx = \frac{\alpha}{\beta} \int_0^1 x^{\alpha-1} (1-x) (1-x)^{\beta-1} dx = \\ &= \frac{\alpha}{\beta} \left[\int_0^1 x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} dx - \int_0^1 x^{\alpha} (1-x)^{\beta-1} dx \right] = \\ &= \frac{\alpha}{\beta} B(\alpha, \beta) - \frac{\alpha}{\beta} B(\alpha + 1, \beta). \end{aligned}$$

Таким образом,

$$B(\alpha + 1, \beta) = \frac{\alpha}{\beta} B(\alpha, \beta) - \frac{\alpha}{\beta} B(\alpha + 1, \beta),$$

откуда

$$B(\alpha + 1, \beta) = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} B(\alpha, \beta).$$

Из свойства симметрии для любых $\alpha > 0$ и $\beta > 0$ получается также формула

$$B(\alpha, \beta + 1) = \frac{\beta}{\alpha + \beta} B(\alpha, \beta).$$

Последовательное применение этих формул дает возможность выразить любые значения $B(\alpha, \beta)$ через значения этой функции в прямоугольнике $\Pi = \{0 < \alpha \leq 1, 0 < \beta \leq 1\}$.

3. Связь между эйлеровыми интегралами. В интеграле, определяющем $\Gamma(\alpha)$, сделаем замену, полагая $x = ut$, где $u > 0$, а в интеграле, определяющем $B(\alpha, \beta)$, сделаем замену $x = \frac{t}{1+t}$:

$$\Gamma(\alpha) = u^\alpha \int_0^\infty t^{\alpha-1} e^{-ut} dt, \quad B(\alpha, \beta) = \int_0^\infty \frac{t^{\alpha-1}}{(1+t)^{\alpha+\beta}} dt.$$

Заменив в первом интеграле u через $1+v$, а α через $\alpha+\beta$, получим

$$\frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{(1+v)^{\alpha+\beta}} = \int_0^\infty t^{\alpha+\beta-1} e^{-(1+v)t} dt.$$

Умножим обе части последнего равенства на $v^{\alpha-1}$:

$$\Gamma(\alpha+\beta) \frac{v^{\alpha-1}}{(1+v)^{\alpha+\beta}} = \int_0^\infty t^{\alpha+\beta-1} e^{-(1+v)t} v^{\alpha-1} dt.$$

Предположим, что $\alpha > 1$, $\beta > 1$, и рассмотрим в области $t \geq 0$, $v \geq 0$ функцию

$$f(t, v) = t^{\alpha+\beta-1} v^{\alpha-1} e^{-(1+v)t}.$$

Очевидно, что в этой области $f(t, v) \geq 0$. Далее, интеграл

$$I(v) = \int_0^\infty f(t, v) dt = \Gamma(\alpha+\beta) \frac{v^{\alpha-1}}{(1+v)^{\alpha+\beta}}$$

является непрерывной функцией от v на полупрямой $v \geq 0$. Интег-

рал по другому аргументу от этой функции также непрерывен по t на полупрямой $t \geq 0$, поскольку

$$K(t) = \int_0^{\infty} f(t, v) dv = t^{\alpha+\beta-1} e^{-t} \int_0^{\infty} e^{-tv} v^{\alpha-1} dv = \Gamma(\alpha) t^{\beta-1} e^{-t}.$$

Наконец, существует повторный интеграл

$$\int_0^{\infty} K(t) dt = \int_0^{\infty} dt \int_0^{\infty} f(t, v) dv = \int_0^{\infty} \Gamma(\alpha) t^{\beta-1} e^{-t} dt = \Gamma(\alpha) \Gamma(\beta).$$

Следовательно, в силу теоремы 7.13 § 3 имеет место равенство

$$\int_0^{\infty} I(v) dv = \int_0^{\infty} K(t) dt,$$

или

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} I(v) dv &= \int_0^{\infty} \Gamma(\alpha + \beta) \frac{v^{\alpha-1}}{(1+v)^{\alpha+\beta}} dv = \Gamma(\alpha + \beta) \int_0^{\infty} \frac{v^{\alpha-1}}{(1+v)^{\alpha+\beta}} dv = \\ &= \int_0^{\infty} K(t) dt = \Gamma(\alpha) \Gamma(\beta). \end{aligned}$$

Таким образом,

$$\Gamma(\alpha + \beta) \int_0^{\infty} \frac{v^{\alpha-1}}{(1+v)^{\alpha+\beta}} dv = \Gamma(\alpha + \beta) B(\alpha, \beta) = \Gamma(\alpha) \Gamma(\beta),$$

где мы воспользовались установленным выше равенством:

$$\int_0^{\infty} \frac{v^{\alpha-1}}{(1+v)^{\alpha+\beta}} dv = B(\alpha, \beta).$$

В результате получим, что для всех $\alpha > 1$, $\beta > 1$

$$B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha) \Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha + \beta)}.$$

Распространим эту формулу на значения $\alpha > 0$, $\beta > 0$. По доказанному справедлива формула

$$B(\alpha + 1, \beta + 1) = \frac{\Gamma(\alpha + 1) \Gamma(\beta + 1)}{\Gamma(\alpha + \beta + 2)}.$$

Воспользовавшись формулами приведения, получим

$$B(\alpha + 1, \beta + 1) = \frac{\alpha}{\alpha + \beta + 1} B(\alpha, \beta + 1) = \frac{\alpha}{\alpha + \beta + 1} \frac{\beta}{\alpha + \beta} B(\alpha, \beta);$$

$$\Gamma(\alpha + 1) = \alpha \Gamma(\alpha); \quad \Gamma(\beta + 1) = \beta \Gamma(\beta);$$

$$\Gamma(\alpha + \beta + 2) = (\alpha + \beta + 1)(\alpha + \beta) \Gamma(\alpha + \beta).$$

Подставляя эти выражения в формулу для $B(\alpha + 1, \beta + 1)$, получим формулу

$$B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha) \Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha + \beta)}$$

для всей области $\alpha > 0, \beta > 0$.

4. Примеры. Приведем примеры вычисления некоторых интегралов путем сведения их к эйлеровым интегралам.

1°. Вычислим интеграл

$$I = \int_0^{\infty} x^{1/4} (1+x)^{-2} dx.$$

Очевидно, что

$$I = B\left(\frac{5}{4}, \frac{3}{4}\right) = \frac{\Gamma\left(\frac{5}{4}\right) \Gamma\left(\frac{3}{4}\right)}{\Gamma(2)} = \frac{1}{4} \Gamma\left(\frac{1}{4}\right) \Gamma\left(\frac{3}{4}\right).$$

2°. Найдем значение интеграла

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{\alpha-1} t \cos^{\beta-1} t dt.$$

Полагая $x = \sin^2 t$, получим

$$I = \frac{1}{2} \int_0^1 x^{\frac{\alpha}{2}-1} (1-x)^{\frac{\beta}{2}-1} dx = \frac{1}{2} B\left(\frac{\alpha}{2}, \frac{\beta}{2}\right) = \frac{1}{2} \frac{\Gamma\left(\frac{\alpha}{2}\right) \Gamma\left(\frac{\beta}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)}.$$

3°. Вычислим интеграл

$$I_{\alpha-1} = \int_0^{\pi/2} \sin^{\alpha-1} t dt.$$

Используя пример 2° (при $\beta = 1$), получим

$$I_{\alpha-1} = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \frac{\Gamma\left(\frac{\alpha}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{\alpha+1}{2}\right)}.$$

Далее,

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{\infty} e^{-t} \frac{dt}{\sqrt{t}} = 2 \int_0^{\infty} e^{-(\sqrt{t})^2} d(\sqrt{t}).$$

Заменяя $\sqrt{t}$ на x и вспоминая, что интеграл $\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ (см.

пример 3° § 4), получим $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$. Поэтому

$$I_{\alpha-1} = \int_0^{\pi/2} \sin^{\alpha-1} t \, dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{\Gamma\left(\frac{\alpha}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{\alpha+1}{2}\right)}.$$

§ 6. ФОРМУЛА СТИРЛИНГА

Мы уже знаем, что

$$n! = \Gamma(n+1) = \int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx.$$

Найдем представление величины $n!$ при больших значениях n (так называемое асимптотическое представление). Мы докажем формулу

$$n! = \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n} \left(1 + \frac{\omega}{\sqrt{n}}\right),$$

где величина ω заключена между -1 и $+1$. Это и есть формула Стирлинга.

Перейдем к ее доказательству. Заметим, что функция $x^n e^{-x}$ возрастает на $[0, n]$ от 0 до $\left(\frac{n}{e}\right)^n$ и убывает на $[n, +\infty)$ от $\left(\frac{n}{e}\right)^n$ до 0. Заметим, что

$$x^n e^{-x} = \left(\frac{n}{e}\right)^n \left(\frac{x}{n}\right)^n e^{n-x},$$

а поэтому

$$n! = \left(\frac{n}{e}\right)^n \int_0^{\infty} \left(\frac{x}{n}\right)^n e^{n-x} dx.$$

Функция $\left(\frac{x}{n}\right)^n e^{n-x}$ на $[0, n]$ возрастает от 0 до 1, а на $[n, +\infty)$ убывает от 1 до 0. Поэтому можно сделать замену переменной

$$\left(\frac{x}{n}\right)^n e^{n-x} = e^{-t^2}. \quad (*)$$

При этом сегменту $[0, n]$ изменения x будет отвечать полуось $(-\infty, 0]$ изменения t , а полуоси $[n, \infty)$ изменения x — полуось $[0, \infty)$ изменения t .

Для проведения замены переменной $(*)$ необходимо найти производную $\frac{dx}{dt}$. Для любого $x \neq n$, дифференцируя левую и правую части $(*)$ по t , получим равенство

$$\frac{dx}{dt} = \frac{2tx}{x-n}.$$

С другой стороны, логарифмируя равенство $(*)$, получим

$$t^2 = x - n - n \ln \left(1 + \frac{x-n}{n}\right).$$

Записывая для функции $f(y) = \ln(1+y)$ формулу Маклорена с остаточным членом в форме Лагранжа, мы получим, что найдется число θ из интервала $0 < \theta < 1$ такое, что $\ln(1+y) = y - \frac{y^2}{2} \cdot \frac{1}{(1+\theta y)^2}$, так что при $y = \frac{x-n}{n}$

$$\ln \left(1 + \frac{x-n}{n}\right) = \frac{x-n}{n} - \frac{1}{2} \frac{(x-n)^2}{[n + \theta(x-n)]^2},$$

и потому

$$t^2 = \frac{n}{2} \frac{(x-n)^2}{[n + \theta(x-n)]^2}.$$

Отсюда

$$t = \sqrt{\frac{n}{2}} \frac{x-n}{n + \theta(x-n)} = \sqrt{\frac{n}{2}} \frac{1}{\theta + \frac{n}{x-n}}.$$

Поэтому $\frac{n}{x-n} = \frac{1}{t} \sqrt{\frac{n}{2}} - \theta$, а, следовательно,

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= 2t \frac{x}{x-n} = 2t \left[1 + \frac{n}{x-n}\right] = 2t \left[\frac{1}{t} \sqrt{\frac{n}{2}} + 1 - \theta\right] = \\ &= 2 \sqrt{\frac{n}{2}} + 2t(1 - \theta). \end{aligned}$$

Теперь в интеграле $\int_0^\infty \left(\frac{x}{n}\right)^n e^{n-x} dx$ произведем замену переменной $(*)$:

$$n! = \left(\frac{n}{e}\right)^n \int_0^{\infty} \left(\frac{x}{n}\right) e^{n-x} dx = \left(\frac{n}{e}\right)^n \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} \left[2 \sqrt{\frac{n}{2}} + 2t(1-\theta) \right] dt =$$

$$= \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2n} \left[\int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} dt + \frac{2}{\sqrt{2n}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} t(1-\theta) dt \right].$$

Оценим интеграл $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} t(1-\theta) dt$. Заметим, что

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} t(1-\theta) dt \leq 2 \int_0^{\infty} t e^{-t^2} dt = -e^{-t^2} \Big|_0^{\infty} = 1.$$

Учитывая, что $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$ и $\sqrt{\pi} > 2$, окончательно получим

$$n! = \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n} \left(1 + \frac{\omega}{\sqrt{n}}\right),$$

где $|\omega| \leq 1$. Формула Стирлинга обоснована.

Заметим, что более детальный анализ показывает, что справедливо, например, следующее разложение ⁴⁾:

$$n! = \Gamma(n+1) = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \left[1 + \frac{1}{12n} + \frac{1}{288n^2} \cdot \frac{139}{51840n^3} + O\left(\frac{1}{n^4}\right) \right],$$

в котором остаток не превосходит последнего удерживаемого слагаемого.

§ 7. КРАТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ПАРАМЕТРОВ

1. Собственные кратные интегралы, зависящие от параметров.

Пусть $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ — точка ограниченной области Ω_n n -мерного евклидова пространства E^n , а $y = (y_1, y_2, \dots, y_m)$ — точка ограниченной области D_m пространства E^m . Обозначим через $\Omega_n \times D_m$ прямое произведение области Ω_n на область D_m , являющееся подмножеством $(n+m)$ -мерного евклидова пространства E^{n+m} , состоящим из точек $z = (z_1, z_2, \dots, z_{n+m})$ таких, что точка $(z_1, z_2, \dots, z_n)$ принадлежит Ω_n , а точка $(z_{n+1}, z_{n+2}, \dots, z_{n+m})$ принадлежит D_m (часто пишут так: $z = (x, y)$).

Тот факт, что точка z принадлежит $\Omega_n \times D_m$, обычно записывают следующим образом: $z = (x, y) \in \Omega_n \times D_m$.

⁴⁾ См., например, § 5 гл. 9 книги В. А. Ильина и Э. Г. Позняка «Основы математического анализа. Ч. 2» (см. сноску на с. 299).

Замыкание области Ω_n будем обозначать символом $\bar{\Omega}_n$, а замыкание D_m — символом $\bar{D}_m$. Легко видеть, что замыкание $\Omega_n \times D_m$ совпадает с $\bar{\Omega}_n \times \bar{D}_m$.

Пусть функция $f(x, y)$ определена в $\Omega_n \times D_m$, причем для любого $y_0 \in D_m$ функция $f(x, y)$ интегрируема по x в области Ω_n . Тогда функцию

$$I(y) = \int_{\Omega_n} f(x, y) dx, \quad (7.9)$$

определенную в D_m , называют интегралом, зависящим от параметра $y = (y_1, y_2, \dots, y_m)$, т. е. фактически от m числовых параметров.

Точно так же, как и в § 2, доказываются следующие теоремы.

Теорема 7.15 (о непрерывности интеграла по параметру). Пусть функция $f(x, y)$ непрерывна по совокупности аргументов в замкнутой области $\bar{\Omega}_n \times \bar{D}_m$, тогда интеграл (7.9) является непрерывной функцией параметра y в области D_m .

Теорема 7.16 (об интегрировании интеграла по параметру). Пусть функция $f(x, y)$ непрерывна по совокупности аргументов в замкнутой области $\bar{\Omega}_n \times \bar{D}_m$. Тогда функцию (7.9) можно интегрировать по параметру под знаком интеграла, т. е. справедливо равенство

$$\int_{D_m} I(y) dy = \int_{\Omega_n} dx \int_{D_m} f(x, y) dy.$$

Теорема 7.17 (о дифференцируемости интеграла по параметру). Пусть функция $f(x, y)$ и ее частная производная $\frac{\partial f}{\partial y_k}$ непрерывны в $\bar{\Omega}_n \times \bar{D}_m$. Тогда интеграл (7.9) имеет в области D_m непрерывную частную производную

$$\frac{\partial I(y)}{\partial y_k}, \quad \text{причем} \quad \frac{\partial I(y)}{\partial y_k} = \int_{\Omega_n} \frac{\partial f(x, y)}{\partial y_k} dx.$$

2. Несобственные кратные интегралы, зависящие от параметра. Рассмотрим для простоты случай, когда $\Omega_n = D_m = D$. Пусть функция $f(x, y)$ также имеет специальный вид: $f(x, y) = F(x, y)g(x)$, где $F(x, y)$ непрерывна при $x \neq y$ в $\bar{D} \times \bar{D}$, а функция $g(x)$ ограничена в D , $|g(x)| \leq M$. Таким образом, рассмотрим интеграл

$$V(y) = \int_D F(x, y) g(x) dx, \quad (7.10)$$

где подынтегральная функция может иметь особенность лишь при $x = y$. Таким образом, особенность подынтегральной функции зависит от параметра.

Введем определение равномерной сходимости интеграла (7.10) в точке. Обозначим через $B(y_0, \delta)$ m -мерный шар радиуса δ с центром в точке y_0 .

Определение. Интеграл (7.10) назовем *сходящимся равномерно по параметру y в точке $y_0 \in D$* , если для любого $\varepsilon > 0$ можно указать $\delta > 0$ такое, что $B(y_0, \delta) \subset D$, и для любой кубируемой области $G \subset B(y_0, \delta)$ и всех $y \in B(y_0, \delta)$ выполняется неравенство

$$\left| \int_G F(x, y) g(x) dx \right| < \varepsilon.$$

Теорема 7.18. Если интеграл (7.10) сходится равномерно по y в точке $y_0 \in D$, то он непрерывен в точке y_0 .

Доказательство. Требуется доказать, что для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что при $|y - y_0| = \rho(y, y_0) < \delta$ выполнено неравенство $|V(y) - V(y_0)| < \varepsilon$. Из равномерной сходимости интеграла в точке следует, что существует $\delta_1 > 0$ такое, что $B(y_0, \delta_1) \subset D$ и при $y \in B(y_0, \delta_1)$

$$\left| \int_{B(y_0, \delta_1)} F(x, y) g(x) dx \right| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Пусть

$$V_1(y) = \int_{B(y_0, \delta_1)} F(x, y) g(x) dx;$$

$$V_2(y) = \int_{B'(y_0, \delta_1)} F(x, y) g(x) dx,$$

где $B'(y_0, \delta_1) = D \setminus B(y_0, \delta_1)$ — дополнение шара $B(y_0, \delta_1)$ до области D .

Заметим, что при $x \in B'(y_0, \delta_1)$, $y \in B(y_0, \delta_1/2)$ функция $F(x, y)$ будет равномерно непрерывной по совокупности аргументов. Поэтому найдется положительное число $\delta < \delta_1/2$ такое, что при $\rho(y, y_0) < \delta$ будет выполнено неравенство

$$|F(x, y_0) - F(x, y)| < \frac{\varepsilon}{3M|D|},$$

где M — константа, ограничивающая функцию $g(x)$ в D , $|D|$ — объем области D . При $\rho(y, y_0) < \delta$

$$|V_2(y) - V_2(y_0)| \leq M \int_{B'(y_0, \delta_1)} |F(x, y_0) - F(x, y)| dx < \frac{1}{3} \varepsilon.$$

Поэтому

$$|V(y) - V(y_0)| \leq |V_1(y)| + |V_1(y_0)| + |V_2(y) - V_2(y_0)| < \varepsilon,$$

так как $|V_1(y)| < \varepsilon/3$, $|V_1(y_0)| < \varepsilon/3$. Теорема доказана.

Укажем достаточное условие равномерной по параметру сходимости интеграла (7.10) в каждой точке $y_0 \in D \subset E^m$.

Теорема 7.19. Пусть функция $F(x, y)$ непрерывна в $\bar{D} \times \bar{D}$ при $x \neq y$, а $g(x)$ равномерно ограничена в D . Предположим, что существуют постоянные λ , $0 < \lambda < m$, и $c > 0$ такие, что для всех $x \in D$, $y \in D$ справедливо неравенство

$$|F(x, y)| \leq C |x - y|^{-\lambda}.$$

Тогда интеграл (7.10) сходится равномерно по y в каждой точке $y_0 \in D$.

Доказательство. Покажем, что для любой точки y_0 области D и любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что для любой кубической области $G \subset B(y_0, \delta)$ и всех $y \in B(y_0, \delta)$ выполнено неравенство

$$\left| \int_G F(x, y) g(x) dx \right| < \varepsilon.$$

Учитывая оценку для $F(x, y)$ и ограниченность $g(x)$, получим

$$\left| \int_G F(x, y) g(x) dx \right| \leq M_1 \int_G |x - y|^{-\lambda} dx.$$

Фиксируем точку $y \in B(y_0, \delta)$. Из условия $G \subset B(y_0, \delta)$ вытекает условие $G \subset B(y, 2\delta)$. Поэтому

$$\left| \int_G F(x, y) g(x) dx \right| \leq M_1 \int_{B(y, 2\delta)} |x - y|^{-\lambda} dx.$$

Интеграл в правой части можно вычислить в m -мерных сферических координатах; тогда

$$\left| \int_G F(x, y) g(x) dx \right| \leq M_2 \int_0^{2\delta} r^{m-1-\lambda} dr = \frac{M_2 \cdot 2^{m-\lambda}}{m-\lambda} \delta^{m-\lambda} = M_3 \delta^{m-\lambda}.$$

Ясно, что при достаточно малом δ величина $\left| \int_G F(x, y) g(x) dx \right|$ может быть сделана меньше ε . Теорема доказана.

Пример. Применим полученные результаты к теории так называемого ньютонова потенциала. Пусть в некоторую точку $A_0(x, y, z)$ помещена масса m_0 . На массу m , помещенную в точку $A_1(x_1, y_1, z_1)$, по закону всемирного тяготения действует сила

$$\mathbf{F} = -\gamma \frac{mm_0}{R^2} \mathbf{r},$$

где $R = \rho(A_0, A_1)$, γ — гравитационная постоянная, $\mathbf{r} = \frac{\mathbf{R}}{R}$ —

единичный вектор, направление которого совпадает с направлением вектора $\overrightarrow{A_0 A_1}$. Пусть $\gamma = 1$, $m = 1$; тогда

$$\mathbf{F} = -\frac{m_0}{R} \mathbf{r},$$

или покомпонентно

$$X = -\frac{m_0}{R^3} (x_1 - x), \quad Y = -\frac{m_0}{R^3} (y_1 - y), \quad Z = -\frac{m_0}{R^3} (z_1 - z).$$

Очевидно, что потенциал силы тяготения, определяемый как скалярная функция u такая, что $\mathbf{F} = \text{grad } u$, равен

$$u = \frac{m_0}{R}.$$

Если же масса сосредоточена не в точке $A_0(x, y, z)$, а распределена по области D с плотностью $\mu(x, y, z)$, то для потенциала и для компонент силы получим

$$U(x_1, y_1, z_1) = \iiint_D \frac{\mu(x, y, z)}{R} dx dy dz;$$

$$X = -\iiint_D \frac{\mu(x, y, z)}{R^3} (x_1 - x) dx dy dz,$$

$$Y = -\iiint_D \frac{\mu(x, y, z)}{R^3} (y_1 - y) dx dy dz,$$

$$Z = -\iiint_D \frac{\mu(x, y, z)}{R^3} (z_1 - z) dx dy dz.$$

Интегралы для X, Y, Z представляют собой частные производные потенциала u . Подынтегральные выражения во всех интегралах можно оценить через $CR^{-\lambda}$, где $\lambda = 1$ для интеграла, представляющего потенциал u , и $\lambda = 2$ для интегралов, представляющих компоненты силы. Так как $\lambda < 3$, то в силу теоремы 7.19 все интегралы сходятся равномерно по параметрам в любой точке $A_1(x_1, y_1, z_1)$. Следовательно, по теореме 7.18 они представляют собой непрерывные функции точки $A_1(x_1, y_1, z_1)$.

Глава 8

РЯДЫ ФУРЬЕ

Изучаемая в настоящей главе проблема разложения функции в ряд Фурье является обобщением и развитием идеи разложения вектора по базису.

Из линейной алгебры известно, что если в линейном пространстве *конечной* размерности выбрать некоторый базис, то любой вектор этого пространства может быть разложен по базису, т. е. представлен в виде линейной комбинации базисных векторов. Гораздо более сложными являются вопросы о выборе базиса и о разложении по базису для случая *бесконечномерного* пространства. В настоящей главе эти вопросы изучаются для случая *евклидовых* бесконечномерных пространств и для базисов специального типа (*ортонормированных* базисов).

Особенно подробно изучается базис, образованный в пространстве всех кусочно непрерывных на некотором сегменте функций так называемой тригонометрической системой.

§ 1. ОРТОНОРМИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ И ОБЩИЕ РЯДЫ ФУРЬЕ

1. Ортонормированные системы. Будем рассматривать произвольное евклидово пространство бесконечной размерности. Напомним, что линейное пространство R называется *евклидовым*, если выполнены два условия:

1) известно правило, посредством которого любым двум элементам f и g пространства R ставится в соответствие число, называемое *скалярным произведением* этих элементов и обозначаемое символом (f, g) ;

2) указанное правило удовлетворяет следующим четырем аксиомам:

1°. $(f, g) = (g, f)$ (переместительное свойство);

2°. $(f + g, h) = (f, h) + (g, h)$ (распределительное свойство);

3°. $(\lambda f, g) = \lambda(f, g)$ для любого вещественного λ ;

4°. $(f, f) > 0$, если f — ненулевой элемент;

$(f, f) = 0$, если f — нулевой элемент.

Напомним, далее, что линейное (и, в частности, евклидово) пространство называется *бесконечномерным*, если в этом пространстве найдется любое наперед взятое число линейно независимых элементов.

Приведем классический пример евклидова пространства бесконечной размерности.

Напомним, что функция $f(x)$ называется кусочно непрерывной на сегменте $[a, b]$, если она непрерывна всюду на этом сегменте, за исключением конечного числа точек, в каждой из которых она имеет разрыв первого рода¹⁾.

Для линейного пространства всех кусочно непрерывных на сегменте $[a, b]$ функций естественно ввести скалярное произведение любых двух функций $f(x)$ и $g(x)$, определив его равенством

$$(f, g) = \int_a^b f(x) g(x) dx. \quad (8.1)$$

Легко проверяется, что при таком определении справедливы первые три аксиомы скалярного произведения. Однако для того, чтобы оказалась справедливой и четвертая аксиома, приходится принять дополнительную договоренность о том, чтобы значение кусочно непрерывной функции $f(x)$ в каждой ее точке разрыва x_i равнялось полусумме правого и левого ее пределов в этой точке:

$$f(x_i) = \frac{f(x_i + 0) + f(x_i - 0)}{2}. \quad (8.2)$$

В самом деле, во-первых, всегда $(f, f) = \int_a^b f^2(x) dx \geq 0$. Далее, заметим, что так как $f(x)$ кусочно непрерывна на $[a, b]$, то весь сегмент $[a, b]$ распадается на конечное число сегментов $[x_{i-1}, x_i]$, на каждом из которых функция $f(x)$ непрерывна при условии, что в качестве значений $f(x)$ на концах соответствующего сегмента $[x_{i-1}, x_i]$ берутся $f(x_{i-1}+0)$ и $f(x_i-0)$. Из равенства $\int_a^b f^2(x) dx = 0$ вытекает, что для каждого сегмента $[x_{i-1}, x_i]$

справедливо равенство $\int_{x_{i-1}}^{x_i} f^2(x) dx = 0$.

Из этого равенства и из непрерывности $f(x)$ на сегменте $[x_{i-1}, x_i]$ вытекает, что на этом сегменте $f(x) \equiv 0$. В частности, $f(x_{i-1}+0)$ и $f(x_i-0)$ равны нулю. Так как эти рассуждения справедливы для любого сегмента $[x_{i-1}, x_i]$, т. е. для всех $i=1, 2, \dots, n$, то правый и левый пределы в любой точке x_i равны нулю, а отсюда в силу соотношения (8.2) и само значение $f(x_i)$ в любой точке x_i равно. Итак, функция $f(x)$ равна нулю во всех точках сегмента $[a, b]$, т. е. является нулевым элементом линейного пространства всех кусочно непрерывных на сегменте $[a, b]$ функций.

¹⁾ Т. е. в каждой точке разрыва x_0 у функции $f(x)$ существует конечный левый и конечный правый пределы.

Тем самым мы доказали, что *пространство всех кусочно непрерывных на сегменте $[a, b]$ функций с условием (8.2) в каждой точке разрыва и со скалярным произведением, определяемым соотношением (8.1), является евклидовым пространством.*

Это евклидово пространство мы в дальнейшем будем обозначать символом R_0 .

Напомним теперь два общих свойства любого евклидова пространства, которыми, естественно, будет обладать и пространство R_0 :

1) *во всяком евклидовом пространстве для любых двух элементов f и g справедливо неравенство*

$$(f, g)^2 \leq (f, f)(g, g), \quad (8.3)$$

называемое неравенством Коши—Буняковского²⁾;

2) *во всяком евклидовом пространстве для любого элемента f этого пространства можно ввести понятие нормы этого элемента, определив ее как число, обозначаемое символом $\|f\|$ и определяемое равенством*

$$\|f\| = \sqrt{(f, f)}, \quad (8.4)$$

так что будут справедливы следующие три свойства:

1°. $\|f\| \geq 0$, причем $\|f\| = 0$ лишь тогда, когда f — нулевой элемент;

2°. $\|\lambda f\| = |\lambda| \cdot \|f\|$ для любого элемента f и любого вещественного λ ;

3°. $\|f + g\| \leq \|f\| + \|g\|$. (8.5)

для любых двух элементов f и g (это неравенство называется неравенством треугольника).

В самом деле, справедливость свойства 1° сразу же вытекает из (8.4) и из аксиомы 4° скалярного произведения.

Для обоснования свойства 2° заметим, что в силу (8.4) и аксиом скалярного произведения

$$\|\lambda f\| = \sqrt{(\lambda f, \lambda f)} = \sqrt{\lambda (f, \lambda f)} = \sqrt{\lambda (\lambda f, f)} = \sqrt{\lambda^2 (f, f)} = |\lambda| \cdot \|f\|.$$

Наконец, справедливость свойства 3° вытекает из (8.4), из аксиом скалярного произведения и из неравенства Коши—Буняковского (8.3). Действительно,

²⁾ Для доказательства неравенства (8.3) заметим, что для любого вещественного λ в силу аксиомы 4° скалярного произведения справедливо неравенство $(\lambda f - g, \lambda f - g) \geq 0$, которое в силу аксиом 1°—4° эквивалентно неравенству $\lambda^2 (f, f) - 2\lambda (f, g) + (g, g) \geq 0$. Необходимым и достаточным условием неотрицательности квадратного трехчлена, стоящего в левой части последнего неравенства, является неположительность его дискриминанта, т. е. неравенство $(f, g)^2 - (f, f)(g, g) \leq 0$, которое эквивалентно неравенству (8.3).

$$\begin{aligned} \|f + g\| &= \sqrt{(f + g, f + g)} = \sqrt{(f, f) + 2(f, g) + (g, g)} \leq \\ &\leq \sqrt{(f, f) + 2\sqrt{(f, f)}\sqrt{(g, g)} + (g, g)} = \sqrt{[\sqrt{(f, f)} + \sqrt{(g, g)}]^2} = \\ &= \sqrt{(f, f)} + \sqrt{(g, g)} = \|f\| + \|g\|. \end{aligned}$$

В частности, во введенном выше евклидовом пространстве R_0 всех кусочно непрерывных на сегменте $[a, b]$ функций норма (8.4) любого элемента f определяется равенством

$$\|f\| = \sqrt{\int_a^b f^2(x) dx}, \quad (8.6)$$

а неравенства Коши—Буняковского (8.3) и треугольника (8.5) принимают вид

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx\right)^2 \leq \int_a^b f^2(x)dx \int_a^b g^2(x)dx; \quad (8.7)$$

$$\sqrt{\int_a^b [f(x) + g(x)]^2 dx} \leq \sqrt{\int_a^b f^2(x)dx} + \sqrt{\int_a^b g^2(x)dx}. \quad (8.8)$$

Введем теперь в произвольном бесконечномерном евклидовом пространстве R понятия ортогональных элементов и ортонормированной системы элементов.

Определение 1. Два элемента f и g евклидова пространства называются ортогональными, если скалярное произведение (f, g) этих элементов равно нулю.

Рассмотрим в произвольном бесконечномерном евклидовом пространстве R некоторую последовательность элементов.

$$\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n, \dots \quad (8.9)$$

Определение 2. Последовательность (8.9) называется ортонормированной системой, если входящие в эту последовательность элементы попарно ортогональны и имеют норму, равную единице.

Классическим примером ортонормированной системы в пространстве R_0 всех кусочно непрерывных на сегменте $[-\pi, \pi]$ функций является так называемая тригонометрическая система

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\cos x}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin x}{\sqrt{\pi}}, \dots, \frac{\cos nx}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin nx}{\sqrt{\pi}}, \dots \quad (8.10)$$

Читатель легко проверит, что все функции (8.10) попарно ортогональны (в смысле скалярного произведения (8.1), взятого

при $a = -\pi$, $b = \pi$) и что норма каждой из этих функций (определяемая равенством (8.6) при $a = -\pi$, $b = \pi$) равна единице.

В математике и ее приложениях часто встречаются различные ортонормированные (на соответствующих множествах) системы функций. Приведем некоторые примеры таких систем.

Примеры. 1°. Многочлены, определяемые равенством

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \cdot \frac{d^n [(x^2 - 1)^n]}{dx^n} \quad (n = 0, 1, 2, \dots), \quad (8.11)$$

принято называть полиномами Лежандра.

Нетрудно убедиться, что образованные с помощью многочленов (8.11) функции

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2n+1}{2}} P_n(x) \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

образуют ортонормированную (на сегменте $[-1, +1]$) систему функций.

2°. Многочлены, определяемые равенствами $T_0(x) = 1$, $T_n(x) = 2^{1-n} \cos[n(\arccos x)]$ при $n = 1, 2, \dots$, называются полиномами Чебышева. Среди всех многочленов n -й степени с коэффициентом при x^n , равным единице, полином Чебышева $T_n(x)$ имеет наименьший на сегменте $-1 \leq x \leq 1$ максимум модуля. Можно доказать, что полученные с помощью полиномов Чебышева функции

$$\psi_0(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi^4 \sqrt{1-x^2}}}, \quad \psi_n(x) = \frac{2^{n-0.5} T_n(x)}{\sqrt{\pi^4 \sqrt{1-x^2}}} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

образуют ортонормированную на сегменте $[-1, +1]$ систему.

3°. В теории вероятностей часто применяется система Радемаха³⁾

$$\psi_n(x) = \varphi(2^n x) \quad (n = 0, 1, 2, \dots),$$

где $\varphi(t) = \operatorname{sgn}(\sin 2nt)$.

Легко проверяется, что эта система ортонормирована на сегменте $0 \leq x \leq 1$.

4°. В ряде исследований по теории функций находит применение система Хаара⁴⁾, являющаяся ортонормированной на сегменте $0 \leq x \leq 1$. Элементы этой системы определяются для всех $n = 0, 1, 2, \dots$ и для всех k , принимающих значения $1, 2, 4, \dots, 2^n$. Они имеют вид

³⁾ Радемахер — немецкий математик (род. в 1892 г.).

⁴⁾ Хаар — немецкий математик (1885—1933).

$$\chi_n^{(k)}(x) = \begin{cases} \sqrt{2^n} & \text{при } \frac{2k-2}{2^{n+1}} \leq x < \frac{2k-1}{2^{n+1}}, \\ -\sqrt{2^n} & \text{при } \frac{2k-1}{2^{n+1}} \leq x < \frac{2k}{2^{n+1}}, \\ 0 & \text{в остальных точках } [0, 1]. \end{cases}$$

Каждая функция Хаара представляет собой ступеньку такого же вида, как функция $\sqrt{2^n} \operatorname{sgn} x$ на сегменте $[-2^{-(n+1)}, 2^{-(n+1)}]$. Для каждого фиксированного номера n при увеличении значения k эта ступенька сдвигается вправо. Всюду вне соответствующей ступеньки каждая функция Хаара тождественно равна нулю.

2. Понятие об общем ряде Фурье. Пусть в произвольном бесконечномерном евклидовом пространстве R задана произвольная ортонормированная система элементов $\{\psi_k\}$. Рассмотрим какой угодно элемент f пространства R .

Определение 1. Назовем рядом Фурье элемента f по ортонормированной системе $\{\psi_k\}$ ряд вида

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_k \psi_k, \quad (8.12)$$

в котором через f_k обозначены постоянные числа, называемые коэффициентами Фурье элемента f и определяемые равенствами

$$f_k = (f, \psi_k) \quad k = 1, 2, \dots$$

Естественно назвать конечную сумму

$$S_n = \sum_{k=1}^n f_k \psi_k \quad (8.13)$$

n -й частичной суммой ряда Фурье (8.12).

Рассмотрим наряду с n -й частичной суммой (8.13) произвольную линейную комбинацию первых n элементов ортонормированной системы $\{\psi_k\}$

$$\sum_{k=1}^n C_k \psi_k \quad (8.14)$$

с какими угодно постоянными числами $C_1, C_2, \dots, C_n$.

Выясним, что отличает n -ю частичную сумму ряда Фурье (8.13) от всех других сумм (8.14).

Договоримся называть величину $\|f - g\|$ отклонением f от g (по норме данного евклидова пространства).

Имеет место следующая основная теорема.

Теорема 8.1. Среди всех сумм вида (8.14) наименьшее отклонение от элемента f по норме данного евклидова пространства имеет n -я частичная сумма (8.13) ряда Фурье элемента f .

Доказательство. Учитывая ортонормированность системы $\{\psi_k\}$ и пользуясь аксиомами скалярного произведения, можем записать:

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{k=1}^n C_k \psi_k - f \right\|^2 &= \left(\sum_{k=1}^n C_k \psi_k - f, \sum_{l=1}^n C_l \psi_l - f \right) = \\ &= \sum_{k=1}^n C_k^2 (\psi_k, \psi_k) - 2 \sum_{k=1}^n C_k (f, \psi_k) + (f, f) = \\ &= \sum_{k=1}^n C_k^2 - 2 \sum_{k=1}^n C_k f_k + \|f\|^2 = \sum_{k=1}^n (C_k - f_k)^2 - \sum_{k=1}^n f_k^2 + \|f\|^2. \end{aligned}$$

Итак,

$$\left\| \sum_{k=1}^n C_k \psi_k - f \right\|^2 = \sum_{k=1}^n (C_k - f_k)^2 + \|f\|^2 - \sum_{k=1}^n f_k^2. \quad (8.15)$$

В левой части (8.15) стоит квадрат отклонения суммы (8.14) от элемента f (по норме данного евклидова пространства). Из вида правой части (8.15), следует, что указанный квадрат отклонения является наименьшим при $C_k = f_k$ (так как при этом в правой части (8.15) первая сумма обращается в нуль, а остальные слагаемые от C_k не зависят). Теорема доказана.

Следствие 1. Для произвольного элемента f данного евклидова пространства и любой ортонормированной системы $\{\psi_k\}$ при произвольном выборе постоянных C_k для любого номера n справедливо неравенство

$$\|f\|^2 - \sum_{k=1}^n f_k^2 < \left\| \sum_{k=1}^n C_k \psi_k - f \right\|^2. \quad (8.16)$$

Неравенство (8.16) является непосредственным следствием тождества (8.15).

Следствие 2. Для произвольного элемента f данного евклидова пространства, любой ортонормированной системы $\{\psi_k\}$ и любого номера n справедливо равенство

$$\left\| \sum_{k=1}^n f_k \psi_k - f \right\|^2 = \|f\|^2 - \sum_{k=1}^n f_k^2, \quad (8.17)$$

часто называемое тождеством Бесселя⁵⁾.

⁵⁾ Фридрих Вильгельм Бессель — немецкий астроном и математик (1784—1846).

Для доказательства равенства (8.17) достаточно положить в (8.15) $C_k = f_k$.

Теорема 8.2. Для любого элемента f данного евклидова пространства и любой ортонормированной системы $\{\psi_k\}$ справедливо следующее неравенство:

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_k^2 \leq \|f\|^2, \quad (8.18)$$

называемое *неравенством Бесселя*.

Доказательство. Из неотрицательности левой части (8.17) следует, что для любого номера n

$$\sum_{k=1}^n f_k^2 \leq \|f\|^2. \quad (8.19)$$

Но это означает, что ряд из неотрицательных членов, стоящий в левой части (8.18), обладает ограниченной последовательностью частичных сумм и поэтому сходится. Переходя в неравенстве (8.19) к пределу при $n \rightarrow \infty$ (см. теорему 3.13 ч. 1), получим неравенство (8.18). Теорема доказана.

В качестве примера обратимся к пространству R_0 всех кусочно непрерывных на сегменте $-\pi \leq x \leq \pi$ функций и в этом пространстве к ряду Фурье по тригонометрической системе (8.10) (этот ряд принято называть *тригонометрическим рядом Фурье*). Для любой кусочно непрерывной на сегменте $[-\pi, \pi]$ функции $f(x)$ указанный ряд Фурье имеет вид

$$\bar{f}_0 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\bar{f}_k \frac{\cos kx}{\sqrt{\pi}} + \bar{\bar{f}}_k \frac{\sin kx}{\sqrt{\pi}} \right), \quad (8.20)$$

где коэффициенты Фурье $\bar{f}_k$ и $\bar{\bar{f}}_k$ определяются формулами

$$\bar{f}_0 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx;$$

$$\bar{f}_k = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx dx; \quad \bar{\bar{f}}_k = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx dx \quad (k=1, 2, \dots).$$

Неравенство Бесселя, справедливое для любой кусочно непрерывной на сегменте $[-\pi, \pi]$ функции $f(x)$, имеет вид

$$\bar{f}_0^2 + \sum_{k=1}^{\infty} (\bar{f}_k^2 + \bar{\bar{f}}_k^2) \leq \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx. \quad (8.21)$$

Отклонение $f(x)$ от $g(x)$ по норме в этом случае равно так называемому среднему квадратичному отклонению

$$\|f - g\| = \sqrt{\int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - g(x)]^2 dx}. \quad (8.22)$$

Отметим, что в теории тригонометрических рядов Фурье принята несколько иная форма записи как самого ряда Фурье (8.20), так и неравенства Бесселя (8.21), а именно: тригонометрический ряд Фурье (8.20) обычно записывают в виде

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx), \quad (8.20')$$

где

$$\begin{cases} a_0 = \frac{2\bar{f}_0}{\sqrt{2\pi}} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx; \\ a_k = \frac{\bar{f}_k}{\sqrt{\pi}} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx dx; \\ b_k = \frac{\bar{f}_k}{\sqrt{\pi}} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx dx \\ (k=1, 2, \dots). \end{cases} \quad (8.23)$$

При такой форме записи неравенство Бесселя (8.21) принимает вид

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx. \quad (8.21')$$

Замечание. Из неравенства Бесселя (8.21') вытекает, что для любой кусочно непрерывной на сегменте $[-\pi, \pi]$ функции $f(x)$ величины a_k и b_k (называемые тригонометрическими коэффициентами Фурье функции $f(x)$) стремятся к нулю при $n \rightarrow \infty$ (в силу необходимого условия сходимости ряда в левой части (8.21')).

§ 2. ЗАМКНУТЫЕ И ПОЛНЫЕ ОРТОНОРМИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ

Как и в предыдущем параграфе, будем рассматривать произвольную ортонормированную систему $\{\psi_k\}$ в каком угодно бесконечномерном евклидовом пространстве R .

Определение 1. Ортонормированная система $\{\psi_k\}$ называется замкнутой, если для любого элемента f данного евклидова пространства R и для любого положительного числа ε найдется такая линейная комбинация (8.14) конечного числа элементов $\{\psi_k\}$, отклонение которой от f (по норме пространства R) меньше ε .

Иными словами, система $\{\psi_k\}$ называется замкнутой, если любой элемент f данного евклидова пространства R можно приблизить по норме этого пространства с любой степенью точности линейными комбинациями конечного числа элементов $\{\psi_k\}$.

Замечание 1. Мы опускаем вопрос о том, во всяком ли евклидовом пространстве существуют замкнутые ортонормированные системы. Отметим, что в части 3 будет изучен важный подкласс евклидовых пространств — так называемые гильбертовы пространства — и будет установлено существование в каждом таком пространстве замкнутых ортонормированных систем.

Теорема 8.3. Если ортонормированная система $\{\psi_k\}$ является замкнутой, то для любого элемента f рассматриваемого евклидова пространства неравенство Бесселя (8.18) переходит в точное равенство

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_k^2 = \|f\|^2, \quad (8.24)$$

называемое равенством Парсеваля⁶⁾.

Доказательство. Фиксируем произвольный элемент f рассматриваемого евклидова пространства и произвольное положительное число ε . Так как система $\{\psi_k\}$ является замкнутой, то найдется такой номер n и такие числа $C_1, C_2, \dots, C_n$, что квадрат нормы, стоящий в правой части (8.16), будет меньше ε . В силу (8.16) это означает, что для произвольного $\varepsilon > 0$ найдется номер n , для которого

$$\|f\|^2 - \sum_{k=1}^n f_k^2 < \varepsilon. \quad (8.25)$$

Для всех номеров, превосходящих указанный номер n , неравенство (8.25) будет тем более справедливо, так как при возрастании n сумма, стоящая в левой части (8.25), может только возрасти.

Итак, мы доказали, что для произвольного $\varepsilon > 0$ найдется номер n , начиная с которого справедливо неравенство (8.25).

В соединении с неравенством (8.19) это означает, что ряд

$\sum_{k=1}^{\infty} f_k^2$ сходится к сумме $\|f\|^2$. Теорема доказана.

⁶⁾ М. А. Парсеваль — французский математик (1755—1836).

Теорема 8.4. *Если ортонормированная система $\{\psi_k\}$ является замкнутой, то, каков бы ни был элемент f , ряд Фурье этого элемента сходится к нему по норме рассматриваемого евклидова пространства, т. е.*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \sum_{k=1}^n f_k \psi_k - f \right\| = 0. \quad (8.26)$$

Доказательство. Утверждение этой теоремы непосредственно вытекает из равенства (8.17) и из предыдущей теоремы.

Замечание 2. В пространстве всех кусочно непрерывных на сегменте $[-\pi, \pi]$ функций сходимость по норме (8.26) переходит в сходимость на этом сегменте в среднем (см. п. 3 § 4 гл. 2). Таким образом, если будет доказана замкнутость тригонометрической системы (8.10), то теорема 8.4 будет утверждать, что для любой кусочно непрерывной на сегменте $[-\pi, \pi]$ функции $f(x)$ тригонометрический ряд Фурье этой функции сходится к ней на указанном сегменте в среднем.

Определение 2. *Ортонормированная система $\{\psi_k\}$ называется полной, если, кроме нулевого элемента, не существует никакого другого элемента f данного евклидова пространства, который был бы ортогонален ко всем элементам ψ_k системы $\{\psi_k\}$.*

Иными словами, система $\{\psi_k\}$ называется полной, если всякий элемент f , ортогональный ко всем элементам ψ_k системы $\{\psi_k\}$, является нулевым элементом.

Теорема 8.5. *Всякая замкнутая ортонормированная система $\{\psi_k\}$ является полной.*

Доказательство. Пусть система $\{\psi_k\}$ является замкнутой, и пусть f — любой элемент данного евклидова пространства, ортогональный ко всем элементам ψ_k системы $\{\psi_k\}$. Тогда все коэффициенты Фурье f_k элемента f по системе $\{\psi_k\}$ равны нулю, и, стало быть, в силу равенства Парсеваля (8.24) и $\|f\| = 0$. Последнее равенство (в силу свойства 1° нормы) означает, что f — нулевой элемент. Теорема доказана.

Замечание 3. Мы доказали, что в произвольном евклидовом пространстве из замкнутости ортонормированной системы вытекает ее полнота. Отметим без доказательства, что в произвольном евклидовом пространстве из полноты ортонормированной системы, вообще говоря, не вытекает замкнутость этой системы. В ч. 3 будет доказано, что для гильбертовых пространств полнота ортонормированной системы эквивалентна ее замкнутости.

Теорема 8.6. *Для всякой полной (и тем более для всякой замкнутой) ортонормированной системы $\{\psi_k\}$ два различных элемента f и g рассматриваемого евклидова пространства не могут иметь одинаковые ряды Фурье.*

Доказательство. Если бы все коэффициенты Фурье элементов f и g совпадали, то все коэффициенты Фурье разности $(f-g)$ были бы равны нулю, т. е. разность $(f-g)$ была бы ортогональна ко всем элементам ψ_k полной системы $\{\psi_k\}$. Но это означало бы, что разность $(f-g)$ является нулевым элементом, т. е. означало бы совпадение элементов f и g . Теорема доказана.

На этом мы заканчиваем рассмотрение общего ряда Фурье по произвольной ортонормированной системе в любом евклидовом пространстве R .

Наша очередная цель — детальное изучение ряда Фурье по тригонометрической системе (8.10).

§ 3. ЗАМКНУТОСТЬ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И СЛЕДСТВИЯ ИЗ НЕЕ

1. Равномерное приближение непрерывной функции тригонометрическими многочленами. В этом параграфе будет установлена замкнутость (а следовательно, и полнота) тригонометрической системы (8.10) в пространстве всех кусочно непрерывных на сегменте $[-\pi, \pi]$ функций. Но прежде чем приступить к доказательству замкнутости тригонометрической системы, установим важную теорему о равномерном приближении непрерывной функции так называемыми тригонометрическими многочленами.

Будем называть тригонометрическим многочленом произвольную линейную комбинацию любого конечного числа элементов тригонометрической системы (8.10), т. е. выражение вида

$$T(x) = \bar{C}_0 + \sum_{k=1}^n (\bar{C}_k \cos kx + \bar{C}_k \sin kx),$$

где n — любой номер, а $\bar{C}_0$, $\bar{C}_k$ и $\bar{C}_k$ ($k=1, 2, \dots, n$) — произвольные постоянные вещественные числа.

Отметим два совершенно элементарных утверждения:

1°. Если $P(x)$ — какой угодно алгебраический многочлен произвольной степени n , то $P(\cos x)$ и $P(\sin x)$ — тригонометрические многочлены.

2°. Если $T(x)$ — тригонометрический многочлен, то каждое из выражений $[T(x) \sin x]$ и $[T(x) \sin^2 x]$ также представляет собой тригонометрический многочлен.

Оба утверждения вытекают из того, что произведение двух (а поэтому и любого конечного числа) тригонометрических функций⁷⁾ от аргумента x приводится к линейной комбинации конечного числа тригонометрических функций от аргументов типа kx (убедитесь в этом сами).

⁷⁾ Под тригонометрическими функциями в данном случае понимаются косинус или синус.

В теории тригонометрических рядов Фурье важную роль играет понятие периодической функции.

Определение. Функция $f(x)$ называется периодической функцией с периодом T , если: 1) $f(x)$ определена для всех вещественных x ; 2) для любого вещественного x справедливо равенство

$$f(x+T)=f(x).$$

Это равенство обычно называют условием периодичности. К рассмотрению периодических функций приводит изучение различных колебательных процессов.

Заметим, что все элементы тригонометрической системы (8.10) являются периодическими функциями с периодом 2π .

Теорема 8.7 (теорема Вейерштрасса). Если функция $f(x)$ непрерывна на сегменте $[-\pi, \pi]$ и удовлетворяет условию $f(-\pi)=f(\pi)$, то эту функцию можно равномерно на указанном сегменте приблизить тригонометрическими многочленами, т. е. для этой функции $f(x)$ и для любого положительного числа ε найдется тригонометрический многочлен $T(x)$ такой, что сразу для всех x из сегмента $[-\pi, \pi]$ справедливо неравенство

$$|f(x)-T(x)|<\varepsilon. \quad (8.27)$$

Доказательство. Для удобства разобьем доказательство на два этапа.

1) Сначала дополнительно предположим, что функция $f(x)$ является четной, т. е. для любого x из сегмента $[-\pi, \pi]$ удовлетворяет условию $f(-x)=f(x)$.

В силу теоремы о непрерывности сложной функции $y=f(x)$, где $x=\arccos t$ (см. § 1 гл. 4 ч. 1) функция $F(t)=f(\arccos t)$ является непрерывной функцией аргумента t на сегменте $-1 \leq t \leq +1$. Следовательно, по теореме Вейерштрасса для алгебраических многочленов (см. теорему 2.18) для любого $\varepsilon > 0$ найдется алгебраический многочлен $P(t)$ такой, что $|f(\arccos t)-P(t)| < \varepsilon$ сразу для всех t из сегмента $-1 \leq t \leq 1$.

Положив $t=\cos x$, мы получим

$$|f(x)-P(\cos x)| < \varepsilon \quad (8.28)$$

сразу для всех x из сегмента $0 \leq x \leq \pi$.

Так как обе функции $f(x)$ и $P(\cos x)$ являются четными, то неравенство (8.28) справедливо и для всех x из сегмента $-\pi \leq x \leq 0$. Таким образом, неравенство (8.28) справедливо для всех x из сегмента $-\pi \leq x \leq \pi$, и поскольку (в силу указанного выше утверждения 1°) $P(\cos x)$ является тригонометрическим многочленом, то для четной функции $f(x)$ теорема доказана.

Заметим теперь, что функцию $f(x)$, удовлетворяющую условиям доказываемой теоремы, можно периодически с периодом 2π продолжить на всю бесконечную прямую $-\infty < x < +\infty$, так что

продолженная функция будет непрерывна в каждой точке x бесконечной прямой. Кроме того, если функция $f(x)$ продолжена таким образом, то (поскольку $P(\cos x)$ также является периодической функцией периода 2π) для четной функции $f(x)$ неравенство (8.28) справедливо всюду на прямой $-\infty < x < +\infty$.

2) Пусть теперь $f(x)$ — произвольная функция, удовлетворяющая условиям доказываемой теоремы. Эту функцию мы периодически с периодом 2π продолжим на всю прямую и составим с помощью этой функции следующие четные функции:

$$f_1(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}; \quad (8.29)$$

$$f_2(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2} \sin x. \quad (8.30)$$

По доказанному в 1) для любого $\varepsilon > 0$ найдутся тригонометрические многочлены $T_1(x)$ и $T_2(x)$ такие, что всюду на числовой прямой

$$|f_1(x) - T_1(x)| < \varepsilon/4; \quad |f_2(x) - T_2(x)| < \varepsilon/4,$$

и поэтому

$$|f_1(x) \sin^2 x - T_1(x) \sin^2(x)| < \varepsilon/4;$$

$$|f_2(x) \sin x - T_2(x) \sin x| < \varepsilon/4.$$

Складывая эти неравенства и учитывая, что модуль суммы двух величин не превосходит сумму их модулей, а также принимая во внимание равенства (8.29) и (8.30), получим, что всюду на числовой прямой справедливо неравенство

$$|f(x) \sin^2 x - T_3(x)| < \varepsilon/2, \quad (8.31)$$

в котором через $T_3(x)$ обозначен тригонометрический многочлен, равный $T_3(x) = T_1(x) \sin^2 x + T_2(x) \sin x$.

В проведенных нами рассуждениях вместо функции $f(x)$ можно взять функцию $f(x + \pi/2)$ ⁸⁾. В полной аналогии с (8.31) получим, что для функции $f(x + \pi/2)$ найдется тригонометрический многочлен $T_4(x)$ такой, что всюду на числовой прямой

$$|f(x + \pi/2) \sin^2 x - T_4(x)| < \varepsilon/2. \quad (8.32)$$

Заменяя в (8.32) x на $x - \pi/2$ и обозначая через $T_5(x)$ тригонометрический многочлен вида $T_5(x) = T_4(x - \pi/2)$, получим, что всюду на числовой прямой справедливо неравенство

$$|f(x) \cos^2 x - T_5(x)| < \varepsilon/2. \quad (8.33)$$

Наконец, складывая неравенства (8.31) и (8.33) и обозначая через $T(x)$ тригонометрический многочлен вида $T(x) = T_3(x) + T_5(x)$,

⁸⁾ Так как эта функция удовлетворяет тем же условиям, что и полученная после продолжения функция $f(x)$.

получим, что всюду на числовой прямой справедливо неравенство (8.27). Теорема доказана.

Замечание. Каждое из условий 1) непрерывности $f(x)$ на сегменте $[-\pi, \pi]$ и 2) равенства значений $f(-\pi)$ и $f(\pi)$ является *необходимым* условием для равномерного на сегменте $[-\pi, \pi]$ приближения функции $f(x)$ тригонометрическими многочленами.

Иными словами, теорему Вейерштрасса можно переформулировать следующим образом:

Теорема 8.7*. Для того чтобы функцию $f(x)$ можно было равномерно на сегменте $[-\pi, \pi]$ приблизить тригонометрическими многочленами, необходимо и достаточно, чтобы функция $f(x)$ была непрерывной на сегменте $[-\pi, \pi]$ и удовлетворяла условию $f(-\pi) = f(\pi)$.

Достаточность составляет содержание теоремы 8.7.

Остановимся на доказательстве необходимости. Пусть существует последовательность тригонометрических многочленов $\{T_n(x)\}$, равномерно на сегменте $[-\pi, \pi]$ сходящаяся к функции $f(x)$. Так как каждая функция $T_n(x)$ непрерывна на сегменте $[-\pi, \pi]$, то по следствию 2 из теоремы 2.7 и функция $f(x)$ непрерывна на сегменте $[-\pi, \pi]$. Для любого $\varepsilon > 0$ найдется многочлен $T_n(x)$ такой, что $|f(x) - T_n(x)| < \varepsilon/2$ для всех x из сегмента $[-\pi, \pi]$. Следовательно,

$$|f(-\pi) - T_n(-\pi)| < \varepsilon/2, \quad |f(\pi) - T_n(\pi)| < \varepsilon/2.$$

Из последних двух неравенств и из вытекающего из условия периодичности (с периодом 2π) равенства $T_n(-\pi) = T_n(\pi)$ заключаем, что $|f(-\pi) - f(\pi)| < \varepsilon$, откуда $f(-\pi) = f(\pi)$ (в силу произвольности $\varepsilon > 0$).

2. Доказательство замкнутости тригонометрической системы. Опираясь на теорему Вейерштрасса, докажем следующую основную теорему.

Теорема 8.8. Тригонометрическая система (8.10) является замкнутой⁹⁾, т. е. для любой кусочно непрерывной на сегменте $[-\pi, \pi]$ функции $f(x)$ и любого положительного числа ε найдется тригонометрический многочлен $T(x)$ такой, что

$$\|f(x) - T(x)\| = \sqrt{\int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - T(x)]^2 dx} < \varepsilon. \quad (8.34)$$

Доказательство. Прежде всего заметим, что для любой кусочно непрерывной на сегменте $[-\pi, \pi]$ функции $f(x)$ и для любого $\varepsilon > 0$ найдется непрерывная на этом сегменте функция

⁹⁾ А следовательно (в силу теоремы 8.5), и полной.

$F(x)$, удовлетворяющая условию $F(-\pi) = F(\pi)$ и такая, что

$$\|f(x) - F(x)\| = \sqrt{\int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - F(x)]^2 dx} < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (8.35)$$

В самом деле, достаточно взять функцию $F(x)$ совпадающей с $f(x)$ всюду, кроме достаточно малых окрестностей точек разрыва функции $f(x)$ и точки $x = \pi$, а в указанных окрестностях взять $F(x)$ линейной функцией так, чтобы $F(x)$ являлась непрерывной на всем сегменте $[-\pi, \pi]$ и удовлетворяла условию $F(-\pi) = F(\pi)$.

Так как кусочно непрерывная функция и срезающая ее линейная функция являются ограниченными, то, выбирая указанные окрестности точек разрыва $f(x)$ и точки $x = \pi$ достаточно малы, мы обеспечим выполнение неравенства (8.35).

По теореме Вейерштрасса 8.7 для функции $F(x)$ найдется тригонометрический многочлен $T(x)$ такой, что для всех x из сегмента $[-\pi, \pi]$ справедливо неравенство

$$|F(x) - T(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2\sqrt{2\pi}}. \quad (8.36)$$

Из (8.36) заключаем, что

$$\|F(x) - T(x)\| = \sqrt{\int_{-\pi}^{\pi} [F(x) - T(x)]^2 dx} \leq \frac{\varepsilon}{2}. \quad (8.37)$$

Из (8.35) и (8.37) и из неравенства треугольника для норм вытекает неравенство (8.34). Теорема доказана.

З а м е ч а н и е 1. Из теорем 8.8 и 8.5 сразу же вытекает, что *тригонометрическая система (8.10) является полной*. Отсюда в

свою очередь вытекает, что *система $\left\{ \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin nx \right\}$ ($n = 1, 2, \dots$)*

является полной на множестве всех функций, кусочно непрерывных на сегменте $[0, \pi]$ (или соответственно на сегменте $[-\pi, 0]$).

В самом деле, всякая кусочно непрерывная на сегменте $[0, \pi]$ функция $f(x)$, ортогональная на этом сегменте всем элементам

системы $\left\{ \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin nx \right\}$, после нечетного продолжения на сегмент

$[-\pi, 0]$ оказывается ортогональной на сегменте $[-\pi, \pi]$ всем

элементам тригонометрической системы (8.10). В силу полноты системы (8.10) эта функция равна нулю на $[-\pi, \pi]$, а следовательно, и на $[0, \pi]$. Совершенно аналогично доказывается, что

система $\frac{1}{\sqrt{\pi}}, \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cos nx$ ($n = 1, 2, \dots$) является полной на мно-

жестве всех функций, кусочно непрерывных на сегменте $[0, \pi]$ (или соответственно на сегменте $[-\pi, 0]$).

З а м е ч а н и е 2. Можно показать, что среди ортонормированных систем, указанных в § 1, системы, образованные с помощью полиномов Лежандра, полиномов Чебышева и функций Хаара, являются замкнутыми, а система Радемахера замкнутой не является.

3. Следствия замкнутости тригонометрической системы.

Следствие 1. Для любой кусочно непрерывной на сегменте $[-\pi, +\pi]$ функции $f(x)$ справедливо равенство Парсеваля

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx \quad (8.38)$$

(вытекает из теоремы 8.3).

Следствие 2. Тригонометрический ряд Фурье любой кусочно непрерывной на сегменте $[-\pi, \pi]$ функции $f(x)$ сходится к этой функции на указанном сегменте в среднем (вытекает из теоремы 8.4 и замечания 2 к ней).

Следствие 3. Тригонометрический ряд Фурье любой кусочно непрерывной на сегменте $[-\pi, \pi]$ функции $f(x)$ можно почленно интегрировать на этом сегменте (вытекает из предыдущего следствия и из теоремы 2.11).

Следствие 4. Если две кусочно непрерывные на сегменте $[-\pi, \pi]$ функции $f(x)$ и $g(x)$ имеют одинаковые тригонометрические ряды Фурье, то эти функции совпадают всюду на этом сегменте (вытекает из теоремы 8.6).

Следствие 5. Если тригонометрический ряд Фурье кусочно непрерывной на сегменте $[-\pi, \pi]$ функции $f(x)$ сходится равномерно на некотором содержащемся в $[-\pi, \pi]$ сегменте $[a, b]$, то он сходится на сегменте $[a, b]$ именно к функции $f(x)$.

Доказательство. Пусть $g(x)$ — та функция, к которой сходится равномерно на $[a, b]$ тригонометрический ряд Фурье функции $f(x)$. Докажем, что $g(x) \equiv f(x)$ всюду на сегменте $[a, b]$. Так как из равномерной сходимости на сегменте $[a, b]$ вытекает сходимость в среднем на этом сегменте (см. п. 3 § 4 гл. 2), то тригонометрический ряд Фурье функции $f(x)$ сходится к функции $g(x)$ на сегменте $[a, b]$ в среднем. Это означает, что для произвольного $\varepsilon > 0$ найдется номер n_1 , начиная с которого n -я частичная сумма тригонометрического ряда Фурье $S_n(x)$ удовлетворяет неравенству

$$\|g(x) - S_n(x)\| = \sqrt{\int_a^b [g(x) - S_n(x)]^2 dx} < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (8.39)$$

С другой стороны, в силу следствия 2 последовательность $S_n(x)$ сходится к $f(x)$ в среднем на всем сегменте $[-\pi, \pi]$, а следова-

тельно, и на сегменте $[a, b]$, т. е. для фиксированного нами произвольного $\varepsilon > 0$ найдется номер n_2 , начиная с которого

$$\|S_n(x) - f(x)\| = \sqrt{\int_a^b [S_n(x) - f(x)]^2 dx} < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (8.40)$$

Из (8.39) и (8.40) и из неравенства треугольника

$$\|g(x) - f(x)\| \leq \|g(x) - S_n(x)\| + \|S_n(x) - f(x)\|$$

вытекает, что $\|g(x) - f(x)\| < \varepsilon$. Из этого неравенства и из произвольности $\varepsilon > 0$ следует, что $\|g(x) - f(x)\| = 0$, а отсюда на основании первого свойства нормы заключаем, что $g(x) - f(x)$ — нулевой элемент пространства кусочно непрерывных на $[a, b]$ функций, т. е. функция, тождественно равная нулю на сегменте $[a, b]$. Следствие 5 доказано.

З а м е ч а н и е 1. Конечно, в следствии 5 сегмент $[a, b]$ может совпадать со всем сегментом $[-\pi, \pi]$, т. е. из равномерной сходимости ряда Фурье функции $f(x)$ на всем сегменте $[-\pi, \pi]$ следует, что этот ряд сходится на указанном сегменте именно к функции $f(x)$.

З а м е ч а н и е 2. Совершенно аналогичные следствия будут справедливы и для ряда Фурье по любой другой замкнутой ортонормированной системе в пространстве кусочно непрерывных на произвольном сегменте $[a, b]$ функций со скалярным произведением (8.1) и нормой (8.6). Примерами таких систем могут служить указанные в § 1 ортонормированные системы, связанные с полиномами Лежандра и Чебышева, а также система Хаара.

§ 4. ПРОСТЕЙШИЕ УСЛОВИЯ РАВНОМЕРНОЙ СХОДИМОСТИ И ПОЧЛЕННОГО ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКОГО РЯДА ФУРЬЕ

1. Вводные замечания. В математической физике и в ряде других разделов математики существенную роль играет вопрос об условиях, при выполнении которых тригонометрический ряд Фурье функции $f(x)$ сходится (к этой функции) в данной точке x сегмента $[-\pi, \pi]$.

Еще в конце прошлого века было известно, что существуют непрерывные на сегменте $[-\pi, \pi]$ функции, удовлетворяющие условию $f(-\pi) = f(\pi)$, тригонометрические ряды Фурье которых расходятся в наперед заданной точке сегмента $[-\pi, \pi]$ (или даже расходятся на бесконечном множестве точек сегмента $[-\pi, \pi]$, всюду плотном на этом сегменте)¹⁰.

¹⁰ Первый пример такой функции был построен французским математиком Дю Буа Раймоном в 1876 г.

Таким образом, одна непрерывность функции $f(x)$ на сегменте $[-\pi, \pi]$ без дополнительных условий не обеспечивает не только равномерную сходимость тригонометрического ряда Фурье этой функции, но даже сходимость этого ряда в наперед заданной точке указанного сегмента.

В этом и в следующем параграфах мы выясним, какие требования следует добавить к непрерывности функции $f(x)$ (или ввести взамен непрерывности $f(x)$) для обеспечения сходимости тригонометрического ряда Фурье этой функции в заданной точке, а также для обеспечения равномерной сходимости этого ряда на всем сегменте $[-\pi, \pi]$ или на какой-либо его части.

При изучении сходимости тригонометрического ряда Фурье возникает и другой вопрос: должен ли тригонометрический ряд Фурье любой кусочно непрерывной (или даже строго непрерывной) на сегменте $[-\pi, \pi]$ функции $f(x)$ сходиться хотя бы в одной точке этого сегмента?

Положительный ответ на этот вопрос был получен только в 1966 г.

Этот ответ является следствием фундаментальной теоремы, доказанной в 1966 г. Л. Карлесоном¹¹⁾ и решившей знаменитую проблему Н. Н. Лузина¹²⁾, поставленную еще в 1914 г.: *тригонометрический ряд Фурье любой функции $f(x)$, для кото-*

рой существует понимаемый в смысле Лебега интеграл $\int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx$, сходится к этой функции почти всюду на сегменте $[-\pi, \pi]$ ¹³⁾.

Из теоремы Карлесона вытекает, что ряд Фурье не только любой кусочно непрерывной, но и любой интегрируемой на сегменте $[-\pi, \pi]$ в собственном смысле Римана функции $f(x)$ сходится к этой функции почти всюду на сегменте $[-\pi, \pi]$

(так как для такой функции существует интеграл $\int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx$ в смысле Римана, а следовательно, и в смысле Лебега).

Заметим, что если функция $f(x)$ интегрируема на сегменте $[-\pi, \pi]$ не в смысле Римана, а только в смысле Лебега, то тригонометрический ряд Фурье этой функции может не схо-

¹¹⁾ Л. Карлесон — современный шведский математик. Полное доказательство теоремы Карлесона можно найти в сборнике переводных статей серии «Математика» (т. 11, № 4, 1967, с. 113—132).

¹²⁾ Николай Николаевич Лузин — советский математик, основатель современной московской математической школы по теории функций (1883—1950). Постановку проблемы Лузина, решенной Карлесоном, и других его проблем можно найти в книге Н. Н. Лузина «Интеграл и тригонометрический ряд» (М.; Л.: Гостехиздат, 1951).

¹³⁾ Определение интеграла в смысле Лебега и сходимости почти всюду на данном сегменте будет дано в ч. 3.

даться ни в одной точке сегмента $[-\pi, \pi]$. Первый пример интегрируемой на сегменте $[-\pi, \pi]$ в смысле Лебега функции $f(x)$ со всюду расходящимся тригонометрическим рядом Фурье был построен в 1923 г. советским математиком А. Н. Колмогоровым¹⁴⁾.

2. Простейшие условия абсолютной и равномерной сходимости тригонометрического ряда Фурье.

Определение 1. Будем говорить, что функция $f(x)$ имеет на сегменте $[a, b]$ кусочно непрерывную производную, если производная $f'(x)$ существует и непрерывна всюду на сегменте $[a, b]$, за исключением, быть может, конечного числа точек, в каждой из которых функция $f(x)$ имеет конечные правое и левое предельные значения¹⁵⁾.

Определение 2. Будем говорить, что функция $f(x)$ имеет на сегменте $[a, b]$ кусочно непрерывную производную порядка $n \geq 1$, если функция $f^{(n-1)}(x)$ имеет на этом сегменте кусочно непрерывную производную в смысле определения 1.

Теорема 8.9. Если функция $f(x)$ непрерывна на сегменте $[-\pi, \pi]$, имеет на этом сегменте кусочно непрерывную производную и удовлетворяет условию $f(-\pi) = f(\pi)$, то тригонометрический ряд Фурье функции $f(x)$ сходится к этой функции равномерно на сегменте $[-\pi, \pi]$. Более того, ряд, составленный из модулей членов тригонометрического ряда Фурье функции $f(x)$, сходится равномерно на сегменте $[-\pi, \pi]$.

Доказательство. Достаточно доказать, что ряд, составленный из модулей членов тригонометрического ряда Фурье функции $f(x)$:

$$\frac{|a_0|}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \{|a_k \cos kx| + |b_k \sin kx|\}, \quad (8.41)$$

сходится равномерно на сегменте $[-\pi, \pi]$, так как отсюда будет вытекать как равномерная на сегменте $[-\pi, \pi]$ сходимость самого тригонометрического ряда Фурье функции $f(x)$, так и сходимость этого ряда (в силу следствия 5 из п. 3 § 3) именно к функции $f(x)$.

В силу признака Вейерштрасса (см. теорему 2.3) для доказательства равномерной на сегменте $[-\pi, \pi]$ сходимости ряда (8.41) достаточно доказать сходимость мажорирующего его числового ряда

¹⁴⁾ Построение примера А. Н. Колмогорова можно найти на с. 412—421 книги Н. К. Бари «Тригонометрические ряды» (М.: Физматгиз, 1961).

¹⁵⁾ При этом функция $f'(x)$ может оказаться не определенной в конечном числе точек сегмента $[a, b]$. В этих точках мы доопределим ее произвольным образом (например, положим равной полусумме правого и левого предельных значений).

$$\sum_{k=1}^{\infty} \{|a_k| + |b_k|\}. \quad (8.42)$$

Обозначим через α_k и β_k тригонометрические коэффициенты Фурье функции $f'(x)$, доопределив эту функцию произвольным образом в конечном числе точек, в которых не существует производная функции $f(x)$ ¹⁶⁾.

Производя интегрирование по частям и учитывая, что функция $f(x)$ непрерывна на всем сегменте $[-\pi, \pi]$ и удовлетворяет соотношениями $f(-\pi) = f(\pi)$, получим следующие соотношения:

$$\alpha_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \cos kx dx = k \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx dx = k\beta_k;$$

$$\beta_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \sin kx dx = -k \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx dx = -k\alpha_k,$$

которые связывают между собой тригонометрические коэффициенты Фурье функции $f'(x)$ и самой функции $f(x)$ ¹⁷⁾.

Таким образом,

$$|a_k| + |b_k| = \frac{|\alpha_k|}{k} + \frac{|\beta_k|}{k},$$

и для доказательства сходимости ряда (8.42) достаточно доказать сходимость ряда

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left\{ \frac{|\alpha_k|}{k} + \frac{|\beta_k|}{k} \right\}. \quad (8.43)$$

Сходимость ряда (8.43) вытекает из элементарных неравенств ¹⁸⁾

$$\begin{cases} \frac{|\alpha_k|}{k} \leq \frac{1}{2} \left(\alpha_k^2 + \frac{1}{k^2} \right); \\ \frac{|\beta_k|}{k} \leq \frac{1}{2} \left(\beta_k^2 + \frac{1}{k^2} \right) \end{cases} \quad (8.44)$$

¹⁶⁾ Например, можно положить функцию $f'(x)$ в указанных точках равной полусумме правого и левого предельных значений.

¹⁷⁾ При интегрировании по частям следует разбить сегмент $[-\pi, \pi]$ на конечное число не имеющих общих внутренних точек частичных сегментов, на каждом из которых производная $f'(x)$ непрерывна, и, беря формулу интегрирования по частям для каждого из этих частичных сегментов, учесть, что при суммировании интегралов по всем частичным сегментам все подстановки обратятся в нуль (вследствие непрерывности $f(x)$ на всем сегменте $[-\pi, \pi]$ и условий $f(-\pi) = f(\pi)$).

¹⁸⁾ Мы исходим из элементарного неравенства $|a| \cdot |b| \leq (a^2 + b^2)/2$, вытекающего из неотрицательности величины $(|a| - |b|)^2$.

и из сходимости рядов

$$\sum_{k=1}^{\infty} (\alpha_k^2 + \beta_k^2), \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}, \quad (8.45)$$

первый из которых сходится в силу равенства Парсеваля для кусочно непрерывной функции $f'(x)$, а второй — в силу интегрального признака Коши—Маклорена (см. п. 4 § 2 гл. 1). Теорема доказана.

З а м е ч а н и е. Если функцию $f(x)$, удовлетворяющую условиям теоремы 8.9, периодически (с периодом 2π) продолжить на всю бесконечную прямую, то теорема 8.9 будет утверждать сходимость тригонометрического ряда Фурье к так продолженной функции, *равномерную на всей бесконечной прямой*.

3. Простейшие условия почленного дифференцирования тригонометрического ряда Фурье. Прежде всего докажем следующую лемму о порядке тригонометрических коэффициентов Фурье.

Л е м м а. Пусть функция $f(x)$ и все ее производные до некоторого порядка m (m — целое неотрицательное число) непрерывны на сегменте $[-\pi, \pi]$ и удовлетворяют условиям

$$\begin{cases} f(-\pi) = f(\pi); \\ f'(-\pi) = f'(\pi); \\ \dots \dots \dots \\ f^{(m)}(-\pi) = f^{(m)}(\pi). \end{cases} \quad (8.46)$$

Пусть, кроме того, функция $f(x)$ имеет на сегменте $[-\pi, \pi]$ кусочно непрерывную производную порядка $m+1$. Тогда сходится следующий ряд:

$$\sum_{k=1}^{\infty} k^m (|a_k| + |b_k|), \quad (8.47)$$

в котором a_k и b_k — тригонометрические коэффициенты Фурье функции $f(x)$.

Доказательство. Обозначим через a_k и b_k тригонометрические коэффициенты Фурье функции $f^{(m+1)}(x)$, доопределив эту функцию произвольным образом в конечном числе точек, в которых не существует производной порядка $m+1$ функции $f(x)$. Интегрируя выражения для a_k и b_k $m+1$ раз по частям и учитывая непрерывность на всем сегменте $[-\pi, \pi]$ самой функции $f(x)$ и всех ее производных до порядка m , а также используя соотношения (8.46), установим следующую связь между тригонометрическими коэффициентами Фурье функции $f^{(m+1)}(x)$ и самой функции $f(x)$ ¹⁹⁾:

¹⁹⁾ При интегрировании по частям сегмент $[-\pi, \pi]$ следует разбить на конечное число не имеющих общих внутренних точек частичных сегментов, на

$$|\alpha_k| + |\beta_k| = k^{n+1}(|a_k| + |b_k|).$$

Таким образом,

$$k^n(|a_k| + |b_k|) = \frac{|\alpha_k|}{k} + \frac{|\beta_k|}{k},$$

и сходимость ряда (8.47) вытекает из элементарных неравенств (8.44) и из сходимости рядов (8.45), первый из которых сходится в силу равенства Парсеваля для кусочно непрерывной функции $f^{(m+1)}(x)$, а второй — в силу признака Коши—Маклорена. Лемма доказана.

Непосредственным следствием леммы 1 является следующая

Теорема 8.10. Пусть функция $f(x)$ удовлетворяет тем же условиям, что и в лемме 1, причем $m \geq 1$. Тогда тригонометрический ряд Фурье функции $f(x)$ можно m раз почленно дифференцировать на сегменте $[-\pi, \pi]$.

Доказательство. Пусть s — любое из чисел $1, 2, \dots, m$. В результате s -кратного почленного дифференцирования тригонометрического ряда Фурье функции $f(x)$ получается ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} k^s \left\{ a_k \cos \left(kx - \frac{\pi s}{2} \right) + b_k \sin \left(kx - \frac{\pi s}{2} \right) \right\}. \quad (8.48)$$

Заметим, что для всех x из сегмента $[-\pi, \pi]$ как исходный тригонометрический ряд Фурье, так и ряд (8.48) (с любым $s=1, 2, \dots, m$) мажорируются сходящимся числовым рядом (8.47). По признаку Вейерштрасса (см. теорему 2.3) как исходный тригонометрический ряд Фурье, так и каждый из рядов (8.48) (при $s=1, 2, \dots, m$) сходятся равномерно на сегменте $[-\pi, \pi]$, а это (в силу теоремы 2.9) обеспечивает возможность m -кратного почленного дифференцирования исходного ряда Фурье. Теорема доказана.

§ 5. БОЛЕЕ ТОЧНЫЕ УСЛОВИЯ РАВНОМЕРНОЙ СХОДИМОСТИ И УСЛОВИЯ СХОДИМОСТИ В ДАННОЙ ТОЧКЕ

1. Модуль непрерывности функции. Классы Гёльдера. Введем понятия, характеризующие гладкость изучаемых функций, и определим классы функций, в терминах которых будут сформулированы условия сходимости тригонометрического ряда Фурье.

Пусть функция $f(x)$ определена и непрерывна на сегменте $[a, b]$.

каждом из которых $f^{(m+1)}(x)$ непрерывна, и учесть, что при суммировании интегралов по всем частичным сегментам все подстановки дают нуль.

Определение 1. Для каждого $\delta > 0$ назовем модулем непрерывности функции $f(x)$ на сегменте $[a, b]$ точную верхнюю грань модуля разности $|f(x') - f(x'')|$ на множестве всех x' и x'' , принадлежащих сегменту $[a, b]$ и удовлетворяющих условию $|x' - x''| < \delta$.

Будем обозначать модуль непрерывности функции $f(x)$ на сегменте $[a, b]$ символом $\omega(\delta, f)$. Итак, по определению

$$\omega(\delta, f) = \sup_{\substack{|x' - x''| < \delta \\ x', x'' \in [a, b]}} |f(x') - f(x'')|.$$

Непосредственно из теоремы Кантора (см. теорему 4.16 ч. 1) вытекает, что модуль непрерывности $\omega(\delta, f)$ любой непрерывной на сегменте $[a, b]$ функции $f(x)$ стремится к нулю при $\delta \rightarrow 0$ ²⁰⁾.

Однако для произвольной только непрерывной на сегменте $[-\pi, \pi]$ функции $f(x)$ нельзя, вообще говоря, ничего сказать о порядке ее модуля непрерывности $\omega(\delta, f)$ относительно малого δ . Рассмотрим дифференцируемые на сегменте функции.

Утверждение. Если функция $f(x)$ дифференцируема на сегменте $[a, b]$ и ее производная $f'(x)$ ограничена на этом сегменте, то модуль непрерывности функции $f(x)$ на указанном сегменте $\omega(\delta, f)$ имеет порядок $\omega(\delta, f) = O(\delta)$ ²¹⁾.

В самом деле, из теоремы Лагранжа²²⁾ вытекает, что для любых точек x' и x'' сегмента $[a, b]$ найдется точка ξ , заключенная между x' и x'' и такая, что

$$|f(x') - f(x'')| = |f'(\xi)| \cdot |x' - x''|. \quad (8.49)$$

Так как производная $f'(x)$ ограничена на сегменте $[a, b]$, то найдется постоянная $M > 0$ такая, что для всех x из этого сегмента $|f'(x)| \leq M$ и, следовательно, $|f'(\xi)| \leq M$. Из последнего неравенства и из (8.49) заключаем, что $|f(x') - f(x'')| \leq M\delta$ для всех x' и x'' из $[a, b]$, удовлетворяющих условию $|x' - x''| < \delta$. Но это и означает, что $\omega(\delta, f) \leq M\delta$, т. е. $\omega(\delta, f) = O(\delta)$.

Пусть α — любое вещественное число из полусегмента $0 < \alpha \leq 1$.

Определение 2. Будем говорить, что функция $f(x)$ принадлежит на сегменте $[a, b]$ классу Гёльдера C^α с показателем α ($0 < \alpha \leq 1$), если модуль непрерывности $\omega(\delta, f)$ функции $f(x)$ на сегменте $[a, b]$ имеет порядок $\omega(\delta, f) = O(\delta^\alpha)$.

Для обозначения того, что функция $f(x)$ принадлежит на сегменте $[a, b]$ классу Гёльдера C^α , обычно употребляют символика: $f(x) \in C^\alpha[a, b]$.

²⁰⁾ Ибо (в силу теоремы Кантора) для любого $\varepsilon > 0$ найдется $\delta > 0$ такое, что $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$ для всех x' и x'' из сегмента $[a, b]$, удовлетворяющих условию $|x' - x''| < \delta$.

²¹⁾ Напомним, что символ $\alpha = O(\delta)$ был введен в ч. 1 и обозначает существование постоянной M такой, что $|\alpha| \leq M\delta$.

²²⁾ См. теорему 6.5 ч. 1.

Сразу же отметим, что если на сегменте $[a, b]$ функция $f(x)$ дифференцируема и ее производная ограничена, то эта функция заведомо принадлежит на этом сегменте классу Гёльдера C^1 (это утверждение непосредственно вытекает из доказанного выше соотношения $\omega(\delta, f) = O(\delta)$)²³⁾.

З а м е ч а н и е. Пусть $f(x) \in C^\alpha[a, b]$. Точную верхнюю грань дроби $\frac{|f(x') - f(x'')|}{|x' - x''|^\alpha}$ на множестве всех x' и x'' , принадлежащих сегменту $[a, b]$ и не равных друг другу, называют константой Гёльдера (или коэффициентом Гёльдера) функции $f(x)$ (на сегменте $[a, b]$). Сумму константы Гёльдера функции $f(x)$ на сегменте $[a, b]$ и точной верхней грани $|f(x)|$ на этом сегменте называют гёльдеровской нормой функции $f(x)$ на сегменте $[a, b]$ и обозначают символом $\|f\|_{C^\alpha[a, b]}$.

П р и м е р. Функция $f(x) = \sqrt{x}$ принадлежит на сегменте $[0, 1]$ классу $C^{1/2}$, так как для любых x' и x'' из $[0, 1]$, связанных условием $x' > x''$, справедливо равенство

$$|f(x') - f(x'')| = \sqrt{x' - x''} \frac{\sqrt{x' - x''}}{\sqrt{x'} + \sqrt{x''}}$$

(при этом константа Гёльдера, являющаяся точной верхней гранью на $[0, 1]$ дроби $\frac{\sqrt{x' - x''}}{\sqrt{x'} + \sqrt{x''}}$, равна единице, а гёльдерова норма равна двум).

2. Выражение для частичной суммы тригонометрического ряда Фурье. Пусть $f(x)$ — произвольная функция, определенная и кусочно непрерывная на сегменте $[-\pi, \pi]$.

Мы будем называть периодически продолжением этой функции на всю прямую такую определенную на всей прямой функцию $f(x)$ ²⁴⁾, которая удовлетворяет трем требованиям:

- 1) совпадает с первоначально заданной функцией на интервале $-\pi < x < \pi$,
- 2) имеет на концах сегмента $[-\pi, \pi]$ значения

$$f(\pi) = f(-\pi) = \frac{1}{2} [f(-\pi + 0) + f(\pi - 0)],$$

- 3) удовлетворяет условию периодичности с периодом 2π , т. е. удовлетворяет для любого x соотношению $f(x + 2\pi) = f(x)$.

Л е м м а. Если функция $F(x)$ является периодически продолжением на всю числовую прямую функции $F(x)$, первоначально определенной и кусочно непрерывной на сегменте $[-\pi, \pi]$, то

²³⁾ Класс Гёльдера C^1 , отвечающий значению $\alpha = 1$, часто называют классом Липшица.

²⁴⁾ Оставляем для этой функции обозначение исходной функции $f(x)$.

все интегралы от этой функции по любому отрезку длины 2π равны друг другу, т. е. для любого x справедливо равенство

$$\int_{-\pi}^{\pi} F(t) dt = \int_{-\pi+x}^{\pi+x} F(t) dt. \quad (8.50)$$

Доказательство. В силу свойства аддитивности интеграла имеем

$$\int_{-\pi+x}^{\pi+x} F(t) dt = \int_{-\pi+x}^{-\pi} F(t) dt + \int_{-\pi}^{\pi} F(t) dt + \int_{\pi}^{\pi+x} F(t) dt. \quad (8.51)$$

Используя условие периодичности $F(y-2\pi) = F(y)$, с помощью замены $y = t + 2\pi$ получим

$$\int_{-\pi+x}^{-\pi} F(t) dt = \int_{\pi+x}^{\pi} F(y-2\pi) dy = \int_{\pi+x}^{\pi} F(y) dy = - \int_{\pi}^{\pi+x} F(y) dy. \quad (8.52)$$

Из (8.51) и (8.52) вытекает соотношение (8.50). Лемма доказана.

Пусть теперь функция $f(x)$ является периодическим продолжением на всю прямую функции $f(x)$, первоначально определенной и кусочно непрерывной на сегменте $[-\pi, \pi]$.

Вычислим для этой функции в любой точке x частичную сумму ее тригонометрического ряда Фурье $S_n(x, f)$, имеющую вид

$$S_n(x, f) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx).$$

Используя выражения для коэффициентов Фурье

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) dy, \quad a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) \cos ky dy, \quad b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) \sin ky dy$$

$$(k = 1, 2, \dots)$$

и свойство линейности интеграла, выражение для $S_n(x, f)$ можно переписать в следующем виде:

$$\begin{aligned} S_n(x, f) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) \left[\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n (\cos ky \cos kx + \sin ky \sin kx) \right] dy = \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) \left[\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos k(y-x) \right] dy. \end{aligned}$$

Сделаем в последнем интеграле замену переменной $y = t + x$:

$$S_n(x, f) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi-x}^{\pi-x} f(x+t) \left[\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kt \right] dt.$$

Наконец, используя лемму 1 и замечая, что подынтегральная функция в последнем интеграле является периодической функцией аргумента t с периодом 2π , получим

$$S_n(x, f) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) \left[\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kt \right] dt. \quad (8.53)$$

Вычислим сумму, стоящую в (8.53) в квадратных скобках. Для этого заметим, что для любого номера k и любого значения t справедливо равенство

$$2 \sin \frac{t}{2} \cos kt = \sin \left(k + \frac{1}{2} \right) t - \sin \left(k - \frac{1}{2} \right) t.$$

Просуммируем это равенство по всем номерам k , равным $1, 2, \dots, n$:

$$2 \sin \frac{t}{2} \sum_{k=1}^n \cos kt = \sin \left(n + \frac{1}{2} \right) t - \sin \frac{t}{2}.$$

Отсюда

$$2 \sin \frac{t}{2} \left[\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kt \right] = \sin \left(n + \frac{1}{2} \right) t$$

и, следовательно,

$$\left[\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kt \right] = \frac{\sin \left(n + \frac{1}{2} \right) t}{2 \sin \frac{t}{2}}. \quad (8.54)$$

Подставляя (8.54) в (8.53), окончательно получим следующее выражение для n -й частичной суммы тригонометрического ряда Фурье:

$$S_n(x, f) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) \frac{\sin \left(n + \frac{1}{2} \right) t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt, \quad (8.55)$$

справедливое в любой точке x числовой прямой.

З а м е ч а н и е. Из формулы (8.55) и из того, что все частичные суммы $S_n(x, 1)$ функции $f(x) \equiv 1$ равны единице²⁵⁾, вытекает следующее равенство:

$$1 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt. \quad (8.56)$$

3. Вспомогательные предложения.

Л е м м а. Пусть $f(x)$ кусочно непрерывна на сегменте $[-\pi, \pi]$ и периодически с периодом 2π продолжена на всю бесконечную прямую. Тогда для любого $\varepsilon > 0$ найдется $\delta(\varepsilon) > 0$ такое, что при всех u , удовлетворяющих условию $|u| \leq \delta$, справедливо неравенство

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f(u+t) - f(t)| dt < \varepsilon.$$

Доказательство. Фиксируем произвольное $\varepsilon > 0$. Согласно теореме 8.8 (о замкнутости тригонометрической системы) для функции $f(x)$ найдется тригонометрический многочлен $T(x)$ такой, что

$$\|f(x) - T(x)\| = \sqrt{\int_{-\pi}^{\pi} [f(t) - T(t)]^2 dt} < \frac{\varepsilon}{3\sqrt{2\pi}},$$

и потому на основании неравенства Коши—Буняковского²⁶⁾

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f(t) - T(t)| dt \leq \sqrt{\int_{-\pi}^{\pi} [f(t) - T(t)]^2 dt} \cdot \int_{-\pi}^{\pi} dt < \frac{\varepsilon}{3}. \quad (8.57)$$

Из неравенства (8.57), из леммы п. 2 и из того, что $f(t)$ и $T(t)$ являются периодическими функциями периода 2π , заключаем, что для любого числа u

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f(t+u) - T(t+u)| dt < \frac{\varepsilon}{3}. \quad (8.58)$$

Поскольку модуль суммы трех величин не превосходит сумму модулей этих величин, то для любого числа u справедливо неравенство

²⁵⁾ Так как величина (8.55) для функции $f(x) \equiv 1$ равна сумме $S_n(x, 1)$, в которой $a_0 = 2$, $a_k = b_k = 0$ при $k = 1, 2, \dots$

²⁶⁾ См. неравенство (8.7) при $a = -\pi$, $b = \pi$.

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f(t+u) - f(t)| dt \leq \int_{-\pi}^{\pi} |f(t+u) - T(t+u)| dt + \\ + \int_{-\pi}^{\pi} |T(t+u) - T(t)| dt + \int_{-\pi}^{\pi} |T(t) - f(t)| dt. \quad (8.59)$$

Теперь остается заметить, что в силу непрерывности тригонометрического многочлена и теоремы Кантора (см. теорему 4.16 ч. 1) для фиксированного нами $\varepsilon > 0$ найдется $\delta > 0$ такое, что при $|u| \leq \delta$ и при всех t из $[-\pi, \pi]$

$$|T(t+u) - T(t)| < \varepsilon / (6\pi),$$

и потому

$$\int_{-\pi}^{\pi} |T(t+u) - T(t)| dt < \varepsilon / 3. \quad (8.60)$$

Сопоставляя неравенство (8.59) с неравенствами (8.57), (8.58) и (8.60), получим

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f(t+u) - f(t)| dt < \varepsilon \quad (8.61)$$

для всех u , для которых $|u| \leq \delta$. Лемма доказана.

Извлечем теперь из этой леммы ряд важных для дальнейшего следствий.

Следствие 1. Если функция $f(t)$ кусочно непрерывна на сегменте $[-\pi, \pi]$ и периодически (с периодом 2π) продолжена на всю бесконечную прямую, а x — любая фиксированная точка сегмента $[-\pi, \pi]$, то для любого $\varepsilon > 0$ найдется $\delta > 0$ такое, что

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f(x+t+u) - f(x+t)| dt < \varepsilon \quad (8.62)$$

при $|u| \leq \delta$.

Доказательство. Сделаем в интеграле, стоящем в левой части (8.62), замену переменной $\tau = x + t$:

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f(x+t+u) - f(x+t)| dt = \int_{-\pi+x}^{\pi+x} |f(\tau+u) - f(\tau)| d\tau.$$

В силу равенства (8.50)

$$\int_{-\pi+x}^{\pi+x} |f(\tau+u) - f(\tau)| d\tau = \int_{-\pi}^{\pi} |f(\tau+u) - f(\tau)| d\tau.$$

Следовательно, неравенство (8.62) является следствием (8.61).

Следствие 2. Если каждая из функций $f(t)$ и $g(t)$ кусочно непрерывна на сегменте $[-\pi, \pi]$ и периодически (с периодом 2π) продолжена на всю прямую, то функция

$$I(x) = \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t)g(t)dt$$

является непрерывной функцией x на сегменте $[-\pi, \pi]$.

Доказательство. Пусть x — любая точка сегмента $[-\pi, \pi]$. Тогда

$$I(x+u) - I(x) = \int_{-\pi}^{\pi} [f(x+t+u) - f(x+t)]g(t)dt,$$

и поскольку кусочно непрерывная на сегменте $[-\pi, \pi]$ функция $g(t)$ удовлетворяет на этом сегменте условию ограниченности $|g(t)| \leq M$, то

$$|I(x+u) - I(x)| \leq M \int_{-\pi}^{\pi} |f(x+t+u) - f(x+t)| dt,$$

и потому в силу (8.62) для любого $\varepsilon > 0$

$$|I(x+u) - I(x)| < \varepsilon \text{ при } |u| \leq \delta(\varepsilon).$$

Непрерывность $I(x)$ в точке x доказана.

Следствие 3. Если каждая из функций $f(t)$ и $g(t)$ кусочно непрерывна на сегменте $[-\pi, \pi]$ и периодически (с периодом 2π) продолжена на всю прямую, то тригонометрические коэффициенты Фурье функции $F(x, t) = f(x+t)g(t)$ при разложении ее по переменной t

$$a_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t)g(t) \cos ntdt, \quad (8.63)$$

$$b_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t)g(t) \sin ntdt \quad (8.64)$$

при $n \rightarrow \infty$ сходятся к нулю равномерно относительно x на сегменте $[-\pi, \pi]$ (а следовательно, и на всей прямой).

Доказательство. Для любой фиксированной точки x сегмента $[-\pi, \pi]$ функция $F(x, t) = f(x+t)g(t)$ является кусочно непрерывной функцией аргумента t на сегменте $[-\pi, \pi]$, поэтому для нее справедливо равенство Парсеваля²⁷⁾

²⁷⁾ См. следствие 1 п. 3 § 3.

$$\frac{a_0^2(x)}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k^2(x) + b_k^2(x)] = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x+t) g^2(t) dt. \quad (8.65)$$

Из равенства (8.65) вытекает сходимость ряда, стоящего в левой его части, в каждой фиксированной точке x сегмента $[-\pi, \pi]$. Так как указанный ряд состоит из неотрицательных членов, то в силу теоремы Дини²⁸⁾ для доказательства равномерной на сегменте $[-\pi, \pi]$ сходимости указанного ряда достаточно доказать, что как функции $a_n(x)$ и $b_n(x)$, так и сумма ряда (8.65)

$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x+t) g^2(t) dt$ — непрерывные функции x на сегменте $[-\pi, \pi]$, а это сразу вытекает из предыдущего следствия (достаточно учесть, что квадрат кусочно непрерывной функции является кусочно непрерывной функцией и что $\cos nt$ и $\sin nt$ при каждом фиксированном номере n являются непрерывными функциями).

Следствие 4. Если каждая из функций $f(t)$ и $g(t)$ кусочно непрерывна на сегменте $[-\pi, \pi]$ и периодически с периодом 2π продолжена на всю прямую, то последовательность

$$c_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) g(t) \sin \left[\left(n + \frac{1}{2} \right) t \right] dt \quad (8.66)$$

сходится к нулю равномерно относительно x на сегменте $[-\pi, \pi]$ (а следовательно, и на всей прямой).

Доказательство. Достаточно учесть, что

$$\sin \left[\left(n + \frac{1}{2} \right) t \right] = \cos nt \sin \frac{t}{2} + \sin nt \cos \frac{t}{2}$$

и применить предыдущее следствие, беря в (8.63) вместо $g(t)$ функцию $g(t) \sin \frac{t}{2}$, а в (8.64) вместо $g(t)$ функцию $g(t) \cos \frac{t}{2}$.

4. Принцип локализации. В этом пункте мы докажем, что вопрос о том, сходится или расходится тригонометрический ряд Фурье кусочно непрерывной на сегменте $[-\pi, \pi]$ и периодической (с периодом 2π) функции $f(x)$ в данной точке x , решается лишь на основании поведения функции $f(x)$ в как угодно малой окрестности точки x . Это замечательное свойство тригонометрического ряда Фурье принято называть принципом локализации.

Начнем с доказательства важной леммы.

Лемма (лемма Римана). Если функция $f(x)$ кусочно непрерывна на сегменте $[-\pi, \pi]$ и периодически (с периодом 2π) про-

²⁸⁾ См. теорему 2.4 (формулировку в терминах рядов).

должна на всю прямую и если эта функция обращается в нуль на некотором сегменте $[a, b]$ ²⁹⁾, то для любого положительного числа δ , меньшего $\frac{b-a}{2}$, тригонометрический ряд Фурье функции $f(x)$ равномерно на сегменте $[a+\delta, b-\delta]$ сходится к нулю.

Доказательство. Пусть δ — произвольное положительное число, меньшее $\frac{b-a}{2}$. Частичная сумма тригонометрического ряда Фурье функции $f(x)$ в произвольной точке x числовой прямой определяется равенством (8.55). Полагая

$$g(t) = \begin{cases} \frac{1}{2 \sin \frac{t}{2}} & \text{при } \delta < |t| \leq \pi; \\ \frac{1}{4 \sin \frac{t}{2}} & \text{при } |t| = \delta; \\ 0 & \text{при } |t| < \delta \end{cases} \quad (8.67)$$

и учитывая, что $f(x+t)$ равняется нулю при условии, что x принадлежит сегменту $[a+\delta, b-\delta]$, а t принадлежит сегменту $|t| \leq \delta$ ³⁰⁾, можно следующим образом переписать равенство (8.55) для каждой точки x сегмента $[a+\delta, b-\delta]$:

$$S_n(x, f) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) g(t) \sin \left[\left(n + \frac{1}{2} \right) t \right] dt.$$

Остается принять во внимание, что последовательность, стоящая в правой части последнего равенства, в силу следствия 4 п. 3, сходится к нулю равномерно относительно x на всей числовой прямой. Лемма доказана.

Непосредственными следствиями доказанной леммы являются следующие две теоремы.

Теорема 8.11. Пусть функция $f(x)$ кусочно непрерывна на сегменте $[-\pi, \pi]$ и периодически (с периодом 2π) продолжена на всю прямую, и пусть $[a, b]$ — некоторый сегмент. Для того чтобы тригонометрический ряд Фурье функции $f(x)$ при любом положительном δ , меньшем $(b-a)/2$, сходиллся (к этой функции)

²⁹⁾ Сегмент $[a, b]$ является совершенно произвольным сегментом длины, меньшей 2π . В частности, этот сегмент может не содержаться целиком в $[-\pi, \pi]$.

³⁰⁾ В силу того, что функция $f(x)$ равна нулю на всем сегменте $[a, b]$.

равномерно на сегменте $[a+\delta, b-\delta]$, достаточно, чтобы существовала кусочно непрерывная на сегменте $[-\pi, \pi]$ и периодическая (с периодом 2π) функция $g(x)$, обладающая равномерно сходящимся на сегменте $[a, b]$ тригонометрическим рядом Фурье и совпадающая на сегменте $[a, b]$ с функцией $f(x)$.

Доказательство. Применяя лемму Римана к разности $[f(x)-g(x)]$, получим, что тригонометрический ряд Фурье разности $[f(x)-g(x)]$ при любом δ из интервала $0 < \delta < (b-a)/2$ сходится к нулю равномерно на сегменте $[a+\delta, b-\delta]$, а отсюда и из равномерности на сегменте $[a, b]$ сходимости тригонометрического ряда Фурье функции $g(x)$ вытекает равномерная на сегменте $[a+\delta, b-\delta]$ сходимость тригонометрического ряда Фурье функции $f(x)$. Тот факт, что последний ряд сходится на сегменте $[a+\delta, b-\delta]$ именно к функции $f(x)$, непосредственно вытекает из следствия 5 п. 3 § 3. Теорема доказана.

Теорема 8.12. Пусть функция $f(x)$ кусочно непрерывна на сегменте $[-\pi, \pi]$ и периодически (с периодом 2π) продолжена на всю прямую, и пусть x_0 — некоторая точка прямой. Для того чтобы тригонометрический ряд Фурье функции $f(x)$ сходилась в точке x_0 , достаточно, чтобы существовала кусочно непрерывная на сегменте $[-\pi, \pi]$ и периодическая (с периодом 2π) функция $g(x)$, обладающая сходящимся в точке x_0 тригонометрическим рядом Фурье и совпадающая с $f(x)$ в как угодно малой δ -окрестности точки x_0 .

Доказательство. Достаточно применить лемму Римана к разности $[f(x)-g(x)]$ по сегменту $[x_0-\delta/2, x_0+\delta/2]$ и учесть что из сходимости в точке x_0 тригонометрических рядов функций $[f(x)-g(x)]$ и $g(x)$ вытекает сходимость в этой точке и тригонометрического ряда Фурье функции $f(x)$. Теорема доказана.

Теорема 8.12 не устанавливает конкретного вида условий, обеспечивающих сходимость тригонометрического ряда Фурье функции $f(x)$ в точке x_0 . Она лишь доказывает, что эти условия определяются только поведением $f(x)$ в как угодно малой окрестности точки x_0 (т. е. имеют локальный характер).

5. Равномерная сходимость тригонометрического ряда Фурье для функции из класса Гёльдера. В этом и в следующем пункте мы уточним условия, обеспечивающие равномерную сходимость и сходимость в данной точке x_0 тригонометрического ряда Фурье.

Теорема 8.13. Если функция $f(x)$ принадлежит на сегменте $[-\pi, \pi]$ классу Гёльдера S^a с каким угодно положительным показателем a ($0 < a \leq 1$) и если, кроме того, $f(-\pi) = f(\pi)$, то тригонометрический ряд Фурье функции $f(x)$ сходится (к этой функции) равномерно на сегменте $[-\pi, \pi]$.

Доказательство. Как обычно, будем считать, что функция $f(x)$ периодически (с периодом 2π) продолжена на всю числовую прямую. Условие $f(-\pi) = f(\pi)$ обеспечивает принадлеж-

ность так продолженной функции классу Гёльдера C^α на всей числовой прямой.

Пусть x — любая точка сегмента $[-\pi, \pi]$. Умножая обе части равенства (8.56) на $f(x)$ и вычитая полученное при этом равенство из (8.55), получим равенство

$$S_n(x, f) - f(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f(x+t) - f(x)] \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt. \quad (8.68)$$

Из условия принадлежности $f(x)$ классу Гёльдера C^α вытекает существование постоянной M такой, что

$$|f(x+t) - f(x)| \leq M |t|^\alpha \quad (8.69)$$

во всяком случае для всех x и всех t из сегмента $[-\pi, \pi]$.

Фиксируем произвольное $\varepsilon > 0$ и по нему $\delta > 0$, удовлетворяющее неравенству

$$\frac{M}{\alpha} \delta^\alpha < \frac{\varepsilon}{3}. \quad (8.70)$$

Разбивая сегмент $[-\pi, \pi]$ на сумму отрезка $|t| \leq \delta$ и множества $\delta \leq |t| \leq \pi$, придадим равенству (8.68) следующий вид:

$$\begin{aligned} S_n(x, f) - f(x) &= \frac{1}{\pi} \int_{|t| \leq \delta} [f(x+t) - f(x)] \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt + \\ &+ \frac{1}{\pi} \int_{\delta \leq |t| \leq \pi} f(x+t) \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt - \frac{f(x)}{\pi} \int_{\delta \leq |t| \leq \pi} \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt. \end{aligned} \quad (8.71)$$

Для оценки первого интеграла в правой части (8.71) воспользуемся неравенством (8.69) и учтем, что

$$\frac{1}{2 \left| \sin \frac{t}{2} \right|} \leq \frac{\pi}{2 |t|}$$

для всех t из сегмента $[-\pi, \pi]$ ³¹⁾. Таким образом, для любого

³¹⁾ Указанное неравенство сразу вытекает из того, что функция $(\sin x)/x$ при изменении x от 0 до $\pi/2$ убывает от 1 до $2/\pi$. Факт убывания функции $\frac{\sin x}{x}$ в свою очередь вытекает из того, что $\left(\frac{\sin x}{x}\right)' = \frac{\cos x}{x^2} (x - \operatorname{tg} x) < 0$ всюду при $0 < x < \pi/2$, так как $x < \operatorname{tg} x$ при $0 < x < \pi/2$ (см. гл. 4 ч. 1).

номера n и любого x из сегмента $[-\pi, \pi]$ получим

$$\begin{aligned} & \left| \int_{|t| \leq \delta} [f(x+t) - f(x)] \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt \right| \leq \\ & \leq \int_{|t| \leq \delta} |f(x+t) - f(x)| \frac{\left| \sin\left(n + \frac{1}{2}\right)t \right|}{2 \left| \sin \frac{t}{2} \right|} dt \leq \\ & \leq \frac{M\pi}{2} \int_{|t| \leq \delta} |t|^{\alpha-1} dt = M\pi \int_0^{\delta} t^{\alpha-1} dt = \frac{M\pi}{\alpha} \delta^{\alpha}. \end{aligned}$$

Отсюда на основании (8.70) для любого номера n и любого x из сегмента $[-\pi, \pi]$ будем иметь оценку

$$\left| \frac{1}{\pi} \int_{|t| \leq \delta} [f(x+t) - f(x)] \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt \right| < \frac{\varepsilon}{3}. \quad (8.72)$$

Второй из интегралов в правой части (8.71) с помощью кусочно непрерывной на сегменте $[-\pi, \pi]$ функции (8.67) записывается в виде

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\pi} \int_{\delta \leq |t| \leq \pi} f(x+t) \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt = \\ & = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) g(t) \sin\left[\left(n + \frac{1}{2}\right)t\right] dt. \end{aligned}$$

В силу следствия 4 п. 3 правая часть последнего равенства при $n \rightarrow \infty$ сходится к нулю равномерно относительно x на сегменте $[-\pi, \pi]$. Поэтому для фиксированного нами $\varepsilon > 0$ найдется номер N_1 такой, что

$$\left| \frac{1}{\pi} \int_{\delta \leq |t| \leq \pi} f(x+t) \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt \right| < \frac{\varepsilon}{3} \quad (8.73)$$

для всех $n \geq N_1$ и всех x из сегмента $[-\pi, \pi]$.

Для оценки последнего интеграла в правой части (8.71) заметим, что с помощью кусочно непрерывной функции (8.67) этот интеграл записывается в виде

$$\frac{f(x)}{\pi} \int_{\delta \leq |t| \leq \pi} \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt = \frac{f(x)}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(t) \sin\left[\left(n + \frac{1}{2}\right)t\right] dt.$$

Интеграл, стоящий в правой части последнего равенства, при $n \rightarrow \infty$ сходится к нулю в силу все того же следствия 4 п. 3 (достаточно применить это следствие к функции $f(x) \equiv 1$). Учитывая также, что функция $f(x)$ во всяком случае ограничена на сегменте $[-\pi, \pi]$, получим, что для фиксированного нами произвольного $\varepsilon > 0$ найдется номер N_2 такой, что

$$\left| \frac{f(x)}{\pi} \int_{\delta \leq |t| \leq \pi} \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt \right| < \frac{\varepsilon}{3} \quad (8.74)$$

для всех $n \geq N_2$ и всех точек x из сегмента $[-\pi, \pi]$.

Обозначив через N наибольший из двух номеров N_1 и N_2 , в силу (8.71) — (8.74) получим, что для фиксированного нами произвольного $\varepsilon > 0$ найдется номер N такой, что

$$|S_n(x, f) - f(x)| < \varepsilon$$

для всех $n \geq N$ и всех x из сегмента $[-\pi, \pi]$. Теорема доказана.

З а м е ч а н и е 1. Очевидно, что в условиях теоремы 8.13 тригонометрический ряд Фурье сходится равномерно не только на сегменте $[-\pi, \pi]$, но и на всей прямой (к функции, являющейся периодическим (с периодом 2π) продолжением функции $f(x)$ на всю прямую).

З а м е ч а н и е 2. Отметим, что при оценке интегралов (8.73) и (8.74) мы использовали лишь кусочную непрерывность (и вытекающую из нее ограниченность) функции $f(x)$ на сегменте $[-\pi, \pi]$ (принадлежность $f(x)$ классу Гёльдера C^α при оценке этих интегралов не использовалась).

З а м е ч а н и е 3. Естественно возникает вопрос о том, можно ли в теореме 8.13 ослабить требование гладкости на функцию $f(x)$, сохраняя утверждение этой теоремы о равномерной на сегменте $[-\pi, \pi]$ сходимости тригонометрического ряда Фурье этой функции.

Напомним, что принадлежность $f(x)$ на сегменте $[-\pi, \pi]$ классу Гёльдера C^α по определению означает, что модуль непрерывности $f(x)$ на этом сегменте имеет порядок

$$\omega(\delta, f) = O(\delta^\alpha).$$

Отметим без доказательства так называемую теорему Дини — Липшица:

Для равномерной на сегменте $[-\pi, \pi]$ сходимости тригонометрического ряда Фурье функции $f(x)$ достаточно, чтобы эта функция удовлетворяла условию $f(-\pi) = f(\pi)$ и чтобы ее модуль непрерывности на сегменте $[-\pi, \pi]$ имел порядок

$$\omega(x, f) = o\left(\frac{1}{\ln(1/\delta)}\right),$$

т. е. является при $\delta \rightarrow 0$ бесконечно малой величиной более высокого порядка, чем $\frac{1}{\ln(1/\delta)}$.

Теорема Дини — Липшица содержит окончательное (в терминах модуля непрерывности функции) условие равномерной сходимости тригонометрического ряда Фурье функции, так как можно построить функцию $f(x)$, удовлетворяющую условию $f(-\pi) = f(\pi)$ с модулем непрерывности, имеющим на сегменте $[-\pi, \pi]$ порядок $O\left(\frac{1}{\ln(1/\delta)}\right)$ и с тригонометрическим рядом Фурье, расходящимся на множестве точек, всюду плотном на сегменте $[-\pi, \pi]$ ³²⁾.

В условиях теоремы 8.13 после периодического (с периодом 2π) продолжения функция $f(x)$ оказалась принадлежащей классу Гёльдера S^α на всей числовой прямой. Естественно возникает вопрос о поведении тригонометрического ряда Фурье функции $f(x)$, принадлежащей классу Гёльдера S^α только на некотором сегменте $[a, b]$, а всюду вне этого сегмента удовлетворяющей лишь обычному требованию кусочной непрерывности. Ответ на этот вопрос дает следующая теорема.

Теорема 8.14. Пусть функция $f(x)$ кусочно непрерывна на сегменте $[-\pi, \pi]$ и периодически (с периодом 2π) продолжена на всю числовую прямую. Пусть далее на некотором сегменте $[a, b]$, имеющем длину, меньшую 2π , эта функция принадлежит классу Гёльдера S^α с произвольным положительным показателем α ($0 < \alpha \leq 1$). Тогда для любого δ из интервала $0 < \delta < (b - a)/2$ тригонометрический ряд Фурье функции $f(x)$ сходится (к этой функции) равномерно на сегменте $[a + \delta, b - \delta]$.

Доказательство. Построим функцию $g(x)$, которая на сегменте $[a, b]$ совпадает с $f(x)$, на сегменте $[b, a + 2\pi]$ является линейной функцией вида $Ax + B$, обращающейся в $f(b)$ при $x = b$

³²⁾ Доказательство теоремы Дини — Липшица и построение только что указанного примера можно найти, например, в книге А. Зигмунда «Тригонометрические ряды. Т. 1» (М.: Мир, 1965. С. 108 и 477).

и в $f(a)$ при $x = a + 2\pi$ ³³⁾, и которая периодически (с периодом 2π) продолжена с сегмента $[a, a + 2\pi]$ на всю прямую (на рис. 8.1 жирная линия изображает график функции $f(x)$, а штриховая линия — график построенной по ней функции $g(x)$).

Очевидно, что построенная нами функция $g(x)$ удовлетворяет условию $g(-\pi) = g(\pi)$ и принадлежит классу Гёльдера S^a (с тем же положительным показателем a , что и $f(x)$) на всей пря-




Рис. 8.1

мой³⁴⁾. В силу теоремы 8.13 и замечания 1 тригонометрический ряд Фурье функции $g(x)$ сходится равномерно на всей числовой прямой, а поэтому в силу теоремы 8.11 тригонометрический ряд Фурье функции $f(x)$ при любом δ из интервала $0 < \delta < (b - a)/2$ сходится (к этой функции) равномерно на сегменте $[a + \delta, b - \delta]$. Теорема доказана.

З а м е ч а н и е 4. Утверждение теоремы 8.14 остается справедливым и для сегмента $[a, b]$, имеющего длину, равную 2π (т. е. для случая $b = a + 2\pi$, но в этом случае при доказательстве теоремы следует, фиксируя произвольное δ из интервала $0 < \delta < \pi$, взять функцию $g(x)$ совпадающей с $f(x)$ на сегменте $[a + \delta/2, a + 2\pi - \delta/2]$, линейной на сегменте $[a + 2\pi - \delta/2, a + 2\pi + \delta/2]$ и периодически (с периодом 2π) продолженной с сегмента $[a + \delta/2, a + 2\pi + \delta/2]$ на всю числовую прямую. Если же сегмент $[a, b]$ имеет длину, превосходящую 2π , то из принадлежности $f(x)$ классу Гёльдера S^a на этом сегменте и из условия периодичности $f(x)$ (с периодом 2π) вытекает, что $f(x)$ принадлежит

³³⁾ Условие обращения функции $Ax + B$ в $f(b)$ при $x = b$ и в $f(a)$ при $x = a + 2\pi$ однозначно определяет постоянные A и B :

$$A = \frac{f(a) - f(b)}{a + 2\pi - b}, \quad B = \frac{(a + 2\pi)f(b) - bf(a)}{a + 2\pi - b}.$$

³⁴⁾ Достаточно учесть, что $g(x)$ всюду непрерывна и что линейная функция имеет ограниченную производную и поэтому принадлежит классу Гёльдера S^a при любом $a \leq 1$.

классу S^a на всей прямой, т. е. в этом случае мы приходим к теореме 8.13.

6. О сходимости тригонометрического ряда Фурье кусочно гёльдеровой функции.

Определение 1. Будем называть функцию $f(x)$ кусочно гёльдеровой на сегменте $[a, b]$, если эта функция кусочно непрерывна на сегменте $[a, b]$ и если этот сегмент при помощи конечного числа точек $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$ разбивается на частичные сегменты $[x_{k-1}, x_k]$ ($k=1, 2, \dots, n$), на каждом из которых функция $f(x)$ принадлежит классу Гёльдера S^{a_k} с некоторым положительным показателем a_k ($0 < a_k \leq 1$). При этом при определении класса Гёльдера на частичном сегменте $[x_{k-1}, x_k]$ в качестве значений функции на концах сегмента следует брать предельные значения

$$f(x_{k-1}+0) \text{ и } f(x_k-0) \text{ }^{35)}.$$

Иными словами, область задания всякой кусочно гёльдеровой функции распадается на конечное число не имеющих общих внутренних точек сегментов, на каждом из которых эта функция принадлежит классу Гёльдера с некоторым положительным показателем.

Каждый из этих сегментов мы будем называть участком гладкости функции.

Определение 2. Будем называть функцию $f(x)$ кусочно гладкой на сегменте $[a, b]$, если эта функция кусочно непрерывна на сегменте $[a, b]$ и имеет на этом сегменте кусочно непрерывную производную³⁶⁾, т. е. если функция $f(x)$ кусочно непрерывна на сегменте $[a, b]$ и ее производная $f'(x)$ существует и непрерывна всюду на этом сегменте, за исключением, быть может, конечного числа точек, в каждой из которых функция $f'(x)$ имеет конечные правое и левое предельные значения.

Ясно, что всякая кусочно гладкая на сегменте $[a, b]$ функция является на этом сегменте кусочно гёльдеровой.

Теорема 8.15. Пусть кусочно гёльдеровая на сегменте $[-\pi, \pi]$ функция $f(x)$ периодически (с периодом 2π) продолжена на всю прямую. Тогда тригонометрический ряд Фурье функции $f(x)$ сходится в каждой точке x прямой к значению $f(x) = [f(x+0) + f(x-0)]/2$, причем сходимость этого ряда является равномер-

³⁵⁾ Как у всякой кусочно непрерывной функции, у кусочно гёльдеровой функции значения в каждой точке x_k обязаны быть равны полусумме правого и левого предельных значений в этой точке, т. е. должно быть справедливо равенство

$$f(x_k) = \frac{1}{2} [f(x_k+0) + f(x_k-0)].$$

³⁶⁾ См. определение 1 из п. 2 § 4.

ной на каждом фиксированном сегменте, лежащем внутри участка гладкости функции $f(x)$.

Доказательство. Утверждение теоремы о равномерной сходимости на каждом фиксированном сегменте, лежащем внутри участка гладкости, сразу вытекает из теоремы 8.14. Отсюда же вытекает и сходимость тригонометрического ряда Фурье функции $f(x)$ в каждой внутренней точке участка гладкости функции $f(x)$ ³⁷⁾. Остается доказать сходимость тригонометрического ряда Фурье функции $f(x)$ в каждой точке соединения двух участков гладкости.

Фиксируем одну из таких точек и обозначим ее через x . Тогда найдутся постоянные M_1 и M_2 такие, что при любом достаточно малом положительном t будет справедливо неравенство

$$|f(x+t) - f(x+0)| \leq M_1 t^{\alpha_1} \quad (0 < \alpha_1 \leq 1), \quad (8.75)$$

а при любом достаточно малом отрицательном t — неравенство

$$|f(x+t) - f(x-0)| \leq M_2 |t|^{\alpha_2} \quad (0 < \alpha_2 \leq 1). \quad (8.76)$$

Обозначим через M наибольшее из чисел M_1 и M_2 , а через α наименьшее из чисел α_1 и α_2 . Тогда при $|t| \leq 1$ в правой части каждого из неравенств (8.75) и (8.76) можно писать $M|t|^\alpha$.

Фиксируем теперь произвольное $\varepsilon > 0$ и по нему $\delta > 0$, удовлетворяющее неравенству (8.70) и настолько малое, что при $|t| \leq \delta$ справедливы оба неравенства (8.75) и (8.76) и в правой части этих неравенств можно брать число $M|t|^\alpha$. Повторяя рассуждения, проведенные при доказательстве теоремы 8.13, мы придем к равенству (8.71), и для доказательства теоремы нам остается убедиться, что в фиксированной нами точке x справедливы оценки (8.72), (8.73) и (8.74). В замечании 2 п. 5 мы отметили, что оценки (8.73) и (8.74) справедливы для любой только кусочно непрерывной и периодической (с периодом 2π) функции. Остается доказать справедливость для всех номеров n оценки (8.72).

Так как $f(x) = 1/2 [f(x+0) + f(x-0)]$ и³⁸⁾

$$\int_{-\delta}^{\delta} \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt = 2 \int_0^{\delta} \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt = 2 \int_{-\delta}^0 \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt,$$

³⁷⁾ Так как каждую внутреннюю точку участка гладкости можно охватить сегментом, лежащим внутри этого участка.

³⁸⁾ Функция

$$\varphi(t) = \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)t}{2 \sin \frac{t}{2}}$$

то интеграл, стоящий в левой части (8.72), можно переписать так:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\pi} \int_{|t| \leq \delta} [f(x+t) - f(x)] \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt = \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^\delta [f(x+t) - f(x+0)] \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt + \\ &+ \frac{1}{\pi} \int_{-\delta}^0 [f(x+t) - f(x-0)] \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt. \end{aligned} \quad (8.77)$$

Для оценки интегралов, стоящих в правой части (8.77), воспользуемся неравенствами (8.75) и (8.76), беря в правой части этих неравенств число $M|t|^\alpha$. Учитывая уже применявшуюся при доказательстве теоремы 8.13 оценку

$$\frac{1}{2 \left| \sin \frac{t}{2} \right|} \leq \frac{\pi}{2|t|} \quad (\text{при } |t| \leq \pi)$$

и неравенство (8.70), будем иметь

$$\begin{aligned} & \left| \frac{1}{\pi} \int_{|t| \leq \delta} [f(x+t) - f(x)] \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt \right| \leq \\ & \leq \frac{M}{2} \left[\int_0^\delta t^{\alpha-1} dt + \int_{-\delta}^0 |t|^{\alpha-1} dt \right] = \frac{M}{\alpha} \delta^\alpha < \frac{\varepsilon}{3}. \end{aligned}$$

Оценка (8.72), а с ней и теорема доказаны.

является четной, поэтому легко убедиться, что для нее

$$\int_0^\delta \varphi(t) dt =$$

$$= \int_{-\delta}^0 \varphi(t) dt \quad (\text{достаточно в одном из этих интегралов сделать замену } t = -\tau).$$

Следовательно,

$$\int_{-\delta}^\delta \varphi(t) dt = 2 \int_0^\delta \varphi(t) dt = 2 \int_{-\delta}^0 \varphi(t) dt.$$

Следствие 1. Утверждение теоремы 8.15 будет тем более справедливо, если в ее формулировке вместо кусочно гёльдеровой взять кусочно гладкую (на сегменте $[-\pi, \pi]$) функцию, периодически (с периодом 2π) продолженную на всю прямую.

Для формулировки еще одного следствия введем новое понятие. Пусть $0 < \alpha \leq 1$.

Определение 3. Будем говорить, что функция $f(x)$ удовлетворяет в данной точке x справа (слева) условию Гёльдера порядка α , если функция $f(x)$ имеет в точке x правое (левое) предельное значение и если существует такая постоянная M , что для всех достаточно малых положительных (отрицательных) t справедливо неравенство

$$\frac{|f(x+t) - f(x+0)|}{|t|^\alpha} \leq M \quad \left(\frac{|f(x+t) - f(x-0)|}{|t|^\alpha} \leq M \right).$$

Очевидно, что если функция $f(x)$ имеет в данной точке x правую (левую) производную, понимаемую как предел

$$\lim_{t \rightarrow 0+0} \frac{f(x+t) - f(x+0)}{t} \quad \left(\lim_{t \rightarrow 0-0} \frac{f(x+t) - f(x-0)}{t} \right),$$

то функция $f(x)$ заведомо удовлетворяет в этой точке x справа (слева) условию Гёльдера любого порядка $\alpha \leq 1$.

Следствие 2 (условие сходимости тригонометрического ряда Фурье в данной точке). Для того чтобы тригонометрический ряд Фурье кусочно непрерывной и периодической (с периодом 2π) функции $f(x)$ сходилась в данной точке x числовой прямой, достаточно, чтобы функция $f(x)$ удовлетворяла в точке x справа условию Гёльдера какого-либо положительного порядка α_1 и в точке x слева условию Гёльдера какого-либо положительного порядка α_2 (и тем более достаточно, чтобы функция $f(x)$ имела в точке x правую и левую производные).

Доказательство. Достаточно заметить, что из того, что функция $f(x)$ удовлетворяет в точке x справа (слева) условию Гёльдера порядка α_1 (порядка α_2), вытекает существование постоянной M_1 (постоянной M_2) такой, что для всех достаточно малых положительных (отрицательных) t справедливо неравенство (8.75) (неравенство (8.76)). Так как доказательство теоремы 8.15 использует лишь неравенства (8.75) и (8.76) и кусочную непрерывность и периодичность $f(x)$, то утверждение следствия 2 верно.

Пример. Не вычисляя коэффициентов Фурье функции

$$f(x) = \begin{cases} \cos x & \text{при } -\pi \leq x < 0; \\ 1/2 & \text{при } x = 0; \\ \sqrt{x} & \text{при } 0 < x \leq \pi, \end{cases}$$

можно утверждать, что тригонометрический ряд Фурье этой функции сходится в точке $x=0$ к значению $\frac{1}{2}$, так как функция $f(x)$ имеет в этой точке левую производную и удовлетворяет в этой точке справа условию Гёльдера порядка $\alpha_2 = \frac{1}{2}$.

7. Суммируемость тригонометрического ряда Фурье непрерывной функции методом средних арифметических. Мы уже отмечали, что тригонометрический ряд Фурье всюду непрерывной и периодической (с периодом 2π) функции может быть расходящимся (см. п. 1). Докажем, что этот ряд тем не менее всегда суммируем (равномерно на всей прямой) методом Чезаро (методом средних арифметических)³⁹⁾.

Теорема 8.16 (теорема Фейера)⁴⁰⁾. Если функция $f(x)$ непрерывна на сегменте $[-\pi, \pi]$ и удовлетворяет условию $f(-\pi) = f(\pi)$, то средние арифметические частичных сумм ее тригонометрического ряда Фурье

$$\sigma_n(x, f) = \frac{S_0(x, f) + S_1(x, f) + \dots + S_{n-1}(x, f)}{n}$$

сходятся (к этой функции) равномерно на сегменте $[-\pi, \pi]$ (а в случае, если функция продолжена на всю прямую с периодом 2π , равномерно на всей прямой).

Доказательство. Из равенства (8.55) для $S_n(x, f)$ следует, что

$$\sigma_n(x, f) = \frac{1}{\pi n} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{f(x+t)}{2 \sin \frac{t}{2}} \left[\sum_{k=0}^{n-1} \sin \left(k + \frac{1}{2} \right) t \right] dt. \quad (8.78)$$

Для вычисления суммы, стоящей в (8.78) в квадратных скобках, просуммируем тождество

$$2 \sin \frac{t}{2} \sin \left(k + \frac{1}{2} \right) t = \cos kt - \cos (k+1)t$$

по всем $k=0, 1, 2, \dots, n-1$. В результате получим

$$2 \sin \frac{t}{2} \sum_{k=0}^{n-1} \sin \left(k + \frac{1}{2} \right) t = 1 - \cos nt = 2 \sin^2 \frac{nt}{2}.$$

³⁹⁾ См. п. 1 § 7 гл. 1.

⁴⁰⁾ Л. Фейер — венгерский математик (1880—1959). Приведенная теорема доказана им в 1904 г.

С помощью этого равенства (8.78) приводится к виду

$$\sigma_n(x, f) = \frac{1}{\pi n} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) \frac{\sin^2 \frac{nt}{2}}{2 \sin^2 \frac{t}{2}} dt. \quad (8.79)$$

Из (8.79) в свою очередь немедленно следует, что

$$\frac{1}{\pi n} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin^2 \frac{nt}{2}}{2 \sin^2 \frac{t}{2}} dt = 1, \quad (8.80)$$

так как левая часть (8.80) равна среднему арифметическому частичных сумм тригонометрического ряда Фурье функции $f(x) \equiv 1$, а все указанные частичные суммы тождественно равны единице (см. п. 2).

Фиксируем произвольное $\varepsilon > 0$. Согласно теореме Вейерштрасса 8.7 найдется тригонометрический многочлен $T(x)$ такой, что

$$|f(x) - T(x)| \leq \varepsilon/2 \quad (8.81)$$

для всех x числовой прямой. В силу линейности средних арифметических $\sigma_n(x, f) = \sigma_n(x, f - T) + \sigma_n(x, T)$, так что

$$|\sigma_n(x, f) - T(x)| \leq |\sigma_n(x, f - T)| + |\sigma_n(x, T) - T(x)|. \quad (8.82)$$

Запишем равенство (8.79) для функции $[f(x) - T(x)]$. Учитывая неотрицательность называемой ядром Фейера функции

$$\frac{\sin^2 \frac{nt}{2}}{2 \sin^2 \frac{t}{2}}$$

и используя оценку (8.81) и равенство (8.80),

получим

$$\begin{aligned} |\sigma_n(x, f - T)| &\leq \\ &\leq \frac{1}{\pi n} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x+t) - T(x+t)| \frac{\sin^2 \frac{nt}{2}}{2 \sin^2 \frac{t}{2}} dt \leq \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} \frac{1}{\pi n} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin^2 \frac{nt}{2}}{2 \sin^2 \frac{t}{2}} dt = \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned} \quad (8.83)$$

Неравенство (8.83) справедливо для любого номера n .

Заметим, что тригонометрический ряд Фурье многочлена $T(x)$ совпадает с этим многочленом. Отсюда следует, что все частичные суммы $S_n(x, T)$, начиная с некоторого номера n_0 , равны $T(x)$. Но это позволяет нам для фиксированного выше произвольного $\varepsilon > 0$ отыскать номер N такой, что

$$|\sigma_n(x, T) - T(x)| < \varepsilon/2 \quad (8.84)$$

при всех $n \geq N$ и всех x .

Из неравенств (8.82) — (8.84) заключаем, что $|\sigma_n(x, f) - f(x)| < \varepsilon$ при всех $n \geq N$ и всех x . Теорема доказана.

8. Заключительные замечания. 1°. При решении ряда конкретных задач приходится раскладывать функцию в тригонометрический ряд Фурье не на сегменте $[-\pi, \pi]$, а на сегменте $[-l, l]$, где l — произвольное положительное число. Для перехода к такому случаю достаточно во всех проведенных выше рассуждениях заменить переменную x на $\frac{\pi}{l}x$. Конечно, при такой линейной замене переменных останутся справедливыми все установленные нами результаты, которые будут относиться к тригонометрическому ряду Фурье

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos \frac{\pi}{l} kx + b_k \sin \frac{\pi}{l} kx \right) \quad (8.85)$$

со следующими выражениями для коэффициентов Фурье:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(t) dt; \\ a_k &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(t) \cos \left(\frac{\pi}{l} kt \right) dt; \quad b_k = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(t) \sin \left(\frac{\pi}{l} kt \right) dt; \\ &k = 1, 2, \dots \end{aligned} \quad (8.86)$$

Мы не будем заново формулировать все установленные теоремы, а лишь отметим, что во всех формулировках сегмент $[-\pi, \pi]$ следует заменить сегментом $[-l, l]$, а период 2π — периодом $2l$.

2°. Из вида (8.86) тригонометрических коэффициентов Фурье вытекает, что для четной функции $f(x)$ равны нулю все коэффициенты b_k ($k=1, 2, \dots$), а для нечетной функции $f(x)$ равны нулю все коэффициенты a_k ($k=0, 1, 2, \dots$). Таким образом, четная функция $f(x)$ раскладывается в тригонометрический ряд Фурье только по косинусам:

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos \frac{\pi}{l} kx,$$

а нечетная функция $f(x)$ раскладывается в тригонометрический ряд Фурье только по синусам:

$$\sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin \frac{\pi}{l} kx.$$

3°. Приведем весьма часто употребляемую комплексную форму записи тригонометрического ряда Фурье (8.85). Используя соотношения (см. п. 3 § 7 гл. 2)

$$e^{-i \frac{\pi}{l} kx} = \cos \frac{\pi}{l} kx - i \sin \frac{\pi}{l} kx,$$

$$e^{i \frac{\pi}{l} kx} = \cos \frac{\pi}{l} kx + i \sin \frac{\pi}{l} kx,$$

легко убедиться в том, что тригонометрический ряд Фурье (8.85) с коэффициентами Фурье (8.86) приводится к виду

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{-i \frac{\pi}{l} kx}, \quad (8.87)$$

в котором комплексные коэффициенты c_k имеют вид

$$c_k = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(t) e^{i \frac{\pi}{l} kt} dt$$

и выражаются через коэффициенты (8.86) по формулам

$$c_0 = \frac{a_0}{2}, \quad c_{-k} = \frac{a_k - ib_k}{2}, \quad c_k = \frac{a_k + ib_k}{2} \quad (k = 1, 2, \dots).$$

§ 6. КРАТНЫЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ РЯДЫ ФУРЬЕ

1. Понятия кратного тригонометрического ряда Фурье и его прямоугольных и сферических частичных сумм. Пусть функция N переменных $f(x_1, x_2, \dots, x_N)$ определена и интегрируема в N -мерном кубе $-\pi \leq x_k \leq \pi$ ($k = 1, 2, \dots, N$); обозначим этот куб символом Π . Кратный тригонометрический ряд такой функции удобно записывать сразу в комплексной форме, используя для сокращения записи понятие скалярного произведения двух N -мерных векторов.

Пусть $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_N)$ — вектор с произвольными вещественными координатами $x_1, x_2, \dots, x_N$, а $\mathbf{p} = (n_1, n_2, \dots, n_N)$ — вектор с целочисленными координатами $n_1, n_2, \dots, n_N$.

Кратным тригонометрическим рядом Фурье функции $f(\mathbf{x}) = f(x_1, x_2, \dots, x_N)$ называется ряд вида

$$\sum_{n_1=-\infty}^{\infty} \dots \sum_{n_N=-\infty}^{\infty} \widehat{f}_{\mathbf{n}} e^{-i(\mathbf{x}, \mathbf{n})}, \quad (8.88)$$

в котором числа $\widehat{f}_{\mathbf{n}}$ называемые коэффициентами Фурье, определяются равенствами

$$\begin{aligned} \widehat{f}_{\mathbf{n}} &= \widehat{f}_{n_1 n_2 \dots n_N} = \\ &= (2\pi)^{-N} \int_{\Pi} \dots \int f(y_1, y_2, \dots, y_N) e^{i(y_1 n_1 + \dots + y_N n_N)} dy_1 \dots dy_N, \end{aligned} \quad (8.89)$$

а символ $(\mathbf{x}, \mathbf{n})$ обозначает скалярное произведение векторов $\mathbf{x}$ и $\mathbf{n}$, равное $x_1 n_1 + x_2 n_2 + \dots + x_N n_N$.

Конечно, кратный тригонометрический ряд Фурье (8.88) можно рассматривать как ряд Фурье по ортонормированной (в N -мерном кубе Π) системе⁴¹⁾, образованной с помощью всевозможных произведений элементов одномерных тригонометрических систем, взятых от переменных $x_1, x_2, \dots, x_N$ соответственно. Эту ортонормированную систему принято называть кратной тригонометрической системой.

Как и для всякой ортонормированной системы, для кратной тригонометрической системы справедливо неравенство Бесселя, которое имеет вид

$$\sum_{n_1=-\infty}^{\infty} \dots \sum_{n_N=-\infty}^{\infty} |\widehat{f}_{\mathbf{n}}|^2 \leq (2\pi)^{-N} \int_{\Pi} \dots \int f^2(x_1, \dots, x_N) dx_1 \dots dx_N, \quad (8.90)$$

где $f(x_1, x_2, \dots, x_N)$ — любая непрерывная в N -мерном кубе Π функция.

Рассмотрим вопрос о сходимости тригонометрического ряда Фурье. Если этот ряд *не сходится* в данной точке $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_N)$ *абсолютно*, то вопрос о его сходимости (в силу теоремы Римана 1.10) зависит от порядка следования его членов (или, что то же самое, от порядка суммирования по индексам $n_1, n_2, \dots, n_N$).

Широко распространены два способа суммирования кратного тригонометрического ряда Фурье — сферический и прямоугольный.

Сферическими частичными суммами кратного тригонометрического ряда Фурье (8.88) называются суммы вида

⁴¹⁾ При этом скалярное произведение двух любых функций определяется как интеграл от произведения этих функций по кубу Π .

$$S_\lambda(x, f) = \sum_{|n| \leq \lambda} \hat{f}_n e^{-i(x, n)},$$

взятые по всем целочисленным значениям $n_1, n_2, \dots, n_N$, удовлетворяющими условию $|n| = \sqrt{n_1^2 + n_2^2 + \dots + n_N^2} \leq \lambda$.

Говорят, что *кратный тригонометрический ряд Фурье (8.88) суммируем в данной точке x сферическим методом, если в этой точке существует предел* $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} S_\lambda(x, f)$.

Прямоугольными частичными суммами кратного тригонометрического ряда Фурье (8.88) называются суммы вида

$$S_{m_1, m_2, \dots, m_N}(x, f) = \sum_{n_1 = -m_1}^{m_1} \dots \sum_{n_N = -m_N}^{m_N} \hat{f}_n e^{-i(x, n)}.$$

Говорят, что *кратный тригонометрический ряд Фурье (8.88) суммируем в данной точке x прямоугольным методом (или методом Принсгейма⁴²⁾), если в этой точке существует предел*

$$\lim_{\substack{m_1 \rightarrow \infty \\ m_2 \rightarrow \infty \\ \vdots \\ m_N \rightarrow \infty}} S_{m_1, m_2, \dots, m_N}(x, f)$$

(при независимом стремлении к бесконечности каждого индекса $m_1, m_2, \dots, m_N$).

Оба метода суммирования имеют свои преимущества и свои недостатки. При рассмотрении кратного тригонометрического ряда Фурье как ряда Фурье по ортонормированной системе естественно располагать его члены в порядке возрастания $|n|$ и иметь дело со сферическими частичными суммами.

Прямоугольные частичные суммы применяются при исследовании поведения кратных степенных рядов около границы области сходимости. Следует отметить, что определение суммы ряда как предела прямоугольных сумм (в противоположность определению, опирающемуся на предел сферических сумм) не накладывает никаких ограничений на бесконечное множество частичных сумм этого ряда.

Прежде чем формулировать условия сходимости кратного тригонометрического ряда Фурье, определим некоторые характеристики гладкости функции N переменных.

2. Модуль непрерывности и классы Гёльдера для функции N переменных. Пусть функция N переменных $f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_N)$ определена и непрерывна в N -мерной области D .

⁴²⁾ Альфред Принсгейм — немецкий математик (1850—1941).

Определение 1. Для каждого $\delta > 0$ назовем *модулем непрерывности функции* $f(x)$ в области D точную верхнюю грань модуля разности $|f(x') - f(x'')|$ на множестве всех точек x' и x'' , которые принадлежат области D и расстояние $\rho(x', x'')$ между которыми меньше δ .

Будем обозначать модуль непрерывности функции $f(x)$ в области D символом $\omega(\delta, f)$.

Определение 2. Для любого κ из полусегмента $0 < \kappa \leq 1$ будем говорить, что функция $f(x)$ принадлежит в области D классу Гёльдера C^κ с показателем κ , и писать $f(x) \in C^\kappa(D)$, если модуль непрерывности функции $f(x)$ в области D имеет порядок $\omega(x, f) = O(\delta^\kappa)$.

Пусть теперь α — любое положительное число, не обязательно целое. Это число мы всегда можем представить в виде $\alpha = r + \kappa$, где r — целое, а κ принадлежит полусегменту $0 < \kappa \leq 1$.

Определение 3. Будем говорить, что функция $f(x)$ принадлежит в области D классу Гёльдера C^α с показателем $\alpha > 0$, и писать $f(x) \in C^\alpha(D)$, если все частные производные функции $f(x)$ порядка r непрерывны в области D и каждая частная производная порядка r принадлежит классу $C^\kappa(D)$, введенному в определении 2.

3. Условия абсолютной сходимости кратного тригонометрического ряда Фурье. Выясним условия абсолютной и равномерной сходимости кратного тригонометрического ряда Фурье.

Теорема 8.17. Если функция $f(x)$ периодически (с периодом 2π по каждой из переменных) продолжена на все пространство E^N и обладает в E^N непрерывными производными порядка $s = [N/2] + 1$, где $[N/2]$ — целая часть числа $N/2$, то кратный тригонометрический ряд Фурье функции $f(x)$ сходится (к этой функции) абсолютно и равномерно во всем пространстве E^N .

Доказательство. Договоримся обозначать символом $\left(\frac{\partial^m f}{\partial x_k^m}\right)_n$ коэффициент Фурье производной $\frac{\partial^m f}{\partial x_k^m}$ с номером $p = (n_1, n_2, \dots, n_N)$. Производя интегрирование по частям, получим $\left(\frac{\partial f}{\partial x_k}\right)_n = i n_k \hat{f}_n$ (для любого $k=1, 2, \dots, N$), так что

$$\sum_{k=1}^N \left| \left(\frac{\partial f}{\partial x_k} \right)_n \right| = |\hat{f}_n| (|n_1| + |n_2| + \dots + |n_N|)$$

и, следовательно,

$$|\hat{f}_n| = (|n_1| + |n_2| + \dots + |n_N|)^{-1} \sum_{k=1}^N \left| \left(\frac{\partial f}{\partial x_k} \right)_n \right|. \quad (8.91)$$

Формула (8.91) справедлива не только для функции f , но и для каждой частной производной функции f до порядка $(s-1)$ включительно.

Отсюда сразу же вытекает соотношение

$$|\widehat{f}_n| \leq (|n_1| + |n_2| + \dots + |n_N|)^{-s} \sum_{s_1+s_2+\dots+s_N=s} \left| \left(\frac{\partial^s f}{\partial x_1^{s_1} \dots \partial x_N^{s_N}} \right)_n \right|, \quad (8.92)$$

сумма в правой части которого берется по всем целым неотрицательным $s_1, s_2, \dots, s_N$, удовлетворяющим условию $s_1+s_2+\dots+s_N=s$ (так что число слагаемых в этой сумме равно N^s). Из (8.92) в свою очередь следует⁴³⁾, что

$$|\widehat{f}_n| \leq \frac{1}{2} (|n_1| + |n_2| + \dots + |n_N|)^{-2s} + \frac{N^s}{2} \sum_{s_1+\dots+s_N=s} \left| \left(\frac{\partial^s f}{\partial x_1^{s_1} \dots \partial x_N^{s_N}} \right)_n \right|^2. \quad (8.93)$$

Учитывая, что $s = \frac{N}{2} + \varepsilon$, где $\varepsilon=1$ для четного N и $\varepsilon=1/2$ для нечетного N , и что

$$\begin{aligned} (|n_1| + |n_2| + \dots + |n_N|)^{2s} &= (|n_1| + |n_2| + \dots + |n_N|)^{-N-2\varepsilon} \leq \\ &\leq |n_1|^{-1-\frac{2\varepsilon}{N}} |n_2|^{-1-\frac{2\varepsilon}{N}} \dots |n_N|^{-1-\frac{2\varepsilon}{N}}, \end{aligned}$$

из (8.93) получим

$$\begin{aligned} |\widehat{f}_n| &\leq \frac{1}{2} |n_1|^{-1-\frac{2\varepsilon}{N}} |n_2|^{-1-\frac{2\varepsilon}{N}} \dots |n_N|^{-1-\frac{2\varepsilon}{N}} + \\ &+ \frac{N^s}{2} \sum_{s_1+s_2+\dots+s_N=s} \left| \left(\frac{\partial^s f}{\partial x_1^{s_1} \partial x_2^{s_2} \dots \partial x_N^{s_N}} \right)_n \right|^2. \end{aligned} \quad (8.94)$$

Для абсолютной и равномерной сходимости кратного тригонометрического ряда Фурье (8.88) достаточно (в силу признака Вейерштрасса) доказать сходимость мажорирующего его числового ряда

$$\sum_{n_1=-\infty}^{\infty} \dots \sum_{n_N=-\infty}^{\infty} |\widehat{f}_n|,$$

⁴³⁾ Мы пользуемся неравенствами $|a| \cdot |b| \leq a^2/2 + b^2/2$ и $(|a_1| + |a_2| + \dots + |a_p|)^2 \leq p(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_p^2)$.

но (в силу неравенства (8.94)) сходимость последнего ряда является прямым следствием сходимости для любого $k=1, 2, \dots$

$\dots, N$ числового ряда $\sum_{n_k=-\infty}^{\infty} |n_k|^{-1-\frac{2\varepsilon}{N}}$ и сходимости для любых $s_1, s_2, \dots, s_N$ ряда

$$\sum_{n_1=-\infty}^{\infty} \dots \sum_{n_N=-\infty}^{\infty} \left| \left(\frac{\partial^s f}{\partial x_1^{s_1} \partial x_2^{s_2} \dots \partial x_N^{s_N}} \right) \right|_n^2,$$

вытекающей из неравенства Бесселя (8.90), записанного для непрерывной функции $\frac{\partial^s f}{\partial x_1^{s_1} \partial x_2^{s_2} \dots \partial x_N^{s_N}}$.

Тот факт, что кратный тригонометрический ряд Фурье (8.88) сходится именно к функции $f(x)$, вытекает из полноты кратной тригонометрической системы⁴⁴⁾. В самом деле, если бы ряд (8.88) равномерно сходил к некоторой функции $g(x)$, то из возможности почленного интегрирования такого ряда вытекало бы, что все коэффициенты Фурье функции $g(x)$ совпадают с соответствующими коэффициентами Фурье функции $f(x)$. Но тогда разность $[f(x) - g(x)]$ была бы ортогональна всем элементам кратной тригонометрической системы и (в силу полноты этой системы) равнялась бы нулю. Теорема доказана.

З а м е ч а н и е. Теорема 8.17 может быть уточнена.

Т е о р е м а 8.18. Если функция $f(x)$ периодична по каждой из переменных (с периодом 2π) и принадлежит в E^N классу Гёльдера C^α при $\alpha > N/2$, то кратный тригонометрический ряд Фурье $f(x)$ сходится (к этой функции) абсолютно и равномерно во всем пространстве E^N .

Выяснение условий неабсолютной сходимости кратного тригонометрического ряда требует привлечения более тонкой техники.

⁴⁴⁾ Полнота кратной тригонометрической системы сразу вытекает из полноты составляющих ее одномерных тригонометрических систем, произведением которых она является.

Если функция $f(x)$ задана на всей числовой прямой или на полупрямой и не является периодической ни с каким периодом, то эту функцию естественно раскладывать не в тригонометрический ряд Фурье, изученный в предыдущей главе, а в так называемый интеграл Фурье. Изучению такого разложения и посвящена настоящая глава.

Приведем сначала некоторые наводящие соображения. Пусть периодическая с периодом $2l$ и первоначально заданная на сегменте $[-l, l]$ функция $f(x)$ разложена в ряд Фурье:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos \frac{\pi}{l} kx + b_k \sin \frac{\pi}{l} kx \right),$$

где

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(t) dt, \quad a_k = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(t) \cos \frac{\pi}{l} kt dt, \quad b_k = \\ &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(t) \sin \frac{\pi}{l} kt dt. \end{aligned}$$

Формально подставив выражения для a_k и b_k в разложение функции $f(x)$, получим

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(t) dt + \sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{1}{l} \int_{-l}^l f(t) \cos \frac{\pi}{l} kx \cos \frac{\pi}{l} kt dt + \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(t) \sin \frac{\pi}{l} kx \sin \frac{\pi}{l} kt dt \right] = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(t) dt + \\ &\quad + \frac{1}{l} \sum_{k=1}^{\infty} \int_{-l}^l f(t) \left[\cos \frac{\pi}{l} kx \cos \frac{\pi}{l} kt + \sin \frac{\pi}{l} kx \sin \frac{\pi}{l} kt \right] dt, \end{aligned}$$

или

$$f(x) = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(t) dt + \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\pi}{l} \int_{-l}^l f(t) \cos \frac{\pi}{l} k(t-x) dt.$$

Предположим, что функция $f(x)$ абсолютно интегрируема на всей прямой, т. е. сходится несобственный интеграл $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| dt$, и перейдем чисто формально в равенстве для $f(x)$ к пределу при $l \rightarrow \infty$. При этом первое слагаемое правой части равенства стремится к нулю, а второе слагаемое можно рассматривать как интегральную сумму для интеграла $\int_0^{\infty} g(\lambda) d\lambda$ от функции

$$g(\lambda) = \frac{1}{\pi} \int_{-l}^l f(t) \cos \lambda(t-x) dt,$$

если положить $\lambda_k = \frac{\pi}{l} k$, $\Delta\lambda = \frac{\pi}{l}$.

Поэтому формальный предельный переход приводит к равенству

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} d\lambda \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos \lambda(t-x) dt.$$

Это равенство и называется формулой Фурье.

Если положить

$$a_{\lambda} = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos \lambda t dt, \quad b_{\lambda} = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \sin \lambda t dt,$$

то формулу Фурье можно записать в виде

$$f(x) = \int_0^{\infty} (a_{\lambda} \cos \lambda x + b_{\lambda} \sin \lambda x) d\lambda.$$

Перейдем теперь к строгому изложению теории преобразования Фурье.

§ 1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФУНКЦИИ ИНТЕГРАЛОМ ФУРЬЕ

Всюду в дальнейшем подчиним функцию $f(x)$ требованию абсолютной интегрируемости на прямой $(-\infty, \infty)$, т. е. потребуем, чтобы сходился несобственный интеграл

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx. \quad (9.1)$$

Определение 1. Будем говорить, что функция $f(x)$ принадлежит на прямой $(-\infty, \infty)$ классу L_1 и писать $f(x) \in L_1(-\infty, \infty)$, если функция $f(x)$ интегрируема (в собственном смысле Римана) на любом сегменте (говорят, что $f(x)$ — локально интегрируема) и если сходится несобственный интеграл (9.1).

1. Вспомогательные утверждения. Заметим, что в дальнейшем комплексная функция $g(\lambda)$ вещественного аргумента λ будет рассматриваться как пара вещественных функций $u(\lambda)$ и $v(\lambda)$: $g(\lambda) = u(\lambda) + iv(\lambda)$. Непрерывность $g(\lambda)$ в данной точке λ понимается как непрерывность в этой точке каждой из функций $u(\lambda)$ и $v(\lambda)$.

Лемма 1. Если $f \in L_1(-\infty, \infty)$, то для любой точки λ числовой прямой $(-\infty < \lambda < \infty)$ существует несобственный интеграл

$$g(\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\lambda x} f(x) dx, \quad (9.2)$$

называемый преобразованием Фурье (или образом Фурье) функции $f(x)$. Функция $g(\lambda)$ непрерывна по λ в каждой точке числовой прямой.

Доказательство. Из равенства $|f(x)e^{i\lambda x}| = |f(x)|$ и из сходимости интеграла (9.1) вытекает существование несобственного интеграла $g(\lambda)$:

$$|g(\lambda)| = \left| \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\lambda x} f(x) dx \right| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx < \infty.$$

Из признака Вейерштрасса (см. теорему 7.8) вытекает равномерная по λ сходимость интеграла (9.2); отсюда в силу непрерывности $e^{i\lambda x}$ по λ легко следует непрерывность $g(\lambda)$ на каждом сегменте, т. е. в каждой точке числовой прямой.

Лемма 2 (лемма Римана). Пусть функции $f(x)$ — локально интегрируема на $(-\infty, +\infty)$ и $[a, b]$ — произвольный фиксированный интервал числовой прямой; тогда

$$\int_a^b f(x) e^{i\lambda x} dx \rightarrow 0$$

при $\lambda \rightarrow \infty$ (λ — вещественное число).

Доказательство. Фиксируем произвольное число $\varepsilon > 0$. Так как функция $f(x)$ по условию теоремы локально интегрируема на числовой прямой, то $f(x)$ интегрируема на заданном сегмен-

те $[a, b]$. Поэтому для выбранного числа $\varepsilon > 0$ найдется такое разбиение T сегмента $[a, b]$ на частичные сегменты $[x_{k-1}, x_k]$ ($k=1, 2, \dots, n$, $a=x_0 < x_1 < \dots < x_n=b$), что для нижней суммы Дарбу s_T справедливы неравенства

$$0 \leq \int_a^b f(x) dx - s_T < \varepsilon.$$

Напомним, что

$$s_T = \sum_{j=1}^m m_j \Delta x_j,$$

где

$$m_j = \inf_{x \in [x_{j-1}, x_j]} f(x), \quad \Delta x_j = x_j - x_{j-1}.$$

Рассмотрим кусочно постоянную на сегменте $[a, b]$ функцию $p(x) = m_j$, при $x \in [x_{j-1}, x_j]$, $j=1, 2, \dots, n$, $p(x_0) = m_1$. Очевидно, $p(x) \leq f(x)$ на $[a, b]$ и для всех вещественных чисел λ

$$\begin{aligned} 0 &\leq \left| \int_a^b f(x) e^{i\lambda x} dx - \int_a^b p(x) e^{i\lambda x} dx \right| \leq \int_a^b |f(x) - p(x)| \cdot |e^{i\lambda x}| dx = \\ &= \int_a^b [f(x) - p(x)] dx = \int_a^b f(x) dx - s_T < \varepsilon. \end{aligned}$$

Но для фиксированного нами разбиения T

$$\int_a^b p(x) e^{i\lambda x} dx = \sum_{j=1}^n \int_{x_{j-1}}^{x_j} m_j e^{i\lambda x} dx = \frac{1}{i\lambda} \sum_{j=1}^n (m_j e^{i\lambda x}) \Big|_{x_{j-1}}^{x_j} \rightarrow 0$$

при $\lambda \rightarrow \infty$. Таким образом, при $\lambda \rightarrow \infty$ интеграл $\int_a^b p(x) e^{i\lambda x} dx$ стремится к нулю. Лемма доказана.

Лемма 3. Преобразование Фурье $g(\lambda)$ функции $f(x) \in L_1(-\infty, \infty)$ стремится к нулю при $|\lambda| \rightarrow \infty$, т. е.

$$\lim_{|\lambda| \rightarrow \infty} |g(\lambda)| = 0.$$

Доказательство. Фиксируем произвольное число $\varepsilon > 0$. В силу сходимости интеграла (9.1) можно выбрать число $A > 0$ такое, что

$$\int_{-\infty}^{-A} |f(x)| dx + \int_A^{\infty} |f(x)| dx < \frac{\varepsilon}{2}.$$

При таком A справедливо неравенство

$$|g(\lambda)| = \left| \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{i\lambda x} dx \right| \leq \left| \int_{-A}^A f(x) e^{i\lambda x} dx \right| + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Последний интеграл при достаточно большом $|\lambda|$ может быть оценен сверху числом $\frac{\varepsilon}{2}$ (см. лемму 2). Так как ε произвольно, то $\lim_{|\lambda| \rightarrow \infty} |g(\lambda)| = 0$. Лемма доказана.

В качестве следствия из леммы 3 получаем

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cos \lambda x dx = 0, \quad \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \sin \lambda x dx = 0.$$

2. Основная теорема. Формула обращения.

Определение 1. Для каждой функции $f(x)$ из класса $L_1(-\infty, \infty)$ назовем предел

$$\lim_{A \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-A}^A g(\lambda) e^{-i\lambda x} d\lambda = \lim_{A \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-A}^A \left[\int_{-\infty}^{\infty} e^{i\lambda(t-x)} f(t) dt \right] d\lambda \quad (9.3)$$

(при условии, что этот предел существует) разложением функции $f(x)$ в интеграл Фурье.

Возникает вопрос о существовании разложения функции $f(x)$ в интеграл Фурье (9.3). Ответ дается следующей теоремой.

Теорема 9.1. Если функция $f(x) \in L_1(-\infty, \infty)$ и если $f(x)$ удовлетворяет в данной точке x справа условию Гёльдера порядка α_1 , где $0 < \alpha_1 \leq 1$, а слева условию Гёльдера порядка α_2 , где $0 < \alpha_2 \leq 1$, то в данной точке x выполнено равенство

$$\lim_{A \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-A}^A g(\lambda) e^{-i\lambda x} d\lambda = \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}.$$

Таким образом, в каждой точке x , в которой значение $f(x)$ равно полусумме $f_+(x) = \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}$, в частности, в каждой точке непрерывности $f(x)$, справедливо равенство

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} g(\lambda) e^{-i\lambda x} d\lambda, \quad (9.4)$$

в котором несобственный интеграл понимается в смысле главного значения, т. е. при симметричном стремлении пределов интегрирования к бесконечности.

Доказательство. Поскольку $g(\lambda)$ — непрерывная функция, то при любом $A > 0$ существует интеграл

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-A}^A g(\lambda) e^{-i\lambda x} d\lambda = \frac{1}{2\pi} \int_{-A}^A e^{-i\lambda x} \left[\int_{-\infty}^{\infty} e^{i\lambda t} f(t) dt \right] d\lambda.$$

В силу того что интеграл, заключенный в квадратные скобки, равномерно по λ сходится на любом сегменте $[-A, A]$, можно поменять порядок интегрирования относительно t и λ . Воспользовавшись равенствами

$$e^{i\lambda(t-x)} = \cos \lambda(t-x) + i \sin \lambda(t-x);$$

$$\int_{-A}^A \cos \lambda(t-x) d\lambda = \frac{2 \sin A(t-x)}{(t-x)}; \quad \int_{-A}^A \sin \lambda(t-x) d\lambda = 0,$$

а также заменой $t = x + u$, получим

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_{-A}^A g(\lambda) e^{-i\lambda x} d\lambda &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-A}^A e^{i\lambda(t-x)} d\lambda \right] f(t) dt = \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \frac{\sin A(t-x)}{t-x} dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x+u) \frac{\sin Au}{u} du. \end{aligned}$$

Следовательно, при любом $A > 0$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_{-A}^A g(\lambda) e^{-i\lambda x} d\lambda &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^0 f(x+u) \frac{\sin Au}{u} du + \\ &+ \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} f(x+u) \frac{\sin Au}{u} du. \end{aligned} \quad (9.5)$$

Поскольку

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin Au}{u} du = \frac{\pi}{2}, \quad \int_{-\infty}^0 \frac{\sin Au}{u} du = \frac{\pi}{2},$$

то

$$\frac{f(x+0)}{2} = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} f(x+0) \frac{\sin Au}{u} du;$$

$$\frac{f(x-0)}{2} = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^0 f(x-0) \frac{\sin Au}{u} du.$$

Вычитая последние два равенства из (9.5), получим

$$\begin{aligned} \int_{-A}^A g(\lambda) e^{-i\lambda x} d\lambda - \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2} = \\ = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} [f(x+u) - f(x+0)] \frac{\sin Au}{u} du + \\ + \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^0 [f(x+u) - f(x-0)] \frac{\sin Au}{u} du. \end{aligned} \quad (9.6)$$

Так как функция $f(x)$ удовлетворяет справа условию Гёльдера порядка α_1 , то существует постоянная M_1 такая, что для достаточно малых положительных u будет выполнено неравенство

$$|f(x+u) - f(x+0)| \leq M_1 u^{\alpha_1}, \quad 0 < \alpha_1 \leq 1. \quad (*)$$

Аналогично из условия Гёльдера слева порядка α_2 получаем неравенство

$$|f(x+u) - f(x-0)| \leq M_2 |u|^{\alpha_2}, \quad 0 < \alpha_2 \leq 1, \quad (**)$$

для всех достаточно малых по модулю отрицательных u . Пусть $M = \max\{M_1, M_2\}$, $\alpha = \min\{\alpha_1, \alpha_2\}$. Тогда неравенства (*) и (**) можно записать в виде одного:

$$|f(x+u) - f(x \pm 0)| \leq M |u|^{\alpha} \quad (9.7)$$

при $|u| < \delta$, где $\delta > 0$ достаточно мало.

Перепишем соотношение (9.6) в следующем виде:

$$\begin{aligned} \int_{-A}^A g(\lambda) e^{-i\lambda x} d\lambda - \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2} = \frac{1}{\pi} \int_0^{\delta} [f(x+u) - \\ - f(x+0)] \frac{\sin Au}{u} du + \frac{1}{\pi} \int_{-\delta}^0 [f(x+u) - f(x-0)] \frac{\sin Au}{u} du + \\ + \frac{1}{\pi} \int_{|u| \geq \delta} f(x+u) \frac{\sin Au}{u} du - \end{aligned}$$

$$-\frac{f(x+0)}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\sin Au}{u} du - \frac{f(x-0)}{\pi} \int_{-\infty}^{-\delta} \frac{\sin Au}{u} du. \quad (9.8)$$

Пусть фиксировано произвольное $\varepsilon > 0$, а δ выбрано из условия $\frac{M\delta^\alpha}{\pi\alpha} < \frac{\varepsilon}{4}$ и так, чтобы при $|u| < \delta$ было справедливо (9.7). Оценим первые два интеграла в правой части (9.8). Пользуясь (9.7), получим

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi} \left| \int_0^{\delta} [f(x+u) - f(x+0)] \frac{\sin Au}{u} du \right| &\leq \frac{1}{\pi} \int_0^{\delta} |f(x+u) - f(x+0)| \frac{du}{u} \leq \\ &\leq \frac{M}{\pi} \int_0^{\delta} u^{\alpha-1} du = \frac{M\delta^\alpha}{\pi\alpha}. \end{aligned}$$

Аналогично

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi} \left| \int_{-\delta}^0 [f(x+u) - f(x-0)] \frac{\sin Au}{u} du \right| &\leq \frac{1}{\pi} \int_{-\delta}^0 |f(x+u) - f(x-0)| \frac{du}{|u|} \leq \\ &\leq \frac{M}{\pi} \int_{-\delta}^0 |u|^{\alpha-1} du = \frac{M\delta^\alpha}{\pi\alpha}. \end{aligned}$$

Поэтому в силу выбора δ

$$\begin{aligned} &\frac{1}{\pi} \left| \int_0^{\delta} [f(x+u) - f(x+0)] \frac{\sin Au}{u} du \right| + \\ &+ \frac{1}{\pi} \left| \int_{-\delta}^0 [f(x+u) - f(x-0)] \frac{\sin Au}{u} du \right| < \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned} \quad (9.9)$$

Для оценки третьего интеграла в правой части (9.8) рассмотрим функцию

$$q(u) = \begin{cases} \frac{1}{\pi} \frac{f(x+u)}{u} & \text{при } |u| \geq \delta; \\ 0 & \text{при } |u| < \delta. \end{cases}$$

Функция $q(u)$ принадлежит классу $L_1(-\infty, \infty)$, а поэтому в силу леммы Римана

$$\lim_{A \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} q(u) \sin Au du = \lim_{A \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_{|u| \geq \delta} f(x+u) \frac{\sin Au}{u} du = 0.$$

Но это и означает, что для фиксированного нами произвольного $\varepsilon > 0$ существует число N_1 такое, что при $A \geq N_1$

$$\frac{1}{\pi} \left| \int_{|u| \geq \delta} f(x+u) \frac{\sin Au}{u} du \right| < \frac{\varepsilon}{4}. \quad (9.10)$$

Далее,

$$\int_{-\infty}^{-\delta} \frac{\sin Au}{u} du = \int_{\delta}^{\infty} \frac{\sin Au}{u} du = \int_{A\delta}^{\infty} \frac{\sin \tau}{\tau} d\tau \rightarrow 0$$

при $A \rightarrow \infty$. Отсюда следует, что для фиксированного нами произвольного $\varepsilon > 0$ и рассматриваемой точки x найдется N_2 такое, что

$$\left| \frac{f(x+0)}{\pi} \int_{\delta}^{\infty} \frac{\sin Au}{u} du \right| + \left| \frac{f(x-0)}{\pi} \int_{-\infty}^{-\delta} \frac{\sin Au}{u} du \right| < \frac{\varepsilon}{4} \quad (9.11)$$

при $A \geq N_2$. Пусть $N = \max \{N_1, N_2\}$. Тогда, подставляя (9.9)–(9.11) в (9.8), получаем, что при $A \geq N$

$$\left| \int_{-A}^A g(\lambda) e^{-i\lambda x} d\lambda - \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2} \right| < \varepsilon.$$

Теорема доказана.

Замечание. Требования, налагаемые на функцию $f(x)$ в теореме 9.1, можно несколько ослабить.

Определение 2. Будем говорить, что функция $f(x)$, заданная в некоторой проколотой окрестности точки x , удовлетворяет в точке x условиям Дини, если:

а) в точке x существуют оба односторонних предела

$$f(x+0) = \lim_{u \rightarrow 0+0} f(x+u), \quad f(x-0) = \lim_{u \rightarrow 0+0} f(x-u);$$

б) для какого-нибудь положительного значения ε оба интеграла

$$\int_0^{\varepsilon} \frac{f(x+u) - f(x+0)}{u} du, \quad \int_0^{\varepsilon} \frac{f(x-u) - f(x-0)}{u} du$$

сходятся абсолютно.

Ясно, что если функция $f(x)$ удовлетворяет в точке x справа и слева условию Гёльдера

$$|f(x+u) - f(x \pm 0)| \leq M|u|^{\alpha}, \quad 0 < \alpha \leq 1,$$

то, поскольку

$$\frac{|f(x+u)-f(x\pm 0)|}{u} \leq \frac{M}{|u|^{\alpha-1}},$$

для функции $f(x)$ выполнено и условие Дини.

Обратное, конечно, неверно. Можно доказать, что условие Дини тем не менее обеспечивает разложение функции $f(x)$ в интеграл Фурье в данной точке.

Сделаем некоторые выводы из полученных результатов. При условии $f(x) \in L_1(-\infty, \infty)$ у функции $f(x)$ существует преобразование Фурье

$$g(\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{i\lambda x} dx;$$

обозначим его так: $g(\lambda) = F(f)$, где F — оператор Фурье, применяемый к функции f .

При выполнении условий теоремы 9.1 и условия $f(x) = \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}$, как мы доказали, функция $f(x)$ разлагается в интеграл Фурье, т. е. справедлива формула

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} g(\lambda) e^{-i\lambda x} d\lambda.$$

Эту формулу называют обратным преобразованием Фурье. Обозначим ее так: $f(x) = \frac{1}{2\pi} F^{-1}(g)$, где F^{-1} — обратный оператор Фурье, применяемый к функции $g(\lambda)$, т. е. к образу Фурье функции $f(x)$.

Отметим, что хотя формулы преобразования Фурье и обратного преобразования Фурье внешне похожи (см. формулы (9.2) и (9.4)), по существу они различны: в первой из них интеграл существует в обычном смысле (поскольку $f \in L_1(-\infty, \infty)$), а во второй, вообще говоря, лишь в смысле главного значения. Кроме того, равенство (9.2) — это определение функции $g(\lambda)$, а в равенстве (9.4) содержится утверждение о том, что интеграл равен исходной функции $f(x)$.

3. Примеры. Рассмотрим прямое и обратное преобразования Фурье для случаев четной и нечетной функций.

1°. Случай четной функции $f(x)$. Очевидно, в случае, если $f(x) = f(-x)$, из формулы (9.2) получаем

$$g(\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) (\cos \lambda x + i \sin \lambda x) dx = 2 \int_0^{\infty} f(x) \cos \lambda x dx.$$

Отсюда следует, что $g(\lambda)$ тоже четная функция. Поэтому

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} g(\lambda) \cos \lambda x d\lambda = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} g(\lambda) \cos \lambda x d\lambda.$$

Первую из этих формул называют прямым косинус-преобразованием Фурье функции $f(x)$, а вторую — обратным косинус-преобразованием Фурье.

2°. Случай нечетной функции $f(x)$. Пусть $f(x) = -f(-x)$. Тогда, очевидно, получим прямое синус-преобразование Фурье

$$g(\lambda) = 2 \int_0^{\infty} f(x) \sin \lambda x dx$$

и обратное синус-преобразование Фурье

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} g(\lambda) \sin \lambda x d\lambda.$$

3°. Пусть $f(x) = e^{-\gamma|x|}$, $\gamma > 0$. Тогда

$$F(f) = g(\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\gamma|x|} e^{i\lambda x} dx = 2 \int_0^{\infty} e^{-\gamma x} \cos \lambda x dx.$$

С помощью двукратного интегрирования по частям находим

$$F(f) = g(\lambda) = \frac{2\gamma}{\lambda^2 + \gamma^2}.$$

4°. Пусть

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{при } |x| \leq a; \\ 0 & \text{при } |x| > a. \end{cases}$$

Тогда

$$g(\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{i\lambda x} dx = \int_{-a}^a e^{i\lambda x} dx = \frac{e^{i\lambda a} - e^{-i\lambda a}}{i\lambda} = \frac{2 \sin \lambda a}{\lambda}.$$

Заметим, что $g(\lambda)$ не принадлежит $L_1(-\infty, \infty)$.

§ 2. НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ

Установим некоторую связь между скоростью убывания функции $f(x)$ и гладкостью (дифференцируемостью) ее преобразования Фурье, а также между гладкостью функции и скоростью убывания ее преобразования Фурье.

Утверждение 1. Пусть для целого неотрицательного k $(1+|x|)^k f(x) \in L_1(-\infty, \infty)$. Тогда преобразование Фурье $g(\lambda)$ функции $f(x)$ дифференцируемо k раз, причем, его производную по λ любого порядка $m=1, 2, \dots, k$ можно вычислять дифференцированием под знаком интеграла (9.2), т. е. по формуле

$$g^{(m)}(\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) (ix)^m e^{i\lambda x} dx, \quad m=1, 2, \dots, k. \quad (9.12)$$

Доказательство. Для любого $m=1, 2, \dots, k$ справедливо неравенство

$$|(e^{i\lambda x} f(x))^{(m)}| = |e^{i\lambda x} (ix)^m f(x)| \leq (1+|x|^k) |f(x)|.$$

Интеграл

$$\int_{-\infty}^{\infty} (1+|x|^k) |f(x)| dx$$

сходится. Из сходимости этого интеграла и из признака Вейерштрасса (см. теорему 7.8) вытекает равномерная по λ на каждом сегменте сходимость интеграла $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{i\lambda x} dx$. Из теоремы 7.14 вытекает возможность продифференцировать этот интеграл по λ до порядка $m=1, 2, \dots, k$, а также справедливость формулы (9.12). Утверждение доказано.

Утверждение 2. Пусть функция $f(x)$ имеет в каждой точке x все производные до порядка $k \geq 1$ включительно, причем $f(x)$ и все $f^{(m)}(x)$, $m=1, 2, \dots, k$, абсолютно интегрируемы на $(-\infty, \infty)$ и для любого $m=0, 1, \dots, k-1$ $f^{(m)}(x) \rightarrow 0$ при $|x| \rightarrow \infty$ ($f^{(0)}(x) \equiv f(x)$).

Тогда $|g(\lambda)| = o(|\lambda|^{-k})$ при $|\lambda| \rightarrow \infty$, где $g(\lambda)$ — преобразование Фурье функции $f(x)$.

Доказательство. Пусть $A > 0$, тогда

$$\begin{aligned} \int_{-A}^A f^{(k)}(x) e^{i\lambda x} dx &= [f^{(k-1)}(x) e^{i\lambda x}]_{-A}^A - [f^{(k-2)}(x) (i\lambda) e^{i\lambda x}]_{-A}^A + \\ &+ \dots + (-i)^k \lambda^k \int_{-A}^A f(x) e^{i\lambda x} dx. \end{aligned}$$

Устремляя A к бесконечности и учитывая стремление к нулю производных функции $f(x)$, получим

$$\int_{-\infty}^{\infty} f^{(k)}(x) e^{i\lambda x} dx = (-i\lambda)^k \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{i\lambda x} dx = (-i\lambda)^k g(\lambda).$$

Согласно лемме 3 преобразование Фурье функции $f^{(k)}(x)$ стремится к нулю. Поэтому

$$|g(\lambda)| = o(|\lambda|^{-k}).$$

Утверждение доказано.

Утверждение 3 (равенство Планшереля¹⁾). Пусть функция $f(x)$ и ее вторая производная абсолютно интегрируемы на $(-\infty, \infty)$, $f(x) \rightarrow 0$, $f'(x) \rightarrow 0$ при $|x| \rightarrow \infty$. Пусть функция $\varphi(x)$ абсолютно интегрируема на $(-\infty, \infty)$. Тогда

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \varphi(x) dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} g(\lambda) \overline{\psi(\lambda)} d\lambda,$$

где $g(\lambda) = \hat{f}$, $\psi(\lambda) = \hat{\varphi}$ — преобразования Фурье функций f и φ соответственно; черта над $\psi(\lambda)$ означает комплексное сопряжение.

Доказательство. По формуле обращения $f(x) = \frac{1}{2\pi} F^{-1}(g) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} g(\lambda) e^{-i\lambda x} d\lambda$, причем согласно утверждению 2

$$|g(\lambda)| \leq c(1 + |\lambda|)^{-2}.$$

Поэтому интеграл для $f(x)$ сходится абсолютно и равномерно (относительно x) на $(-\infty, \infty)$. Умножая обе части формулы для $f(x)$ на $\varphi(x)$ и интегрируя по x от $-A$ до A , получим

$$\int_{-A}^A f(x) \varphi(x) dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-A}^A \varphi(x) \left[\int_{-\infty}^{\infty} g(\lambda) e^{-i\lambda x} d\lambda \right] dx.$$

В силу равномерной по x на $[-A, A]$ сходимости интеграла $\int_{-\infty}^{\infty} g(\lambda) e^{-i\lambda x} d\lambda$ можно поменять порядок интегрирования в этой формуле справа:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) g(x) dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-A}^A \varphi(x) e^{-i\lambda x} dx \right] \overline{g(\lambda)} d\lambda, \quad (9.13)$$

где черта означает комплексное сопряжение.

Согласно оценке

$$\left| \int_{-A}^A \varphi(x) e^{-i\lambda x} dx \right| \cdot |g(\lambda)| \leq c(1 + |\lambda|)^{-2} \int_{-\infty}^{\infty} |\varphi(x)| dx$$

¹⁾ М. Планшерель — швейцарский математик (1885—1967).

и признаку Вейерштрасса интеграл в правой части (9.13) сходится равномерно по A на всей прямой. Применяя теорему 7.9, в (9.13) можно перейти к пределу при $|A| \rightarrow \infty$ под знаком интеграла. Получим

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) g(x) dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} g(\lambda) \bar{\psi}(\lambda) d\lambda,$$

что и требовалось доказать.

В заключение докажем теорему Котельникова²⁾, играющую важную роль в теории радиосвязи. Для этого сделаем несколько предварительных пояснений. Пусть функция $f(x)$ определена на сегменте $[-l, l]$ и периодически (с периодом $2l$) продолжена на всю прямую; пусть эта функция абсолютно интегрируема на периоде. Разложим $f(x)$ в ряд Фурье (который в случае, если $f(x)$ удовлетворяет дополнительным условиям, сходится к ней):

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos \frac{\pi}{l} kx + b_k \sin \frac{\pi}{l} kx \right) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{i \frac{\pi}{l} kx}.$$

Функцию $f(x)$ называют сигналом, числа $\{a_0, a_k, b_k\}$ или $\{c_k\}$ — спектром сигнала, а величину $k/2l$ — частотой сигнала f . Разложение периодической функции в ряд Фурье называют гармоническим анализом данной функции. В случае периодической функции $f(x)$ ее спектр дискретен, т. е. состоит из не более чем счетного множества значений.

Если функция не является периодической, то ряд Фурье, как мы знаем, может быть заменен интегралом Фурье функции $f(x)$ и

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} g(\lambda) e^{-i\lambda x} d\lambda.$$

Функцию $f(x)$ можно по-прежнему называть сигналом, а функцию $g(\lambda)$ — спектром сигнала (в данном случае спектр непрерывен) и λ — частотой сигнала.

На практике важной задачей является задача восстановления сигнала по спектру. Подчеркнем, что часто нет необходимости знать спектр $g(\lambda)$ для всех частот λ , да и приборы улавливают спектр только в некотором диапазоне частот $|\lambda| \leq a$. (Например, человеческое ухо улавливает сигнал в диапазоне от 20 герц до 20 килогерц.)

Поэтому будем считать, что сигнал $f(x)$ (x — время, $-\infty < x < \infty$) имеет финитный спектр, отличный от нуля лишь для частот

²⁾ В. А. Котельников (род. в 1908 г.) — советский академик, специалист в теории радиосвязи.

λ при $|\lambda| \leq a$. Таким образом, при $|\lambda| > a$ имеем $g(\lambda) \equiv 0$. Следовательно,

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} g(\lambda) e^{-i\lambda x} d\lambda = \frac{1}{2\pi} \int_{-a}^a g(\lambda) e^{-i\lambda x} d\lambda. \quad (9.14)$$

Разложим на сегменте $[-a, a]$ функцию $g(\lambda)$ в ряд Фурье:

$$g(\lambda) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} d_k e^{i \frac{\pi}{a} k \lambda}.$$

Учитывая (9.14), получим

$$d_k = \frac{1}{2a} \int_{-a}^a g(\lambda) e^{i \frac{\pi}{a} \lambda k} d\lambda = \frac{\pi}{a} f\left(-\frac{\pi}{a} k\right). \quad (9.15)$$

Подставляя эти коэффициенты в ряд для $g(\lambda)$, а затем $g(\lambda)$ — в интеграл (9.14), будем иметь

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-a}^a \left(\frac{\pi}{a} \sum_{k=-\infty}^{\infty} f\left(\frac{\pi}{a} k\right) e^{-i\lambda x + i \frac{\pi}{a} \lambda k} \right) d\lambda = \\ &= \frac{1}{2a} \sum_{k=-\infty}^{\infty} f\left(\frac{\pi}{a} k\right) \int_{-a}^a e^{i\lambda \left(\frac{\pi}{a} k - x\right)} d\lambda. \end{aligned}$$

Таким образом, доказана следующая

Теорема 9.2 (теорема Котельникова). Для сигнала $f(x)$ с финитным спектром $g(\lambda)$ справедливо соотношение

$$f(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f\left(\frac{\pi}{a} k\right) \frac{\sin a \left(x - \frac{\pi}{a} k\right)}{a \left(x - \frac{\pi}{a} k\right)}.$$

Теорема 9.2 показывает, что сигнал, описываемый функцией $f(x)$ с финитным спектром $g(\lambda)$, сосредоточенным в полосе частот $|\lambda| \leq a$, восстанавливается лишь по отсчетным значениям $f\left(\frac{\pi}{a} k\right)$, передаваемым через равные промежутки времени π/a .

§ 3. КРАТНЫЙ ИНТЕГРАЛ ФУРЬЕ

Здесь мы дадим лишь самые начальные понятия о кратном интеграле Фурье. Пусть функция N переменных $f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_N)$, $N \geq 2$, такова, что существует несобственный интеграл

$$\int \dots \int_{E^N} f(x_1, x_2, \dots, x_N) dx_1 dx_2 \dots dx_N.$$

Назовем преобразованием (образом) Фурье такой функции $f(x)$ величину

$$g(\lambda) = g(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_N) = \int \dots \int_{E^N} f(x_1, x_2, \dots, x_N) e^{i(x, \lambda)} dx_1 dx_2 \dots dx_N,$$

где (x, λ) означает скалярное произведение векторов $x = (x_1, x_2, \dots, x_N)$ и $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_N)$, т. е.

$$(x, \lambda) = \sum_{i=1}^N x_i \lambda_i.$$

Точно так же, как в § 1, можно показать, что $g(\lambda)$ является непрерывной функцией λ в E^N и стремится к нулю при $|\lambda| =$

$$= \left(\sum_{i=1}^N \lambda_i^2 \right)^{1/2} \rightarrow 0. \quad \text{Предел}$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int \dots \int_{E^N} g(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_N) e^{-i(x, \lambda)} d\lambda_1 d\lambda_2 \dots d\lambda_N$$

при условии, что он существует, называется разложением функции $f(x)$ в N -кратный интеграл Фурье. С помощью перехода к пределу получается (так же, как в случае одной переменной x) формула обращения

$$f(x) = \frac{1}{(2\pi)^N} \int \dots \int_{L^N} g(\lambda) e^{-i(x, \lambda)} d\lambda,$$

где

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_N), \quad \lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_N).$$

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	5
ГЛАВА 1. ЧИСЛОВЫЕ РЯДЫ	7
§ 1. Понятие числового ряда	7
1. Сходящиеся и расходящиеся ряды (7). 2. Критерий Коши сходимости ряда (10)	
§ 2. Ряды с неотрицательными членами	12
1. Необходимое и достаточное условие сходимости ряда с неотрицательными членами (12). 2. Признаки сравнения (13). 3. Признаки Даламбера и Коши (16). 4. Интегральный признак Коши — Маклорена (21). 5. Признак Раабе (24). 6. Отсутствие универсального ряда сравнения (27)	
§ 3. Абсолютно и условно сходящиеся ряды	28
1. Понятия абсолютно и условно сходящихся рядов (28). 2. О перестановке членов условно сходящегося ряда (30). 3. О перестановке членов абсолютно сходящегося ряда (33)	
§ 4. Признаки сходимости произвольных рядов	35
§ 5. Арифметические операции над сходящимися рядами	41
§ 6. Бесконечные произведения	44
1. Основные понятия (44). 2. Связь между сходимостью бесконечных произведений и рядов (47). 3. Разложение функции $\sin x$ в бесконечное произведение (51)	
§ 7. Обобщенные методы суммирования расходящихся рядов	55
1. Метод Чезаро (метод средних арифметических) (56). 2. Метод суммирования Пуассона — Абеля (57)	
§ 8. Элементарная теория двойных и повторных рядов	59
ГЛАВА 2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ И РЯДЫ	67
§ 1. Понятия сходимости в точке и равномерной сходимости на множестве	67
1. Понятия функциональной последовательности и функционального ряда (67). 2. Сходимость функциональной последовательности (функционального ряда) в точке и на множестве (69). 3. Равномерная сходимость на множестве (70). 4. Критерий Коши равномерной сходимости последовательности (ряда) (72)	
§ 2. Достаточные признаки равномерной сходимости функциональных последовательностей и рядов	74
§ 3. Почленный переход к пределу	83
§ 4. Почленное интегрирование и почленное дифференцирование функциональных последовательностей и рядов	87
1. Почленное интегрирование (87). 2. Почленное дифференцирование (90). 3. Сходимость в среднем (94)	
§ 5. Равнотепенная непрерывность последовательности функций	97
§ 6. Степенные ряды	102
1. Степенной ряд и область его сходимости (102). 2. Непрерывность суммы степенного ряда (105). 3. Почленное интегрирование и почленное дифференцирование степенного ряда (105)	
§ 7. Разложение функций в степенные ряды	107
1. Разложение функции в степенной ряд (107). 2. Разложение некоторых элементарных функций в ряд Тейлора (108). 3. Элементарные представления о функциях комплексной переменной (110). 4. Теорема Вейерштрасса о равномерном приближении непрерывной функции многочленами (112)	

ГЛАВА 3. ДВОЙНЫЕ И n-КРАТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ	117
§ 1. Определение и условия существования двойного интеграла	117
1. Определение двойного интеграла для прямоугольника (117).	
2. Условия существования двойного интеграла для прямоугольника (119).	
3. Определение и условия существования двойного интеграла для произвольной области (121).	
4. Общее определение двойного интеграла (123)	
§ 2. Основные свойства двойного интеграла	127
§ 3. Сведение двойного интеграла к повторному однократному	129
1. Случай прямоугольника (129).	
2. Случай произвольной области (130)	
§ 4. Тройные и n -кратные интегралы	133
§ 5. Замена переменных в n -кратном интеграле	138
§ 6. Вычисление объемов n -мерных тел	152
§ 7. Теорема о почленном интегрировании функциональных последовательностей и рядов	157
§ 8. Кратные несобственные интегралы	159
1. Понятие кратных несобственных интегралов (159).	
2. Два признака сходимости несобственных интегралов от неотрицательных функций (160).	
3. Несобственные интегралы от знакопеременных функций (161).	
4. Главное значение кратных несобственных интегралов (165)	
ГЛАВА 4. КРИВОЛИНЕЙНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ	167
§ 1. Понятия криволинейных интегралов первого и второго рода	167
§ 2. Условия существования криволинейных интегралов	169
ГЛАВА 5. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ	175
§ 1. Понятия поверхности и ее площади	175
1. Понятие поверхности (175).	
2. Вспомогательные леммы (179).	
3. Площадь поверхности (181)	
§ 2. Поверхностные интегралы	185
ГЛАВА 6. ТЕОРИЯ ПОЛЯ. ОСНОВНЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ АНАЛИЗА	190
§ 1. Обозначения. Биортогональные базисы. Инварианты линейного оператора	190
1. Обозначения (190).	
2. Биортогональные базисы в пространстве E^n (191).	
3. Преобразования базисов. Ковариантные и контрвариантные координаты вектора (192).	
4. Инварианты линейного оператора. Дивергенция и ротор (195).	
5. Выражения для дивергенции и ротора линейного оператора в ортонормированном базисе (198)	
§ 2. Скалярные и векторные поля. Дифференциальные операторы векторного анализа	198
1. Скалярные и векторные поля (198).	
2. Дивергенция, ротор и производная по направлению векторного поля (203).	
3. Некоторые другие формулы векторного анализа (204).	
4. Заключительные замечания (206)	
§ 3. Основные интегральные формулы анализа	207
1. Формула Грина (207).	
2. Формула Остроградского — Гаусса (211).	
3. Формула Стокса (214)	
§ 4. Условия независимости криволинейного интеграла на плоскости от пути интегрирования	218
§ 5. Некоторые примеры приложений теории поля	222
1. Выражение площади плоской области через криволинейный интеграл (222).	
2. Выражение объема через поверхностный интеграл (223)	
Дополнение к главе 6. Дифференциальные формы в евклидовом пространстве	225

§ 1. Знакопеременные полилинейные формы	225
1. Линейные формы (225). 2. Билинейные формы (226). 3. Полилинейные формы (227). 4. Знакопеременные полилинейные формы (228). 5. Внешнее произведение знакопеременных форм (228). 6. Свойства внешнего произведения знакопеременных форм (231). 7. Базис в пространстве знакопеременных форм (233)	
§ 2. Дифференциальные формы	235
1. Основные обозначения (235). 2. Внешний дифференциал (236). 3. Свойства внешнего дифференциала (237)	
§ 3. Дифференцируемые отображения	239
1. Определение дифференцируемых отображений (239). 2. Свойства отображения f^* (240)	
§ 4. Интегрирование дифференциальных форм	243
1. Определения (243). 2. Дифференцируемые цепи (245). 3. Формула Стокса (248). 4. Примеры (250)	

ГЛАВА 7. ИНТЕГРАЛЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ПАРАМЕТРОВ 252

§ 1. Равномерное по одной переменной стремление функции двух переменных к пределу по другой переменной	252
1. Связь равномерного по одной переменной стремления функции двух переменных к пределу по другой переменной с равномерной сходимостью функциональной последовательности (252). 2. Критерий Коши равномерного стремления функции к предельной (254). 3. Применения понятия равномерного стремления к предельной функции (254)	
§ 2. Собственные интегралы, зависящие от параметра	256
1. Свойства интеграла, зависящего от параметра (256). 2. Случай, когда пределы интегрирования зависят от параметра (257)	
§ 3. Несобственные интегралы, зависящие от параметра	259
1. Несобственные интегралы первого рода, зависящие от параметра (260). 2. Несобственные интегралы второго рода, зависящие от параметра (266)	
§ 4. Применение теории интегралов, зависящих от параметра, к вычислению некоторых несобственных интегралов	267
§ 5. Интегралы Эйлера	271
1. Γ -функция (272). 2. В-функция (275). 3. Связь между эйлеровыми интегралами (277). 4. Примеры (279)	
§ 6. Формула Стирлинга	280
§ 7. Кратные интегралы, зависящие от параметров	282
1. Собственные кратные интегралы, зависящие от параметров (282). 2. Несобственные кратные интегралы, зависящие от параметра (283)	

ГЛАВА 8. РЯДЫ ФУРЬЕ 287

§ 1. Ортонормированные системы и общие ряды Фурье	287
1. Ортонормированные системы (287). 2. Понятие об общем ряде Фурье (292)	
§ 2. Замкнутые и полные ортонормированные системы	295
§ 3. Замкнутость тригонометрической системы и следствия из нее	298
1. Равномерное приближение непрерывной функции тригонометрическими многочленами (298). 2. Доказательство замкнутости тригонометрической системы (301). 3. Следствия замкнутости тригонометрической системы (303)	
§ 4. Простейшие условия равномерной сходимости и почленного дифференцирования тригонометрического ряда Фурье	304
1. Вводные замечания (304). 2. Простейшие условия абсолютной и равномерной сходимости тригонометрического ряда Фурье (306). 3. Простейшие условия почленного дифференцирования тригонометрического ряда Фурье (308)	

§ 5. Более точные условия равномерной сходимости и условия сходимости в данной точке	309
1. Модуль непрерывности функции. Классы Гельдера (309). 2. Выражение для частичной суммы тригонометрического ряда Фурье (311). 3. Вспомогательные предложения (314). 4. Принцип локализации (317). 5. Равномерная сходимость тригонометрического ряда Фурье для функции из класса Гельдера (319). 6. О сходимости тригонометрического ряда Фурье кусочно гёльдеровой функции (325). 7. Суммируемость тригонометрического ряда Фурье непрерывной функции методом средних арифметических (329). 8. Заключительные замечания (331)	
§ 6. Кратные тригонометрические ряды Фурье	332
1. Понятия кратного тригонометрического ряда Фурье и его прямоугольных и сферических частичных сумм (332). 2. Модуль непрерывности и классы Гельдера для функции N переменных (334). 3. Условия абсолютной сходимости кратного тригонометрического ряда Фурье (335)	
ГЛАВА 9. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ	338
§ 1. Представление функции интегралом Фурье	339
1. Вспомогательные утверждения (340). 2. Основная теорема. Формула обращения (342). 3. Примеры (347)	
§ 2. Некоторые свойства преобразования Фурье	348
§ 3. Кратный интеграл Фурье	352